



12
18
2
42



C. 6. f

1. 2. 3.

PRAXIS
MEDICINÆ
THEORICA
ET EMPIRICA
familiarissima

GVALTHERI BRVELE:

*In qua pulcherrima dilucidissimâque ratio-
ne morborum internorum cogni-
tio, eorumdémque curatio
traditur.*



THESAURVS INNOCENTIAE



AVRELIANÆ,
Apud Iacobum Chouët.

M. DC. XXVIII.

1875

1875

ILLVSTRISSIMO HEROI AC

DOMINO D. HENRICO COMITI HVNTIN-
toniensi, Hastingæ Domino, &c. Consilij
Majestatis Regiæ in parte Boreali Præsidi di-
gniss. omnique virtutum genere ac doctrina
clarissimo, bonorumque studiorum omnium
Mæcenati præstantissimo,

GVALTHERVS BRVELE, aliàs Brant, Doctor medi-
cinæ, matheseosque studiosus, perpetuam
precatur felicitatem.

MIRABILEM quandam diuinæ naturæ pulchri-
tudinem atque varietatem ob oculos cum propo-
suerit nobis omnibus in hoc pulcherrimo mundi domici-
lio atque theatro habitantibus rerum omnium parens
Deus, in eum haud dubie finem, vt in eius summam nos ad-
mirationem, insatiabilemque alliceret amorē mirabili hac
rerū pulchritudine, tum iucunda earundē varietate, incō-
prehensibiliq; durabilitate; omnes profectò ingenij vires in
contēplatione tã stupendi opificij, homo, (qua nulla creatu-
ra in hoc mundo est nobilior) impendere deberet, quoties per
propria officia & occupationes vacare licet; cum nihil ad
cultū Dei eiusdemq; amorē, meo iudicio, magis, quàm assi-
dua diuinarum humanarūque rerum cognitio, atq; im-
mensorū operū Dei contēplatio nos promoueat: in eumq;
finem proculdubio mentē rationalem nobis indidit, diui-
nitatisq; participes nos effecit; quod manifestè hinc constat,
cum in celum omni quasi momento nobis ascendere mente
ipsa liceat, siderūq; rationes ac motus mirabiles, ipsamq;
totius vniuersi pulcherrimam harmoniā perscrutari si ipsi
velimus, conceditur; ne dicā quòd in medio astrorum, & in
ipsis quoq; orbibus celestibus nobis expatiari quasi integrū

EPISTOLA

est quotiescumq; lubet. Estq; hac res maximè prosectò præ-
 sagiū quòd maximi nos faciat æternus Deus, summoq; nos
 prosequatur amore, & quòd tandem suæ æternitatis nos sit
 factururus participes, modò piè illū colamus, & reuereamur
 omnibus diebus vitæ nostræ. Quapropter nō possum non mi-
 rari, & quidē quàm maxime præposterū plurimorum iu-
 diciū, qui alto quasi silentio inuoluēda hæc studia esse vo-
 lunt, quæ cognitionem rerum naturalium tradunt in hoc
 pulcherrimo mundi theatro ab ipso omnium rerum condi-
 ditore Deo, ob eam quam diximus causam, sensibus nostris
 obiectarum; cū mirabilē tamen vim habeat recta rerum
 naturalium cognitio, ad pleniorē cognitionē omnipotentis
 Dei; præsertim si fide Christiana quis fuerit interiùs illu-
 stratus. Tāta enim videmus hīc passim in naturalium rerum
 cōtemplatione miracula, vt nihil in diuinis difficile sit mi-
 hi ad credēdū. Vnde rectè Apostolus inquit, Inuisibilia Dei
 per ea quæ facta sunt, intellecta conspiciuntur; sempiterna
 quoque eius virtus atque diuinitas, ita vt inexcusabiles sint
 qui ex creaturarū cognitione non studuerint dignas crea-
 tori gratias referre, cultūq; debito famulari. Mirabilium
 enim huius mūdi conditor ipse Deus, à mirabilibus creatu-
 ris æstimari potest ex parte, quàm nimirū ipse sit potēs atq;
 fortis qui de nihilo fecit omnia. Atque vtinā omnes Chri-
 stiani hac sæpiùs secū alto silētio reuoluerēt, cū aliud vix
 quicquam sit quod nobis magis in memoriā reuocare pos-
 sit spem immortalitatis nostræ. Atque haud dubiè debere-
 mus omnes Christiani sæpiùs hoc naturæ templum, quod
 omnium sapientum consensu, cuiuscumque etiam sint hæ-
 reseos tandem, in humani generis gratiam est conditum,
 aspicere quò ituri sumus vita functi; paulatimq; ipsa mēte
 sic nobis familiarem illam nostram beatam habitationem
 facere

DEDICATORIA.

facere deberemus. Alij sunt qui licet rerum naturalium cognitionem vt priores non damnent; omnia tamen ea quæ de rebus naturalibus posteritati à præstantissimis viris non absque inspiratione diuina tradita sunt, prorsus immutare vanissime laborant. In qua re præter multos alios, Paracelsus se magnam gloriam consecutum sibi ipsi pollicetur, idq; plurimis voluminibus ita agit, vt etiam è doctioribus permultos dubios aliquamdiu reddiderit. Et, vt verum fatear, me etiam aliquot mensibus suis labyrinthis detinuit. Magnis equidem præconiis quæ passim de Paracelso publicè spargebantur, prouocatus, nõ alienum à ratione aliquando esse duxi, si nonnulla illius perlustrarer scripta, cum per negotia cõmodè liceret. Sperabam enim me inde aliquid commodi relaturum, cum quasi supra astra huius viri scripta à multis extolleretur; quorũ nonnulli inauditã etiam nobis minabantur metamorphosin, qui rationem medendi ipsius Galeni profitemur. Ego verò id tandem magnis laboribus, maximisq; expensis consecutus sum; quòd nunc sciam quibus rationibus alios ab hac arte plurimis dānosa dehortari possum, maximis præterea verissimisq; argumentis asserere possum, Galeni fundamenta, quātum ad felicem rationem medendi spectat, numquã euersum iri à Paracelsorũ nouis hypothefibus; id quod latius ostēdemus in libello nostro quẽ De corollariis philosophicis inscripsimus. In quo libello in eorum gratiã qui ita auidi sunt rerũ nouarum, vt à lectione Paracelsi abstinere nequeant, ea quæ à Paracelso multis libris arrogantissime, à Raimundo Lullio plurimis voluminibus verbosissime, & à Gebro obscurissime traduntur, verissime, quantumq; res ipsa patitur, apertissime atq; breuissime pro nostro modulo proponemus; neque enim assero nihil omnino utilitatis ab istis scriptoribus lectore posse

EPISTOLA

consequi: scio enim peroptimè; etiamsi Chaos illud alchimisticum aspectu sit vile, omniq; vita destitui videatur, in suo tamē sinu foueri, quod Alchimistarum altissima inuolucra atq; enigmata, nō mera esse somnia significare potest. adde quod nihil sit in vniuersa philosophantiū schola, quod carnis nostræ resurrectionem (& quidem cū magna inuolutione, atque gloria) certius nobis persuadere potest quàm Chaos illud Alchimisticum, seu, vt vocant, philosophicum. Ipsa deniq; Alchimia ex metallis preparare docet præstantia medicamenta, quæ quamuis ab arte medica meritò excludatur ob venenatos spiritus quibus omnia quasi perfunduntur, artem tamen chirurgiæ exornare possunt, si dextrè à chirurgo corporibus humanis accommodentur. Sed quantum peccent priores, qui rerū naturalium cognitionem non nisi iniquo admittunt animo; tum posteriores, qui omnino inuertere studēt ea quæ à præstantissimis philosophis, medicis, astronomis, astrologisq;, idque dubio procul non absque inspiratione diuina, posteris quasi per manus tradita sunt, in presentia ostēdere consultū minimè existimo, cū tantæ faces nobis concitata fuerint non ita pridem à nonnullis qui meo nomini meaq; famæ maluolè insidiabantur, vt mirum sit dictū. Cuius rei occasio hinc orta est, quod maiorem semper maiestatem atq; auctoritatē attribuerim sacro Dei verbo (& meritò quidē: Cælum enim & terra transibunt, verbum autem Domini manet in æternū) quàm vt eius veritas humanis vllis artibus probari posset aut deberet, cū nulla quasi sint disciplina humana quin plurimis passim implicetur erroribus. Quātum autem à me peccatum fuerit, alienum à ratione nō esse existimo si ingenuis præditis animis vno verbo significē, in eum potissimam finem, vt sibi quoque cauere discāt qui virtuti se con-

DEDICATORIA.

se consecrarunt, quiq; animum ad cauendum fallendumq; minimè instructum habent. Recentē qui adhuc habent memoriam ignitarum impressionum quæ in æthere Septētrionali apparuere anno Dom. 1575. circa nonam horā noctis pridie diui Michaëlis, multos esse scio vbiq; locorum. Rogat à me muliercula vbi iam dies aliquot elapsi essent, primo ànne prædicta vidissem lumina, vltimò quidnam de facibus illis caelestibus sentirem. Inquam ego, me, & magna quidem cum admiratione vidisse prædicta meteora, naturale autem causam me nullam posse augurari, quæ rationi satis esset cōsona horum luminum. Hoc interim addidi, hæc nimirum, quam dicam causam nō omninò videri alienam à ratione. Potest fieri, inquam ego, vt huiusmodi faces excitatæ fuerint ratione magnæ alicuius tempestatis tunc temporis sub terra existentis; radij equidem solares in densam cōcretāque nubium mollem sub terra collectam, quasi in corpus solidum incidentes, fortè ad superiora tantisper reflectebantur, donec alteri alicui occurrebant corpori solido: cumq; eodem tempore nubium quoq; densissima moles supra terram versus Septentionem diuersis cōcitaretur motibus, potest fieri, inquā, vt radij solares in illis nubib. supra terrā in ea orbis parte reciperētur, dictasq; excitarent faces, haud aliter atq; speculo radij solares à quouis homine in hoc aut illud obiectū trāsmitti subinde solēt, quò radij solares per se tunc tēporis nullo modo peruenire possunt. Hæc ego more eorū qui rerum naturalium cōtemplatione delectātur, interrogatus cādido animo in mediū proferebā. His à me dictis, inquit muliercula, Extremi diē iudicij nos oppressurum significare nobis ego auguror has faces caelestes. Cui respondi, me id certò asserere nō posse ratione vlla naturali, cum à sacro Dei verbo discere debeamus, quidnam de hac similiq;

EPISTOLA

quaestione, quæ omnium philosophorum sapientumque rationes atque capacitatem longè excedit (utpote qui omnia naturalibus rationibus metiuntur) statuendum sit, cum hoc soli Deo notum sit, qui reuera solus nouit omnium rerum durationem atque terminos. Fuere nihilominus, inquam ego, inter priscos philosophos permulti viri magna laude digni, etiamsi diem illum Domini magnum ignorauerint, ob summam vitæ sobrietatem, necnon mirabilem quam nobis reliquerunt de rebus naturalibus cognitionem præstantissimasque leges quas in hunc finem cõdiderant, ut beata eorum seruari posset respublica. Quamuis enim heroici illi viri nulla artem quã humana excogitauit industria, absolutam nobis reliquerint, præclara tamen in omnibus artibus indefessis laboribus, longissimisque observationibus inuenerunt, posterisque instar testamenti fideliter tradiderunt, quã ob causam merito etiam auctores posteritatis vocari possunt. Hoc quoque addidi prædictis, huiusmodi scio meteora, signaque celi, tam philosophorum quam astrologorum testimonio, nobis plerumque denunciare magnas calamitates. Cui quoque sacra scriptura assentitur, cum inquit, A signis celi noli metuere. Signa enim cum sint, aliquid boni aut mali nobis significare certum est. Quatumuis autem maximas calamitates nobis significare huiusmodi signa celi ex eorum observationibus intelligamus, non est tamen, inquam ego, quod metuemus quicquam, si firma fide & absque omni dubitatione nos commiserimus tuitioni omnipotentis Dei, ipsumque plena fiducia inuocemus, ut nobis adesse velit nunc, & in omnibus angustiis nostris, utque imminetia mala mitigare velit, cum propè sit Deus omnibus verè inuocantibus eum. Huiusmodi itaque signa caelestia cum magna ex parte calamitates nobis denuntient, idque propter peccata populi; semper timentes Deum,

Deum,

DEDICATORIA.

Deum, piosq; excitabunt animos ad inuocandū Deum, utq; pietatem atq; virtutē amplectantur, commonefaciēt. Estq; hac reuera pia doctrina de celi signis. Ex prædicta tamē hac cādida responsione tanta nobis concitata fuere faces, quasi impudēter irreligioseq; aliquid adseruissē, ut mirum profectō sit dictū; cū accusare, addere, mutare, diminuerē, calumniari mea colloquia non dubitauerit, antequam ea quæ à me dicta fuerāt, aut audiret, aut leuiter saltē intelligeret. Cumq; Poëta dicat, se odisse memorem cōpotozem; possem & ego æquo iure odisse, si Christiana charitas permitteret, & falsum commemoratozem. At quantū hīc peccauerim, nullus est candidi iudici, Christianaq; charitate imbutus, qui non facile obseruare possit. Sunt & alia quæ de rebus naturalib. ab aliis aliquādo inuitatus in medium protuli, quorum nonnulla in deteriore etiam à nonnullis detorta fuere partem, verū quā iniquē id fecerint, vni-
co verbo indicabo, ut omnib. satisfaciā calumniatoribus, & ita quidē dilucidē, ut etiā vel omnium rerū quasi ignarus obseruare haud difficulter possit, iniquē frequēter viros bonos calumniari ab iis qui nunquā, aut saltē infelicitē didicere ingenuas artes, quæ emollire in omnib. quasi professoribus solēt mores, eosdemq; non sinunt esse feros. Testes mihi erunt omnes illi qui diligenter rerū humanarū studium cum studio diuino coniunxerunt (quos verē heroicos viros esse meritō dicere licet) quod passim in omnib. scholis philosophicis apud Christianos, dū nouitij in rebus philosophicis atq; Aristotele (qui meritō dicitur etiā hodie princeps philosophorū) instituuntur: auditores omnium primō diligēter admoneri à præceptoribus, auctorem quem lecturi sunt, esse ethnicū quidem scriptorē, rerūq; naturalium cognitionē illum optimē quidē doctissimeq; proponere, nihilominus

E P I S T O L A

magna cū cautela esse legendū tum illum, tum omnes alios ethnicos philosophos; cū multa passim scribant quæ cū veritate ipsa manifestissime pugnant. nec id mirū est, cū humanis solū rationibus innitantur. Vnde nōnulli eorū sunt qui afferunt mundū nunquā habuisse principiū nec habiturū finem, alij sunt qui cōtrariam seriò tuētur partem. Nōnulli quatuor esse mundi elemēta, sunt alij qui tria tantū esse seriò cōtendunt, sunt etiā qui duo solummodò admittunt. Sunt q̄, alia quamplurima de quibus nō satis inter illos cōuenit. Prædictis quoq; addit qui in philosophia nouitios introducit praeceptor. Cū itaq; plurima passim philosophorū scriptis permista sint, quæ cū veritate pugnant, vt cōstet quādo scripta eorum veritati cōsona sint, & quando cū veritate pugnet, certò diiudicare possitis, ne quis errorib. philosophorum implicetur, reuocāda sunt omnium philosophorum atq; astrologorum dicta atq; scripta ad sacratum Dei verbum, tanquā ad lydium lapidem, eiusq; auctoritate examinanda sunt, cū illud verissimè omnes litēs dirimat atq; cōponat, cū ibi quiescere debeam⁹ ab vltiori inquisitione veritatis in iis in quib. ratio humana deficit. Ita quidē me meosq; collegas optimi mei erudiere praeceptores, quibus me nō minus quā piis meis parentib. debere, libenter confiteor. Est q̄, hoc tā notum in scholis philosophicis, vt neminē esse qui hac ignoraret, aliquādo præsupposuerim. Hoc solidū studiorum fundamentum vbi aliquis iecerit, quare quæso liberū nō erit apud bonos (quibus omnia bona) data occasione, referre, quidnam senserint philosophi de mundi creatione, de eiusdē duratione, de hominis anima, de morte, de Deo, de corporib. caelestibus, de stellarum motib. atq; influentiis, de terræ motu, de tonitru, de Cometis, de tēpestatib. maximis, de eclipsibus, alijsq; similib. naturæ portentis.

Cur

DEDICATORIA.

Cur quæso omnes disciplinas liberales & quæ humana industria inuēta sunt, hoc studiorū iactō fundamento peruagari tunc nō poterit, apumq; more ea quæ profutura sunt, seligere? æquo iure meo iudicio peritis naetis nō temerè cōparari poterit, qui hoc solidum studiorū suorum fundamētum iecerit. Nā quemadmodum nauta si nauē acumq; habeat magnēticā vsui nauigationis artificiosè cōcinnatam; forti quidē animo periculosissimum primò cōscendit mare, etiamsi maximè furiosum sit, & frequenter nil nisi mortem minetur, illudq; felicissimè percurrit, etiāsi nunc ad sidera quasi vi tempestatis attollatur, iterumq; subitò ad tartara quasi precipitetur, quod etiā tam in hemisphærio inferiori (quod magis etiam mirum est) quàm superiori perficere nō dubitat. Rectū præterea iter ad patrios quoq; inuenit lares; idq; absq; errore notabili, etiamsi vi vêtōrum atq; tempestatū ad remotissimas maximeq; ignotas mundi partes sit deuolutus, totoq; aberrauerit à destinātō itinere cælo: eodē quoq; modo, animo cōstanti poterit omnium philosophorū, astrologorumq; dicta atq; scripta perlegere, docere, exponere, cōmentariisq; illustrare, quātumuis in multis à veritate aberrauerint, quisquis studiorum prædictū fundamētum iecerit: nec est quod vereatur ne errorib. eorum implicetur, cū in omnib. dubiis ad sacrā scripturam tanquam ad verissimum asylum atq; refugium si diuerterit. facile nū verum falsūve doceat philosophus intelligere poterit, cū ea in omnib. dubiis certissimè decidat omnē ambiguitatē. Non dubito quin vulgari etiā solūmodò præditus ingenio, facile videre possit, iniquè sæpe calūniari viros bonos; primò ab iis qui nō animaduertunt aliud lōgè esse philosophorum recēserē opiniones, & easdem approbare; deinde etiam ab iis qui ignari sunt libertatis atq; moris qui in philosophicis scholis obseruari solet. Ex dictis quoq; facile quiuis aestimare potest,

E P I S T O L A

maximè quoq; à ratione deficere eos qui naturalium rerū cognitionē explodendā tanquam humano generi noxiam, asserūt, à nemineq; has artes addisci esse putāt, quin minus Christianus efficiatur: id autem quā alienū sit à veritate, non est quod pluribus ostēdere conemur, cū nullus ferè tā puer sit qui id intelligere modò velit, ex prædictis nō possit. Tantūq; abest vt ego ita sentientib. assentiar, vt etiā meo iudicio aureis scribi mereatur litteris hoc philosophi dictū; Illud, inquit, quod exiguū & tentādo potiūs quā aff. rendo de sublimi dignitate cælestiū naturarū attingimus, quāuis tenuiter ea cognoscamus, dignius tamen est & optatius multa scientia quā de inferiorib. habemus, eò quòd hinc viuacitas ingenij ad penetrādū mirabilia subleuatur, hinc enim theoremata enascuntur quæ ad credendū non inducunt, sed cogunt. Hoc quoq; superioribus addo; cū bonas horas meæ vitæ residuas collocare decreuerim in iis quæ mea studia aliquo modo promouere possunt, me tā iudiciū priorum qui naturalium rerū cognitionē damnant, quā posteriorū qui immutare student ea quæ optimè de reb. naturalib. posteritati à præstātissimis viris tradita sunt nō absq; inspiratione diuina, lubenter reiicere, cū nostra studia tā priores quā posteriores remorentur potiūs quā promoueāt. Eam quoq; ob causam nunquā me in morborū curationib. à Galeni, Hippocratisq; solidissimis iactis fundamentis abduci patiar; id quod meritò etiā ob hanc fecero causam; medicinæ enim studio cū me omninò cōsecrauerim tēpore iuuentutis propter aduersam valetudinem, quæ ea etate ita grauiter diuq; opprimebar, vt diuturnioris vitæ spes quasi nulla mihi superesset; nihilominus (sit laus Altissimo) ex quo huius artis fundamēta (quæ vt iucundissima, ita

DEDICATORIA.

ita & firmissima sunt) aliququaliter affecutus essem, vitæq;
modū secundū eius præcepta dirigere cœpi, valetudinē recu-
peraui, huiusq; scientiæ beneficio, seriò assero me superasse
morbosam mei corporis cōstitutionē, hætenusq; transgisse
vitā minūs ægritudinib. obnoxiam. Cū autē huius artis
beneficiū in meipso omnium primò ita felici cum successu
(sic monēte Deo) expertus essem, omnes conatus insumere
in hac arte medica, nō alienū esse à ratione duxi; spōteq; hoc
genus studiij mihi eligere decreui, quod ad hoc studiū (sen-
tiens vim latētis naturæ) officiumq; me natum esse diuersis
indiciis augurari liceret, ratus verū esse, quòd nihil felicius
sit quàm quod impellēte genio peragitur. Itaque quoniam
omniū primò in meipso didici certissima experientia, artem
medicā plurimum in propulsandis morbis momēti habere;
nō immeritò magis illā tandem colere cœpi, & quidem in
eum etiā finem, vt aliis ex morbis periclitantib. data occa-
sione succurrere possem, eorumq; lāguores lenire: etiam si e-
nim homo inter omnia alia animalia dominetur, haud a-
liter quàm sol inter stellas, interq; metalla aurū (nullum e-
nim aliud est diuinius homine animal) tamē in terris nihil
est homine quoq; calamitosius. Ad hoc quoq; me incitauit,
quòd nihil magis in votis mihi fuerit in hoc breui vitæ cur-
riculo ab ineunte etiā ætate, quàm vt aliquo modo possem
præstare ne frustrà nat⁹ esse viderer in hoc pulcherrimo na-
turæ templo; in quē finem sæpius etiam genium defraudare
voluptatibus, & quæ ab aliis plurimi fiunt, negligere non
dubitaui. Atque iā dicta occasione, tandem mihi ipsi hanc
præsentē artis medicæ Praxim, ex Galeno, Hippocrate, (qui-
bus præcipuus debetur honos) Auicenna, Aëtio, Paulo Aegi-
neta, Gatinaria, aliisq; præstātissimis scriptorib. collegi, in
præsentemq; quem videtis ordinem redegei, ne librorum bi-

E P I S T O L A

bliothecā ubiq; locorum circumferre cogerer dū agris mihi
 inserviendum esset. Partim quoq; ut memoria cōsulerē, quæ
 ætate lægescere solet. In hoc autem libello, curandi rationē
 expressimus claram, breuem, methodoq; cōstantem, memo-
 riāq; quæ aliquāliter iuuare potest. medicamētā præterea
 ratione experientiaq; cōprobata, nec nō tuta, plurimisq; co-
 gnita & paratu facilia solummodò admittimus, quib. ni-
 hilominus grauissimi morbi possunt è corpore expelli, modò
 vniuersalia particularib. debita ratione accōmodētur: quod
 plenius in Vniuersali nostra medēdi Methodo indi-
 cabimus. iis quoq; efficere licebit ut sit mens sana in corpore
 sano; quo nihil mortalib. est expetendū magis, cūm alioqui
 pauper sanus magis sit felix quā diues affecto corpore. Id
 quoq; ex his laborib. mihi obtigit, quòd plurima passim ob-
 seruauerim quæ alioqui neglecturus, præteriturusq; eram.
 Internorum autem morborum hīc potius curādī rationem
 proponimus, eò quòd tum cognitione, tum curādī ratione,
 externis, iisq; quæ ad chirurgiam pertinent (quā suo quoq;
 loco pro nostro modulo exornare non grauabimur, si æquo
 has nostras primitias admiseritis animo) sint difficiliores.
 Medicamētorum quoq; repetitio hīc aliquoties fit in mor-
 bis diuersis, ut in exercitatis magis fiat clara atq; familia-
 ris, minusq; laboriosa nostra Praxis: id quod meo iudicio
 fieri nō poterat, si toties ad alia loca relegaremus lectorem,
 quoties alioqui id fieri licebat: in exercitatis enim cōpendia
 dispendia esse solent; iisq; nunquam bene dicitur quod satis
 nō dicitur. Hīc quoque passim simplicia addimus compo-
 sitis medicamentis, eò quòd sæpe præstantiorem edant affe-
 ctum simplicia, multis in vnum coactis medicamentis. Ad-
 de quòd cūm auxilia frequenter mutanda sint, & potissi-
 mum in cōtumacioribus morbis, ne vni assueta natura me-
 dica-

DEDICATORIA.

dicamento, illud tandem aspernetur, satis copiosam ubique eorum adducimus siluā. Ex Galeni autem, Hippocratis aliorumq₃ prestantissimorum medicorum fontibus, permulta huic nostræ Praxi inspersimus, iisq₃ parum immutatis, cum ea felicius, doctiusque proponi vix possint. A plurimis autē amicis frequenter expetita cum fuerit hæc nostræ Præxis (nō in eum reuera finem nata ut illam typographis cōmitterem) vobis viris generosis qui aliqualem cognitionem artis medicæ expetitis, quibusq₃ prolixa medicorum volumina euoluere nō licet propter alia studia atq; negotia, de quibus quoq; iudiciū ferre difficile vobis fuerit absque ope medici docti, quorum copia multis in locis cum denegetur, me meam dedicasse Praxim scito candide lector, nō autem iis qui lōgis laboribus, diuturnaq₃ experiētia in hac arte diuina satis profecerunt. Quamuis autē impossibile sit ut immortalis permaneat homo; tamen ut diutissimè viuat, posse multum, ne dicam mira præstare hæc nostram artem medicam (si principiis obstet, temporeq₃ debito admittat medicum, vniuersaliaq₃ particularib. debita ratione adhibeātur) verissima diuturnaq₃ experientia edoctus tum in me, tum in frequentissimo amicorum numero, idq₃ diuersis in locis, asserere etiam plurimorum testimoniis possum. Cum autem maxima sit ingeniorum varietas, nihilq₃ à quoquā hisce temporib. in medium proponi possit, quin suos habeat detractores atque zoilos; quibus facilius multò est reprehēdere quàm emendare (cum aliorum vituperare labores ars nulla sit) difficillimum mihi fuerit omnib. operam gratam præstare posse, præsertim cum pro nullo vitio à multis habeatur alienā proscindere famam, qui plurimum sibi quoque plaudunt, si doctiores, virtuteq₃ præcellentes, re vel minima reprehēdere possint. Quorum multi quoque sunt, qui

EPISTOLA DEDICATORIA.

in re parua magnas posse excitare tragædias gloriantur, modò inde commodum aliquaratione metiantur: quorum hominum ipse miram varietatem non ita pridem expertus sum. Cùmque hæc nostra tanta non sint, vt per se maleuolorum iniuriam euadere possint, mihiq; natura ingenium concesserit mite, simplex, animùmque innocentem; ego propterea multorum virorum consuetudinem imitari quoque decreui, qui vt tutius eorū scripta à calumniis & iniuriis defendantur maleuolorum, & qui ad cauendum fallendūque instructissimi sunt, præstantioris alicuius patroni vlnis ea commendare solent, cùm non minimam gloriæ partem viri natura præstantes atque generosi semper existimati sint, viros protegere doctos. Celebri autem tui nominis fama atque auctoritate adductus, Mæcenas illustrissime, sub tuo patrocinio hanc de internorum morborum curationibus Praxim, cum viris generosis atque beneuolis communicare non grauabor. Optimè autem mihi conscius sum, nullæ meæ esse merita quibus aliquid à te impetrare possim viro illustrissimo; meæ tamen quod ignoscas audaciæ, bonæ me animo esse iubet tua in omnes, etiam externos, beneuolentia. Adde quòd plurimùm me quoque incitat, quòd te ad heroicam aspirare virtutem, certò mihi persuasum habeam, eiúsque te ingenij esse constat, qui bene velis doctis & eruditis omnibus. Adde quòd diuinæ artis medicæ, omniumque aliarum scientiarum te candidissimum esse patronum, iam diu didici. Verùm subsistendum hîc in tuis laudibus mihi consultissimum esse existimo, proptereà quòd epistolaris breuitas non ferat ea quæ cum virtute commemorare liceret. Tibi, tuæque Celsitudini me meaque studia reuerenter commendo, tibi que omnem animi mei promptitudinem libentissimè offero.

Methodus



Methodus pro cognitione

C E P H A L A L G I A E

I N S E R V I E N S.



CEPHALALGIA est laboriosus sensus ipsius capitis, propter gravem eius mutationem aut tristem. Ab affectu ipso, & etiam ipsa parte affecta nomē inditum huic malo est. Contingit autem caput plus cæteris partibus doloribus torqueri, ita quidem ut vix vlla alia corporis pars doloribus ita oportuna sit: quod partim fit propter positionem; facillimè enim vapores acres humoresque turgentes ex inferioribus partibus eò impetum faciunt. Cum denique frigida humidæque admodum sit naturæ ipsum cerebrum, plurima in eo generantur excrementa: quæ si increcant, nec debito tempore excludantur à virtute expultrice, caput doloribus quoque perturbare solent. Dolor autem hic subinde exterius versatur, tuncque capilli exacerbantur si caput prematur: hæc autem nequaquam accidūt dum dolor intus existit. Si autem dolor hic vetustus sit, sæpiusque repetat, diūque perseveret, totūque caput occupet, aut maiorem eius partem, *Cephalea* dicitur. Alteram autem capitis partem si tantum occupet, *Hemicranæa* erit; subditarumque partium consensu. *Cephalea* autem proprio & primario fit capitis affectu. Vti autem dictæ duæ species, sic etiam dolor capitis ex febris occasione ortus, aut potatione strenua, aliave aliqua causa externa, *Cephalalgia* dicitur.

PARS AFFECTA. Membranz ipsius cerebri ut plurimum hîc afficiuntur: cum enim exquisitè sentiāt,

A j

in illis potissimum dolores fiunt, & quidem magna ex parte punctorij, vti substantiam cerebri dolor potius grauanse exercet; obtusum enim sensum consecuta est cerebri substantia. afficitur autem cerebrum aut per se, tuncque dolor magis est assiduus; alias verò per consensum subiectarum partium, à quibus leuia facile ascendant, & à cerebro facile admittuntur. Frequentissimè autem fit à ventriculi consensu propter sextum par nervorum illi implantatorum, tunc dolor minus est assiduus, sed per intervalla repetit potius, inualefcitque dolor incremento mali ipsius stomachi, vti contrà quoque leuatur, dū stomachus melius se habet. Solet quoque mitigari postquam cibum sumpserit æger; contrà verò exacerbari, si diutius in ediam pertulerit; humores enim crudi aut acres, tempore in edia à ventriculo attrahuntur à partibus vicinis, cerebroque communicantur vapores inde profusi. Sæpius quoque vteri fit vitio, tuncque potius in posteriori capitis parte dolor versatur quàm anteriori, per spinalem enim medullam cerebro noxa communicatur tunc. Solet tamen à posteriori capitis parte in alias quoque adiacentes noxa diffundi, quod sæpe fit in mensium suppressione, seminisve corruptione. Si ab alia aliqua parte fiat dolor, ex propriis signis innotescet. Solet autem cerebrum per communitatem læsum, tandem etiam per essentiam affici; longo equidem dolore, contingit cerebrum subinde ita debilitari, vt facile recipiat superfluitates aliarum partium. Hinc quoque contingit spiritus resolui, vnde virtus digestiua debilitatur, temperiesque immutatur, vnde quàm plurima excrementa in cerebro generantur.

SIGNA; Ex ægri querimoniis, subiectisque, constat huius mali præsentia.

CAUSÆ; Sæpe excitatur à frigida pituitosâque materia, tuncque dolor grauanus, aliquando etiam multum vehemens, si subirò scilicet inuadat, excitatur, faciei que pallor adest, vsus ciborum humidorum frigidorumque præcessit, humidi frigidique temperamenti est. Solet
autem

autem hæc materia, ob crassitiem atque viscositatem, obstruendo angustos meatus capitis, dolorem excitare. Aliàs à copia fit sâguinis, totiusve plenitudine; id quod victus ratio, temperamentum, ætas, cæli status, & reliqua quæ sanguinem augere possunt, indicabunt. Rursum fit hoc à mensib. hæmorrhoidibûsve suppressis, nec non à sanguinis suppressione, qui erûpere solebat suis temporibus; tunc gravitatis distentionisque sensus cum dolore, caliditateque, idque maxima ex parte in fronte aderit: vrina intensi est coloris, rubedo in facie oculisque observatur. Aliàs fit à sanguine bilioso atque tenui, cuius parva quantitas maximos sæpe dolores excitat; fit tunc absque gravitate dolor mordax, acutus, perforans, pulsans valide, erodens, & ut plurimum in dextra capitis parte; oris amaritudo, vigilæ, capitisque ardor magnus concurrunt. Contingit aliàs quoque à copia spirituum immodica, seu à materia multum flatuosa dum redundat, dolorẽ capitis excitari, quæ per minimas vias facile penetrare potest, & per nervos, membranas, arterias, venasque, necnon intra membranas & ossa se infinuat, sicque distensione separationem partium coniunctarum moliantur; tuncque fit dolor in capite distendens sine gravitate, & sonitus aurium, qui stasis sæpe diei horis recurrit, magnaque ex parte per consensum fieri solet hic dolor. Aliàs quoque ab intemperie notabili calida aut frigida vehementissimus sæpe dolor in capite oritur. Non ita diu tamen durare capitis dolores solent ex sola intemperie orti, quin humorum colligatur copia, à qua dolor etiam fieri solet: & potissimum hoc fit si diu duret dolor, corpusque plethoricum aut cacochymicum sit. Cum calida autem intemperie concurrat dolor magis intensus quàm cum frigida, capitis quoque calor adest notabilis, oculorumque rubedo; à frigidis levantur. Contrarium in frigida capitis intemperie evenit, quæ validissimum etiam dolorem excitat, & magis diu durare solet, quàm qui à calida intemperie fit. Ex sicca autem intemperie non ita validi oriuntur dolores.

eò quòd subitò non inducatur, sed solent esse lenti ló-
gique: calor quoque non ita hic molestat, sed capitis cu-
tis magis sicca per sentitur. ab humectantibus leuantur,
ab exsiccantibus verò offenduntur. Ab humida autem
intemperie dolor non excitatur per se, eò quòd violen-
tam repentinámque mutationem in parte simili effi-
cere nequeat per se, nec continuitatem eiusdem solue-
re potest, nisi copia humorum concurrat.

PROGNOSTICA. Vetus capitis dolor ex frigida
materia ortus; difficillimè sanescit, & potissimùm in se-
nibus. Dolor autem capitis continèter excrucians, som-
nùmque auferens, periculo haud vacat; insaniam enim
in proximo esse significat, & maximè si vomitus acce-
dat æruginosus. Item surditatem, phrenitidem, aposte-
ma, spasmus, singultúmque minatur dolor capitis si
grauiter vrgeat, neque curatione sanescat, sed potius in-
crescat. Magno dolori capitis si distensio nervorum cõ-
currat, summum periculum ostendit. Quicumque sani
dolore capitis repètè corripuntur, & statim mutescunt
& stertunt, in septem diebus moriuntur, nisi febris ap-
prehenderit. Cùm caput parte aliqua, vel circumcirca
dolet, si pus, vel aqua, vel sanguis è naribus, ore, aut au-
ribus exit, scire licet malum solui. Dolor quoque capi-
tis qui à principio non fuit, certum est indicium futu-
ræ crisis per vomitum, aut sanguinis fluxum è naribus,
eiq; dolori curatio molienda non est, ne prohibeamus
sanguinis eruptionem, quæ naturæ prouidentia insti-
tuitur, morbúmque aut soluet, aut saltem leuabit.

Methodus pro curatione

CEPHALALGIÆ FRIGIDÆ INSERVIENS.

Perficitur autem sequentibus remediorum generibus.

VICTVS RATIONE.

AER sit calidus atque siccus, aut arte aut natu-
ra. Cibus.

Cibus. auium montanarum carnes, item gallinarum, caponum, oua forbilia. assæ autem carnes elixis meliores.

Coquantur alimenta cum betonica, maiorana, serpyllo. Inter fructus conueniunt amygdalæ dulces, pistaciæ, vuarum passæ.

A cibo, diacidonites cum speciebus sumat non nihil. Potus sit vinum tenue: parum quoque bibere poterit vini potentis. Aliquando bibat haustum mulsæ, cui aliquid nucis muscatæ, nec non piperis immitemus. Motus exercitiūque sit mediocre.

Somnus sit mediocris, & elato coopertoque mediocriter capite quiescat.

Vomitum hic vitandum, nisi per stomachi communionem caput doleat.

Animi accidentia vitentur: leuis interim cura non hic ut in Cephalea biliosa est noxia.

PRÆPARANTIBVS.

Syr. de hyssopo, de radicibus acori, de betonica, stœchade.

Mel rosatum. Syr. acetosus simplex. Oxymel simplex, scyllicum & compositum.

Aqua hyssopi, betonicæ, maioranæ, saluiæ, melissophylli.

Decoctum ligni guaiaci cum rebus capitalibus.

Decoctum betonicæ, hyssopi, apij, fœniculi, saluiæ, maioranæ, melissophylli, pulegij.

Decoctum florum stœchados cum melle.

Per plures autem dies materia mali istis concoquenda erit, antequam eradicatione vacuabitur; humores enim crassi, viscidis atque lenti grauiorem ferè atq. contumaciorem morbum alunt. Si tamen admodum egrum affligat, tunc vacationem eiusdem instituemus, non expectando concoctionem.

VACVANTIBVS.

Venæ sectio fiet si plethoricum corpus sit; alioqui in crassis, viscidis, multumque frigidis humoribus vena

A iij

nō secabitur; periculum enim est, ne frigidus affectus incrementum sumat. Secabitur autem Cephalica dextri brachij: hinc si malum perseveret, venam frontis secabimus, & potissimum si in posteriori parte capitis dolor hereat. Propter autem humorum crassitiem, satis amplum vulnus instituetur.

Electuarium Indum, diacatholicum, diaphœnicum.

Pulvis senæ præparatæ, plurimum hîc valet.

Hiera simplex diacolocynthidos, logodali, agaricus trochiscatus.

Pil. de agarico, alephanginæ, coccinæ, arabicæ, fœtidæ, masticinæ, assaieret.

Agaricus. Turbith.

Potio ex rad. acori, betonica, hyssopo, roremarino, stœchade, seminibus anisi, fœniculi, vuis passis, glycyrrhiza, floribus violarum, buglossæ, polypodio, sena, nuce muscata, cinnamomo, diaphœnicone.

Potio ex ligno guaiaco, rebus capitalibus, sena, polypodio.

Clystere ex decocto betonicæ, maioranæ, stœchados, foliorum meliloti, maluæ, brassicæ, addito melle rosato, diaphœnicone, oleo rosato, sale, hiera diacolocynthidos.

Proderit laborantibus hoc malo, non semel, sed bis aut ter purgare, eò quòd pedetentim purgando humores concocti facilius medicamento obediant. Crassi enim & tenaces humores subite purgationi non cedunt. Potius autem pillulæ quàm electuaria conveniunt, eò quòd plenius meliùsque à partibus distantibus attrahant quàm electuaria.

AVERTENTIBVS.

Clystere prædictum. Eo purgantis medicamento vice convenientissimè utemur, materiam equidem deorsum sic reuellimus, doloréque qui à vaporibus sursum elatis ob alui suppressionem excitatur sedabimus.

Venæ sectio.

Lotio.

Lotiones crurum ex aqua calente.

Sanguifugæ venis eminentibus circa locum affectum applicabuntur, aut extremitati nasi.

Suppositoria fortia.

Ligaturæ dolorificæ fiant partium oppositarum, necnon earundem frictiones validæ.

Fomentationes quoque earundem partium ex decocto saluæ, hyssopi, maioranæ, aliisque herbis capitilibus.

Sternutatorium ex pyrethro, pipere, castoreo, nigella, elleboro albo, succo maioranæ, betonicæ, cyclaminis.

Nasale vel errhinum ex staphisagria, nigella, hiera picro, succo iridis, pipere, aurea Alexandrina, elleboro, euphorbio, pyrethro, castoreo, cyclamine, sinapio, aqua maioranæ.

Apophlegmatismus ex mansu hyssopi, condisi, pyrethri, piperis, staphisagriæ, glycyrrhizæ, mastices, vuarum passarum, maioranæ, pauco melle addito.

Gargarismus ex vino rubro, in quo decoquantur radices pyrethri, glycyrrhizæ, folia hyssopi, betonicæ, sinapium, melle rosato addito.

Summè conueniunt diuersiones omnes in dolore capitis, à quacumque tandem etiam foueatur causa. Magna tamen cum cautela gargarismatibus atque apophlegmatismis vtemur si pulmonum adsit affectus, aut si æger catarrho sit subiectus. A partibus autem propinquis incipiemus, & paulatim ad magis remotas transibimus.

ROBORANTIBVS, resoluentibusque reliquias, intemperiemque relictam emendantibus.

Diacuminum, aurea Alexandrina, diacastorium, theriaca, Mithridatum, cum aqua betonicæ.

Aromaticum rosatum, diacorum, pleresarconticum, diambra.

Diamuscum dulce & amarum.

A iij

Saccarum maioranæ, betonicæ, roris marini.

Conserua anthos, acorus conditus.

Decoctum ligni Guaiaci cum floribus cardui benedicti plurimum valet, tam in Cephalæa quàm Hemianæa.

Cubebe, muscus, maiorana, ambra, nux muscata, cinnamomum.

Epithema fronti fiat ex stillaticio liquore vini.

Lotio capitis ex lixiuio, in quo betonicæ, maioranæ folia, & flores meliloti, camomillæ infusi aliquot horis fuerint.

Irrigationes capitis fiant ex decocto foliorum lauri, florum betonicæ, maioranæ, meliloti.

Balneæ piperinæ mirificè doloribus capitis auxiliantur.

Orbiculus odoriferus ex cinnamomo, caryophyllis, stœchade, foliis lauri, maiorana, mastice, nuce muscata.

Vnguenta ex oleo irino; rutaceo; liliorum; anethino; camomelino; quibus tum frontem, tum narium meatus inungemus.

Emplastra ex rad. cucumeris asinini, & absinthio.

Ceratum ex euphorbio in antiquis capitis doloribus, veteribus comprobatum est medicamentum.

Plurimum hæc medicamenta cerebrum ipsum roborant intemperiem eius frigidam auferendo. Præcipue autem id præstabunt si sumantur ventriculo mediocriter vacuo, quo etiam tempore ea quæ extrinsecus applicari solent, admouenda erunt; alioqui vapores in caput facile prolicient ex infernis partibus. In declinatione autem & in fine declinationis, vtemur digerentibus roborantibusque annexis medicamentis.

Theorica

Theorica & empirica medicamenta nobilia,

I N

CEPHALALGIA FRIGIDA,

SÆPIVS CVM SVMMÀ SALVTE

plurimorum ægrotorum à Gual-
tero Biuel *experta.*

CVRATIO CEPHALALGIAE FRIGIDAE. R. foliorum saluæ, betonicæ, rutæ, maioranæ ana m. j. florum stœchados, centaurei minoris, ana p. j. maluarum, meliloti, althææ ana m. j. β. leminum anisi, fœniculi ana ʒ β. nucis muscatæ, cinnamomi ana ʒ ij. colocinthis ʒ β. coquantur in aqua quantum satis ad lb j. β. colaturæ adde electuarij elefcopi ʒ β. Sp. benedictæ laxatiuæ ʒ j. diaturbith cum rhabarbato ʒ iiij. mellis rosati colati ʒ j. olei rutacei, laurini ana ʒ j. β. salis ʒ j. fiat *Clystere*, detur ante prandium hora conuenienti.

R. oxymellis compositi ʒ iiij. syrupi stœchados ʒ j. decocti stœchados, betonicæ, rorismarini ʒ x. sumat ʒ iiij. per aliquot dies. aut R. radicum graminis, asparagi, petroselini ana ʒ j. foliorum saluæ, verbenæ, betonicæ, hyssopi ana m. j. endiuæ m. j. β. glycyrrhizæ rasæ ʒ β. seminum petroselini, anisi ana ʒ vj. florum rorismarini, stœchados ana p. j. nucis muscatæ numero ij. coquantur in aqua q. s. ad lb j. β. colaturæ addantur oxymellis squillitici ʒ ij. syrupi stœchados ʒ j. fiat *Potio*.

R. radicum acori ʒ j. asparagi, petroselini ana ʒ j. β. betonicæ, maioranæ ana m. j. β. vuarum passarum enucleatarum ʒ j. seminum api, anisi ana ʒ iiij. florum buglossæ m. j. rorismarini m. β. senæ Alexandrinæ ʒ j. agarici albi & leuis ʒ vj. turbith albi & gummosi ʒ j. ziberis albi ʒ ij. β. coquantur in sufficienti quantitate

aquæ ad lb j. colaturæ addatur mellis rosati, syrupi Byzantini ana ʒ j. sacchari albissimi q. s. fiat *Potio*, sumat in aurora ʒ iiij.

R̄. pillularum de agarico, cochiarum ana ʒ β. diagridij g. iiij. syrupi stœchados q. s. fiant *Pillule* septem, aut octo.

R̄. agarici trochiscati, hieræ diacolocinthidos ana ʒ j. β. nucis muscatę gr. octo, syrupi stœchados & absinthij ana q. s. fiant *Pillule* octo. Aut harum loco sumat diacatholiconis, electuarij Indi ana ʒ iiij. β. fiat *Haustus* cum aqua betonicæ. Aut R̄ diaturbith cum rhabarbaro, electuarij elefcopi, diacatholico ana ʒ ij. β. syrupi stœchados, oxymellis simplicis ana ʒ β. decocti betonicæ, saluæ q. s. fiat *Haustus*, detur in aurora.

R̄. diamusci dulcis ʒ j. diamargariti calidi ʒ β. diambra ʒ ij. aquarum betonicæ, & sacchari albissimi q. s. fiat *Electuarium in tabulis*: detur tabella vna sumpto syrupo.

R̄ Sp. pleresarchontici, diagalangæ, diamusci dulcis ana ʒ ij. β. radicum enulæ campanæ ʒ j. β. conferuæ anthos ʒ j. syrupi stœchados q. s. fiat *Electuarium* in forma opiati.

R̄ conferuæ anthos ʒ j. β. acori ʒ β. aurę Alexandrinę, aromatici rosati, mithridatici ana ʒ j. syrupi stœchados q. s. fiat *Mixtura*, dosis ʒ j. cum aqua betonicæ.

R̄ Sp. diamusci dulcis, diambra ana ʒ j. dianthos, cinnamomi optimi ana ʒ β. nucis muscatæ, macis, seminum foeniculi ana ʒ j. sacchari albissimi dissoluti in aqua betonicæ, & rorisinarini ana q. s. fiat *Electuarium in tabulis*; sumat horis tribus ante pastum morsellum vnum. In eundem finem R̄ Sp. diambra, diamusci dulcis ana ʒ j. conferuæ rorisinarini, florum saluæ, acori ana ʒ β. mastice, cinnamomi, corticum mali citri ana ʒ β. syrupi stœchados q. s. ad consistentiam electuarij mollis.

R̄ nucis muscatæ ʒ ij. ellebori albi, pyrethri ana ʒ β. nigellæ, maioranæ ana ʒ j. β. castorei ʒ j. mosci gr. j. fiat

j. fiat *Pulvis sternutatorius*; pauxillum eius calamo in nares insuffletur.

℞ hyssopi, maioranæ, betonicæ ana m. j. staphisagrie 3 vj. sinapis, piperis longi, pyrethri ana 3 j. β. coquantur in aqua q. s. ad tertias decocti accipiatur ℥ j. oxymellis simplicis, mellis rosati ana 3 j. fiat *Gargarismus*, quo manè utetur ante pastum.

℞ pulueris seminum staphisagrie, nigellæ ana 3 ij. nucis muscatæ, piperis ana 3 j. scammonij 3 β. succi maioranæ, mellis despumati ana q. s. fiat quasi *Linimentum*; quo narium interiora inungantur.

℞ rorismarini m. ij. betonicæ, maioranæ ana m. j. camomillæ, meliloti, origani ana m. j. β. coquantur in aqua quantum satis ad tertias, sub finem adde aliquid vini stillatici; fiat *Embrocha vel irrigatio*.

℞ olei chamæmelini, liliorum ana 3 j. de euphorbio 3 j. nucis muscatæ, florum stœchados ana 3 ij. s. ceræ parum; fiat *Unguentum*, tempore vsus dissoluatur cum pauca quantitate aquæ vitæ; qua sola subinde quoque caput irrigandum est.

℞ olei liliorum alborum 3 j. olei anisi 3 j. nucis muscatæ 3 β. cum bombace excipiantur, auribusque iuxta mentum superponantur.

℞ olei liliorum alborum, laurini, rutacei ana 3 vj. vitrioli Romani modicè vsti 3 iiij. ceræ & croci nonnihil, fiat *Unguentum*, quod in contumaciori capitis dolore admodum est efficax.

℞ florum stœchados, rorismarini, saluiæ, betonicæ, maioranæ, origani, absinthij sicci ana m. β. nucis muscatæ, maceris, ana 3 j. conterantur vnâ, sericòque panno rubeo insuantur; fiat *Sacculus* ad modum pileoli; per duos aut tres menses utatur, qui subinde aspergetur vino stillaticio.

APPENDIX

Ad prædicta pro curatione CEPHALALGIAE
FRIGIDAE inseruiens.

Omniū primò ventris regio expurganda est clysterio. Hinc incidentibus medicamentis, si materia mali lenta viscosaque fuerit, naturæ obediens reddetur. Postea humores è corpore deturbabimus, à capiteque eorum impetum auertemus. Quibus peractis caput roborabimus, reliquiasque consumemus. Quæ omnia nunc, anteaque dictis medicamentis felicissimo cum successu consequi poterimus, modò uniuersalia particularibus debita ratione accommodentur. Hic quoque notandum, quòd prædicta medicamenta conueniunt in Cephalea & Homicranica, fortiora interim esse debent, & potissimum topica medicamenta, eò quòd contumaciora sint mala. Inter reliqua autem præderit cauterium aut actuale, aut potentiale. Dolorem capitis à morbo Gallico prouenientem suo loco tractabimus. Si ratione febris fiat, ea curanda primò erit. Si ex mora quam sub radiis solaribus fecit, dolorem contraxerit capitis, ex oleo rosaceo & aceto, necnon aqua rosacea fiat mixtura, in qua madefacti panni capiti dolenti applicentur actu frigidi. Somnus imperetur longus.



Methodus pro cognitione

PARALYSIS INSER- VIENS.

PARALYSIS est sensus & motus priuatio, nō quidem totius corporis, quemadmodum fit in apoplexia, sed ubi alterum latus, aut partes omnes corporis quæ sub capite, aut aliud aliquod membrum sensu motuque destituitur, uti est maxilla, lingua, oculus, pes, manus, brachium, labrum. Sæpe quoque accidit partem aliquam sentiendi facultate priuari, illæsa morrice, & contra, sensu integro permanēte, motus perit. Subinde quoque contingit, nec sensum nec motum auferri omnino, sed tantummodo hebescere, & torpore stuporeque corripī, hancque partem imperfecta paralyti laborare dicimus, estque

estque nuncius paralyfis. Cum autem per vnum tantum neruum motus & sensus distribuitur, contingit quidem motum auferri permanente sensu, eò quòd membris sæpe duri inferantur nerui, qui si paruam noxam perpetiantur, sentient quidem, eò quòd parum facultatis portio sufficiat, vt sensus perficiatur, tactionis enim sensus potius pati aliquid videtur quàm agere; vt motus verò perficiatur, plurima indiget animali facultate; vnde parua noxa motum citius abolebit, quàm sensum. Cur autem subinde sensus pereat, permanente motu, accidit propterea quòd aliquæ partes duplici genere neruorum participant. Familiare autem est hoc malum apoplexiæ, à debili enim apoplexia aliquando fit, diciturque tunc Paraplexia. Hac autem ratione differt ab Apoplexia: In hoc equidem malo omnes in vniuersum corporis partes sensum & motum amittunt, etiam ipsum caput, in paralyfi verò contingit ipsum caput magna ex parte sentiendi mouendique virtutem habere, reliquæ verò partes corporis, sensum motumque amittunt, idque diuersimodè. Si enim principium spinalis medullæ afficiatur, omnes partes sub facie constitutæ, sensu motuque destituentur. Si verò eiusdem pars dimidia afficiatur, omnes annexæ partes eiusdem lateris sensum motumque amittent. Si verò illæsis prædictis partibus, particularis alicuius partis nervus resoluator, pars ea quoque sensu motuque priuabitur, cui nervus ille implantatur, illi sensum motumque conferens.

PARS AFFECTA. Sæpius hîc principium spinalis medullæ, omnium neruorum primaria origo grauissimè offenditur potius quàm cerebrum, tuncque facie illæsa, omnes capiti subiectæ corporis partes afficiuntur; alias verò apprehendit eiusdem spinalis medullæ dextram vel sinistram partem, vnde corporis partes dextræ vel sinistræ sensu motuque destituuntur. Contingit autem vnus lateris aliquando omnes partes sensu motuque priuari, illæsis alterius lateris partibus, propterea quòd spinalis medulla, vt cerebrum in duas medietates diui-

ditur secundum totam longitudinem spinæ, vnde dextri nerui separantur à sinistris membranula quadam, interim obscura; sicque prout obstructio neruorum, in dextra aut sinistra parte aut vtrisque fuerit; sic quoque paralytis fiet lateris dextri aut sinistri, aut vtriusque. Subinde etiam cerebrum hinc afficitur, non quidem secundum totum, cum sic apoplexia excitaretur, sed secundum eius aliquam partem dextram vel sinistram, tuncque faciei partes quoque resoluentur dextræ vel sinistræ, & cum eis reliquæ partes corporis eiusdem lateris. Dum pars aliqua faciei sensu motuque priuatur, nerui qui à tertia coniugatione, cerebri oriuntur, afficiuntur. Aliquando verò aliqua determinata corporis pars sensu motuque destituitur, quod fit propter alicuius nerui, qui à cerebro, aut ab aliqua parte ipsius spinalis medullæ oritur, resolutionem, à quo sensum motumque suscipit pars resoluta. vnde diligenter in anatomicis laborandum, vt cognoscamus primam sedem mali, neruorumque omnium distributionem, & à qua spinalis medullæ parte neruos suos partes singulæ habeant. Est autem symptoma pertinens ad actionem laxam facultatis animalis motricis & sensitivæ.

SIGNA: Pars resoluta sua gravitate relabitur si attollatur, facileque refrigerat, mollis est, tempore quoque emarcescit. Urina in eis vt plurimum est alba, quandoque tamen ad rubedinem tendit, eò quòd in regione renum dolor magnus sit, vel eò quòd imbecilliores sint quàm vt sanguinem accuratè à serosa humiditate secernant. Si latus alterum corripitur, id sæpe frigidum est, altero ardesciente, oculus quoque lateris affecti minuitur. Si maxilla aliave aliqua faciei pars resoluitur, in aduersam sanam contorquetur. Pluribus indiciis ad huius affectus cognitionem non egemus, cum nullus ignoret partem eam paralyti laborare quæ motu priuata est. In hoc malo aliquando, vt antè diximus, sensus, integro motu, perit; aliàs motus aboletur, sensu superflite; frequenter vtrumque, dum scilicet consumma-

tum

tum est malum, tunc pulsus languidus, tardus, parvus atque mollis est.

CAUSA. Magna ex parte fit ab intemperie frigida & humida, aliàs fit ab apostemate, aliòve tumore comprimente neruum aut medullam. Sæpe quoque fit à vulnere, casu, fractura, vinculo arctiori, luxatione vertebrarum, percussione. Frequentissimè verò fit ab humoribus aquosis tenuibusque à cerebro sæpe deriuatis, qui in neruorum substantiam porositatésque se facile insinuant, sicque nervi nimium molles effecti resolvuntur & relaxantur, tantumque humoris imbibunt, ut obstruant neruorum principia, ita ut impediatur transitus animali facultati, quæ à cerebro tamquam primo principio originem habet; & tamquam radius inde efflorescit, & in partes inferiores diffunditur, sensumque partibus impartitur & motum, quo spiritu animali pars cum destituitur, quasi flaccida concidit, immobilisque permanet: cuius signum erit, si subitaneus eius sit aduentus. Si autem pars à nimia copia tenuium humorum plurimum intumescat, spasmus tunc excitabitur in parte ab huiusmodi humore. Æquè frequenter quoque fit à crassis humoribus, qui nervis impacti, obstructionem efficiunt, & sæpe quidem tantam, quòd spiritui animali transitus impediatur; unde nervi quoque flaccidiores fiunt, & quasi concidunt. à spiritibus quoque crassis idem malum fit aliquando; qui id sæpe quoque efficiunt, eò quòd maligna aliqua qualitate perfundantur, siue occulta, siue manifesta ea fuerit.

PROGNOSTICA. Paralysis ex nervi incisione pertransversum, incurabilis est. Paralysis hiemali tempore sæpius concitatur, & in senibus vix aut numquam curatur, eò quòd nativum calorem habent debilem admodum; unde eam frigidi crassique in illis generantur humores. Paralysis autem quæ in partibus fit, numquam est acutus, sæpe verò longus morbus. Paralysis sæpe ex debili fit apoplexia, & ne in hanc rursus terminetur, periculum est. Plus tempore æstatis, & veris.

quàm hiemali aut autumnali sperare licet, si rectè regatur æger. Si febris tremorve concurrat; pro valetudine est.



Methodus pro curatione

**P A R A L Y S I S I N S E R -
V I E N S.**

Perficitur autem sequentibus remedium generibus.

V I C T U S R A T I O N E.

A Er sit calidus & siccus, luculentoque comparetur foco, si tempus anni requirat, aut suffitu ex caryophyllis, roremarino.

Cibus sit calefaciens & siccans, carnibusque utatur assis pullorum, caponum, gallinarum, aucularum. oua etiam conueniunt sorbilia. A carne suilla, piscibus; sorbitionibus abstineat, aut saltem arte corrigantur. Sit autem ad diem decimum quartum victus valde tenuis: tolerare equidem famem & sitire plurimum in hoc morbo adiumenti præstat.

Potus sit exiguus, utaturque aqua mulsa, aut aqua cinnamomi, vino hippocratico.

Exerceat partes resolutas moderatè; maximè equidem prodent.

Somnus diurnus vitetur.

Aluus ut respondeat mediocriter, conandum.

Animi perturbationes fugiant.

P R A E P A R A N T I B U S.

Hydromel & oxymel ex decocto radicum ireos, saluiae, stœchados, nucis muscatae, cinnamomi.

Syrupus stœchados, de hyssopo, acetosus simplex, Byzanthinus.

Mel rosatum, oxymel squilliticum.

Aqua saluiae, rorismarini, betonicae, maioranae, melissophyli, primulae veris.

Potus

Potus ex decoctione saluæ, betonicæ, hyssopi, nucis muscatæ, caryophyllorum, cinnamomi, florum stœchados, rorismarini, radice acori; syrupo prædicto aliquo addito.

Per quinque vel sex dies humores extenuabimus, incidemus, expulsionique præparabimus, & primo lenioribus. Hinc vacuabimus, tunc rursus præparantibus utemur validioribus. Acetum autem recipientia hic non conueniunt, eò quòd acetum nervis sit inimicum, nisi alia permisceantur nervos corroborantia medicamenta.

VACUANTIBVS.

Venæ sectio fiet ipsius cephalicæ in latere sano, si à sanguine paralysis fiat, corpusque sit plethoricum. Sanguinis autem mediocris educetur quantitas, ne calor naturalis in frigido corpore frigidòque morbo extinguatur.

Potus ex radicibus acori, ireos, saluia, roremarino, betonica, floribus stœchados, lena, agarico, turbith, zinzibere, nuce muscata, cinnamomo, melle, saccharo.

Pillulæ coccia, assaieret, de agarico, alephagine foetida, mastichina, de sagapeno, de opopanace, euphorbio.

Hiera diacolocynthidos: Hiera picra Galeni; Hiera logodal.

Diacatholicum, agaricus trochiscatus.

Vomitùs & clysteres in hoc malo maximè laudantur semel in septimana.

Pillulis potius quàm electuariis utemur in hoc morbo, eò quòd à remotis partibus feliciùs materiam morbi attrahant. A lenioribus autem medicamentis purgantibus curam incipiemus, & porissimùm in graui paralysis; fortioribus enim non utemur antequam ad decimum quartum diè peruenetimus; tunc enim si lenioribus parum profecerimus, ad fortiora transire licebit.

REVELLENTIBVS.

Clysteres ex saluia, betonica, stœchade, origano, malua, camomilla, maiorana centaurea, minori, althæa, ruta, mercuriali, electuario elefcopi, hiera picra, benedicta

B

laxatiua, diacatholicon, oleo camomelino, liliorum, paulatimque validioribus vtemur.

Cucurbitulæ principio neruorum affigantur, sine scarificatione, sicque paulatim ad membrum resolutum transferantur, ut spiritus calorque natiuus ad ea trahatur, facultasque sopita exciteretur.

Ne autem vires dissoluantur, sit cucurbitularum mora brevis.

Masticatoria ex nuce muscata.

Gargarismata.

Nasalia.

Sternutatoria.

Frictiones siccae cum manibus vel panno calente, praestantissimae sunt.

Emplastrum e sinapi nucæ apponatur.

Hiscereuellentibus medicamentis non vtemur antequam ter aut quater purgatus erit æger.

CORROBORANTIBVS cerebrum & neruos, reliquiasque digerentibus & intemperiem emendantibus.

Theriaca & mithridati vltus hic plurimum iuuare constat. aurea Alexandrina, aqua theriacalis.

Diarhodum abbatis, pliris archonticum, diamuscum dulce, diambra, rosata nouella, confectio anacardina.

Acotus conditus. Zinziber conditum. Pyrethrum conditum. Diacastorium. aqua mentalis nostræ descriptæ magnarum hic est virium.

Conserua saluæ, betonicæ, anthos, florum stœchados, enulæ campanæ, galangæ, estque præstantior aliis.

Pillulæ fiant e castoreo, assa foetida, nuce muscata. Columbrarij aer à proprietate occulta valet.

Nux muscata ore detineatur & masticetur. Cerebrum leporis assum.

Decoctum ligni guaiaci, sarseparrille, cynæ cum melle in contumaciori paralyti.

Decoctum radicis acori, ireos, zedoariæ, zinziberis, stœchados, saluæ exciccatæ, hyssopi, maioranæ, rotismari-
ni, cha-

ni, chamæpitys, nucis muscatæ, caryophyllorum, radicis cynæ, ligni guaiaci, mellis.

Fomentario fiat partis cum decocto maioris tithymali; hincque decoctum totum superponatur; vel ex oleo fiat calente.

Balneum fiat pro parte affecta ex decocto vulpis, cuius calente pars quoque cooperienda erit; ante tamen oleo vulpino inungatur, idque post usum balnei fiat. aut huius loco utatur balneo sulfureo aut nitroso; lutum autem horum balneorum magno cum commodo accommodabitur parti quæ omnium primario afficitur.

Hypocaustum vel stufa sicca fiat cum vasculo idoneo, quod bis in die ingreditur, mane scilicet & vespere, imponenturque lapides igniti vino calido irrigati. Post exitum autem hypocausti vel balnei, componat se in lecto ut sudet. Quod ut maiori cum commodo fiat, sumet 3 j. theriacæ veteris, & origo nervuorum aliquo unguento conuenienti ungatur. Poterit quoque balneum siccum fieri cum decocto aliquo conuenienti, quod in vasculo ponatur, carbonibusque circumdetur; hinc fistula in tinam conuenienter coopertam deducatur vapor.

Unguentum Agrippæ, Martiatum, de bdellio, Unguentum ex oleo vulpino, de castoreo, nuce muscata, oleo nardino, oleo ex piperibus, camomelino, liliorum, pulvere lumbricorum, galanga, pipere, melle, oleo rutaceo philosophorum, hypericonis, laurino, terebinthino, costino, bdellio, aqua vitæ, oleo sulfuris.

Usus calidorum medicamentorum nimius resolutionem inducit. Vnde nec olea multum calentia exsiccantiaque admittentur cum commodo. Resoluentibus autem medicamentis non utetur antequam sæpius purgatus fuerit, ad minimum quidem quater. Huic autem remediorum generi frictio peroptime adnumerari poterit. Circa ea autem medicamenta quæ exterius applicantur, animaduertendum est, quod diligentissime inquirere debemus partem primario affectam; illi enim

potissimum adaptanda sunt medicamenta; non autem partibus secundo affectis.

THEORICA ET EMPIRICA ME-

*dicamenta nobilia in PARALYSI saepius cum
summa salute plurimorum egrotorum a Gualtero
Bruele experta.*

CVRATIO PARALYSIS.

℞ saluæ, maioranæ, hyssopi, calaminthæ, centaurei minoris ana m. j. sem. garici albi & leuis 3 sem. florum camomillæ, meliloti, stœchados ana m. j. coquantur in sufficienti quantitate aquæ ad ℥. j. colaturæ addatur benedictæ laxatiuæ, electuarij eleuscopi ana 3 vj. olei lili-
liorum 3 iij. vini maluatici 3 iij. sem. salis communis 3 sem. misceantur, fiat *Enema*, quo bis in septimana uter-
tur, donec sanitatem consequatur.

℞ syrupi stœmachados 3. ij. mellis rosati, syrupi de hyssopo ana 3 j. decoctione saluæ, aquarum hyssopi, rorismarini ana 3 iij. fiat *Iuleb*.

℞ hyssopi m. iij. sem. saluæ, rorismarini ana m. j. co-
quantur in aqua q. s. ad tertiæ partis consumptionem. colaturæ addatur mellis q. s. fiat aqua mellis; utatur pro
potu mense vno cum dimidio.

℞ radicum angelicæ 3 sem. aristolochiæ rotundæ 3 iij. acori 3 j. saluæ, maioranæ, betonicæ, ana m. j. sem. florum stœchados m. sem. senæ Alexandrinæ 3 j. sem. garici albi & leuis 3 j. sem. cinnamomi, zinziberis ana 3 j. coquantur in aqua q. s. ad ℥. j. sem. colaturæ ad-
dantur syrupi stœchados 3 iij. fiat *Potio*.

℞ pillularum de euphorbio, foetidarum ana 3 sem. cochiarum, turbith electi ana 3 j. castorei 3 se. diagridi j granatris. fiant *Pillule*, sub ingressum lecti sumantur.

℞ agarici trochilicati 3 j. hieræ diacolocynthidos 3 j. sc. nucis muscatæ 3 se. conferuæ anthos q. s. fiat *Bolus*.

℞ pillularum de opopanace 3 ij. foetidarum, castorei
ana gr.

ana gr. xij. fiāt *Pillule*, ter in septimana iis vtatur, aut bis.

℞ seminis sinapi, staphisagriæ ana 3 j. pyrethri 3 j. se. turbith 3 iiij. rutæ, saluiæ, hyssopi ana m. ij. se. fiat decoctio in aqua q. s. ad lb. j. se. addendo oxymellis simplicis, squillitici, mellis rosati ana 3 j. fiat *Gargarismus*.

℞ nigellæ Romanæ 3 j. cyclaminis 3 sem. piperis albi, castorei ana 3 j. misceantur cum melle, eoque nares illinantur, vt sternutamenta prouocentur.

℞ nucis muscatæ, pyrethri, seminum staphisagriæ ana 3 j. sem. hyssopi 3 ij. piperis albi, vuarum pastorum ana 3 j. cum melle q. s. fiant *Pastilli mansiles seu masticatorium*.

℞ oxymellis squillitici 3 ii. decoctionis raphani & sampsuchi 3 vi. olei nardini 3 i. sem. miscantur; fiat *Vomitorium* medicamentum; iuuetur æger cum pluma in oleo intincta, si opus erit.

℞ conferuæ acori, rorismarini ana 3 j. diacastorei 3 ii. theriacæ veteris 3 ii. sem. confectionis anacardinae, diamusci dulcis ana 3 iii. fiat *Mixtura*, sumat manè, nec non sub noctem alternis diebus quantitatem quæ nucem castaneam æquet.

℞ theriacæ 3 i. aquæ vitæ, succi betonicæ ana 3 i. sumat bis in septimana.

℞ conferuæ florū saluiæ, anthos ana 3 i. radicis enulæ campanæ cōditæ, zinziberis cōditi ana 3 se. theriacæ andromachi, mithridati ana 3 i. se. nucis muscatæ 3 i. syrupi stœchados q. s. fiat *Conditum*; dosis 3 se. sub ingressū lecti.

℞ conferuæ florum saluiæ 3 i. rorismarini, radicum acori ana 3 sem. nucis muscatæ, piperis, caryophyllorum ana 3 ii. syrupi stœchados q. s. fiat *Mixtura*; detur 3 i. post prandium.

℞ mithridati 3 i. theriacæ 3 i. aquæ saluiæ 3 iiij. fiat *Haustus*.

℞ olei terebinthinæ, petrolei, latericii, vulpini ana 3 sem. de castoreo, lumbricorum terræ ana 3 iii. mastichini 3 i. se. pyrethri 3 i. saluiæ, nucis muscatæ ana 3 i. se. gummi ammoniaci 3 i. se. castorei 3 se. dissoluantur in vino, & cū sufficienti quantitate ceræ fiat *Vn-*

B iiij



guentum molle; quo vnges membra resoluta, & initium neruorum, posteaquam eadem prius inunxeris aqua vite, primòque fricentur partes dorsi & colli cum panno aspero. Sequenti tamē vnguēto omnium primò vti poterimus.

℞ olei camomelini, nardini ana 3 vj. liliorum, terebinthine, axungie vulpine, olei lumbricorum terre ana 3 sem. aque vite 3 vj. cere q. s. fiat *Vnguentum*; quo inungēde sunt partes que mouendi sensum amiserunt; nec non eę que iisdē sentiendi vim impartiuntur; hinc cooperturis à frigore defendantur quam optimè.

℞ olei camomelini 3 iij. liliorum 3 j. eo quoque solo origo neruorum inungetur corpore purgato. aqua etiam ardenti sola, membra affecta inungi multum prodest, si validiusculè illud fiat.

℞ granorum piperis, iuniperi, sinapis ana 3 ij. fructuum anacardini 3 sem. radicum pyrethri, salis ammoniaci ana 3 j. sem. in vini ardentis 3 iij. maluatici 3 viij. olei terebinthini, laurini, petrolei ana 3 ij. ad vini consumptionem bulliant, addendo castorei, euphorbij, galbani, myrrhe, bdellij ana 3 j. sem. cere q. s. fiat *Vnguentum* molle; postea pars operietur pelle vulpina. Omnium tamen primò fricabitur locus affectus singulis vicibus panno calente. Ex vulpe catulisque exenteratis excoriatisque balneum fiat pro partibus resolutis, spinalique medulla, addendo saluiam, hyssopum, lauri folia, stœchadem, rosmarinum, radices pyrethri, aconi, ireos, enule campane, flores camomille, melilori.

℞ olei hypericonis, liliorum, camomille ana 3 ij. lateritij, terebinthini, vulpini ana 3 j. sem. lana carpta iis imbuatur, partesque affectę iis foueantur, hinc contendantur; fiat autem inunctio ad ignem.

℞ foliorum lauri, saluie, hyssopi ana m. ij. coquantur in vino: quo liquore lapides igniti in vasculum aliquod idoneum immissi, conspergantur, sicque eger in hypocausto conuenienti aërem admittat quàm poterit diutissime manè & vespere. Sub exitum hypocausti sumat 3 j. theriace magnę, sicque lectum calentem ingre-

ingrediatur ut sudare possit. Post horas tres principium spinalis medullæ inungatur unguento dicto.

R² foliorum rutæ, lauri, hyssopi, hyperici, soluiæ ana m. j. ß. florum stœchados, spicæ ana m. ss. castorei 3 j. nucis muscatæ, caryophyllorum, macis ana 3 ss. omnibus in puluerem reductis, fiat *Sacculus*.

APENDIX AD PRAEDICTA.

Enemate clementiori alius subducenda est omnium primâ. Deinde per quinque vel sex dies, ea quæ materiam præparare possunt, propinanda sunt; deinde clementer purgantia præscribuntur antequam humores aliò deriuentur; hinc per aliquot dies abstineat à præparantibus purgantibusque medicamentis. Interim humores qui ad partem affectam ruunt, distrahantur clysteribus, gargaribus, maribus, sternutatoriis vomitoriisque medicamentis. Postea iterum medicamenta quæ humores naturæ obediens reddere, concoctosque expellere possunt in usum reuocabuntur; pauloque validioribus tunc utemur medicamentis. Postea pars resoluta corroborabitur, reliquisque consumentur. Hinc iterum ab aliis abstineat medicamentis per aliquot dies, sed hæc in septimana vacuetur enemate conuenienti; denuoque ad præparantia purgantiaque confugiendum erit. Interea quoque temporis cucurbitulæ principio spinalis medullæ affigenda sunt, sic equidem sensus ad partem affectam reuocatur. Pro curatione particularis partis resolutæ, obseruandum ut topica medicamenta ponantur supra partem, à qua nervus resolutus oritur non toti spinæ, neque cerebro. Hoc quoque adiiciendum est, quod ea quæ spiritus atque sanguinem allicere possunt ad partem affectam. (uti sunt dropaces ex pice sale sinapio) superponenda sūt parti affectæ. Prædicto quoque modo curabimus stuporem si aliquam corporis partem opprimat, cum quasi diminuta quedam paralyssis sit: leuioribus id interim debet fieri remediis. Si paralyssis fiat à mala complexione frigida sine materia, purgantibus nequaquam utemur medicamentis, sed solummodo alterantibus calidis.

Methodus pro cognitione

MELANCHOLIÆ IN-
SERVIENS.

MELANCHOLIA est delirium quoddam sine febre ex melancholico humore nascens, qui mentis sedem ita perturbat, ut loquantur & sæpe etiam efficiant longè à ratione abhorrentia, idque cum metu & mæstia. Hoc autem nomen huic malo impositum est ab ipsa materia causaque à qua excitari solet. Vfus longus notauit tres esse melancholicorum differentias. Prima prouenit à melancholico sanguine crasso & feculento in ipso cerebro congelto, à calore enim interno cerebri melancholicus succus iusto plus exassatur sæpe, reliquo sanguine corporis innoxio existente. Secunda prouenit, quotiescumque omnes venæ corporis melancholico perfusæ sunt sanguine, quod magna ex parte vitio iecoris fit, dum huiusmodi crassum feculentumque procreat sanguinem, vel lienis, cum ipse ob imbecillitatem vel obstructionem iecur non expurgat ab eiusmodi fæce. Tertia hypochondriaca vocatur melancholia, de qua in sequentibus.

PARS AFFECTA. ipsum est cerebrum, quod inno-
tescit, eò quòd princeps facultas cerebrialiqua læditur,
è cerebro enim omnes principes animæ facultates
efflorescunt. Contingit autem cerebrum hîc lædi secun-
dum quod est pars similâris, totius equidem cerebri
temperies mutatur versus frigidum & siccum ab hu-
more melancholico. Hoc autem constat ex eo quòd
neque subito adueniat, neque subito solvatur. Cere-
brum autem subinde hîc læditur per essentiam, tunc-
que signa nulla præcordiorum, hypochondriorum, ven-
triculi, alteriusve partis læsæ apparuerunt. Contingit
etiam tunc melancholicorum symptomata esse au-
stiora,

Etiora, atque in facie quædam plerumque tunc liuedo apparet, aliàs sæpe per consensum læditur, idquæ sæpe ipsius ventriculi atque mirach, de quo post. Aliquando quoque fit vitio totius corporis, tuncque color faciei ad nigredinem vergit, retentio denique sanguinis menstrui hæmorrhoidumve, aut alia aliqua consuecta excretio substitit, superfluitates scilicet iecoris vel splenis, habitus corporis est gracilis, hirsutus, ad nigredinem vergens, venas latas habens. Cum ex dictis intelligere liceat hunc affectum esse deprauatam quandam functionem ipsius principis facultatis, symptoma esse, non morbum, in confesso est. Imaginandi autem facultas non cogitandi, nec memorandi hîc læditur, eritque symptoma pertinens ad actionem læsam facultatis principis, imaginatricis scilicet.

SIGNA Melancholiæ cuiusvis, sunt metus & mæstitia; malè concurrunt cogitationes absque causa manifesta, vapores enim ab atra bile enati, eleuatique, tenebras mentis offundunt, eò quòd cerebrum tenebris simile est redditum, aut quasi tenebrosum sit effectum; haud aliter enim mentem mutare videntur quàm nocturnæ tenebræ, quæ timoris terrorisque non nihil mouent hominibus in iis ambulantibus. Item tædio vitæ, necnon malis intentisque animi cogitationibus afficiuntur, tandem etiam absque vlllo ordine verba profundere incipiunt inania. Frequenter etiam in lacrymas prorumpunt, solitudinibusque nunc gaudent, easdemque rursus damnant, cogitabundi sunt, alij se semper decipi, infidiasque sibi strui credunt, somnus per breuis est turbulentisque infemniis perturbantur. Præter iam dictos autem affectus qui omnibus melancholicis communes sunt; alij quasi semper rident, vti contrà alij semper lacrymantur, alij vates se augurantes, de rebus futuris multa pollicentur; nonnulli se potentes esse putant, alij in nouam speciem se transformatos existimant, vnde alij cuculorum, alij gallorum aut aliorum animalium voces gestusque imitantur. Alij n.

Ælia vasa se esse autumant, eaque ratione ne ab occurrentibus lædantur, cedunt. Alij quamuis mortem per timeſcant, hanc tamen exoptant, & aliquando conſciſcunt ſibi; alij ſe capite, nonnulli cruribus brachiisque deſtitui putant; alij etiam cibum recuſant, nihil vitæ ſupereſſe exiſtimantes, alij latrones adeſſe, aut præfectos qui ad vincula deducere velint, in domo eſſe ſuſpicantur; nonnulli ne terra eos abſorbeat verentur; alij aliis imaginationibus, prout fuit vitæ inſtitutum, perturbantur. Nonnulli aut bello aut contentionibus aut ſtudiis aut precationibus aliſve vitæ inſtitutis, quibus addiſti fuerunt, toti occupati ſunt, iſque vigilantibus id accidit, quod ſanis ſæpe dormientibus.

CAUSA Intemperies cerebri frigida ſiccaque ſæpius in cauſa eſt, ſive naturaliter, ſive aliunde acciderit, ab humore nimirum melancholico, eiſdemque vaporibus in aliis partibus generatis, vel ibidem relictis, vnde vapores atri atque ſeculenti in mentis ſedem repunt, à quibus cerebrum redditur ſimile tenebris. Fit etiam ob capitis calorem immodicum, ita vt ſanguis aduratur, inde enim vapores quoque ſiunt melancholici, quod aliquando obſervatur in febribus. Triftitia denique longa, vigiliæ ſuperfluæ, ſolitudines, menſtruorum hæmorrhoidumq. retentio hoc malum accerſunt; mentem enim paulatim corrumpit vapor malignus à vitioſo ſanguine ſublatus. Alimentorum quoque prauorum uſus, & potiffimum ſi non bene digerantur, dicti mali ſæpe quoque cauſa eſt. In viduis, necnon iis qui amoribus inordinate vruntur, hoc etiam accidit, eò quòd mens ſollicitudinibus mæroribusque conficiatur. Contingit ſæpe etiam ob vitium iecoris, cum ob intemperiem aliquam magnam, ſanguinis melancholici copiam gignit. Aliàs etiam lienis fit vitio, cum is magnam copiam huiusmodi ſanguinis allicit, nec expellit; hinc enim vniuerſum corpus ſanguine melancholico perfunditur tempore.

PROGNOSTICA. Melancholia per eſſentiam cerebri

bri proueniens & inueterata & veluti in naturam conuerſa, incurabilis propemodum euadit; circa initia verò facilior eius eſt curatio. Mæſtitia timorque immodicus longo tempore perſeuerans, melancholiam ſignificat. Verum ſi iſſis melancholicis hæmorrhoides ſuperuerint, bonum erit. Periculum autem eſt, ne vergat in apoplexiam, vel conuulſionem, aut furorem, aut epilepſiam, eamque ob cauſam mox curandum erit hoc malum. melancholia autem omnis familiarior viris & ſenioribus, deterior verò feminis eſt. Melancholia quæ fit vitio totius corporis, difficillimè curatur, vti & ea quæ vitio fit cerebri.



Methodus rationalis pro curatione

MELANCHOLIÆ INSERVIENS.

Perficitur autem ſubſequentibus remediorum generibus.

VICTVS RATIONE.

AER ſit lucidus, bene olens, humidus, in reliquis temperatus.

Cibus mediocriter corpus humectans, quiſque boni ſit ſucci, facilisſque digeſtionis, flatuſque minimè pariat, præſcribatur: vt ſunt oua ſorbilia, carnes gallinarum, caponum, pullorum, perdicum, piſces mollem habentes carnem, petroſelinum, vuarum paſſæ, endiuia, borago, bugloſſa, lactuca, malua, ſpinachia, ex hiſce iuſcula fieri poterunt.

Potus ſit vinum album tenue.

Exercitium ſit mediocre, vt eſt deambulatio per amœna loca.

Somnus conſuetum tempus nonnihil ſuperet.

Excrementa alui arte proleſtentur; ſi natura negligat ea propellere tempore conuenienti.

Animi perturbationes ſummæ fugiendæ ſunt, potiffimum metus & mœſtitia, eorūque loco animus demulcendus hilaritate, animi conſtantia, bona ſpe.

PRAEPARANTIBVS.

Syrupus de ſucco boraginis ſeu bugloſſæ, violarum.

De epithymo, de pomis.

Syrupus cidoniorum.

Syrupus de fumo terræ, lupulorum.

Oxymel ſimplex.

Aqua bugloſſæ, lupulorum, fumarizæ, intubi vtriuſque, meliſſophylli.

Decoctum radicum fœniculi, petroſelini, capparorum, glycyrrhizæ, corticum tamarifci, epithymi, thymi, fumarizæ, ſcolopendriæ, florum boraginis, bugloſſæ, violarum, vuarum paſſarum; ſyrupo de epithymo, glycyrrhizæ, fumarizæ, bugloſſæ, violarum addito.

Quæ humectare poſſunt modicèque calefacere inter omnia conueniunt; humor equidem peccans frigidus eſt factus & ſiccus ratione aduſtionis.

VACVANTIBVS.

Decoctum prædictum; addendo Damascena pruna, polypodium, ſenam, myrobalanos empeliticos, Indos, diaſenam, caſſiam.

Dilutum foliorum ſenæ atque epithymi mirificè conducunt.

Confectio hamech, hiera diacolocynthidos, logodali.

Diaſena N. Pillulæ Indæ, de lapide Lazuli.

Lapis Armenus, cyaneus, polypodium, epithymus, ſena, myrobalani, kebuli nigri, elleborus niger.

Elleborismus Matthioli.

Venæ medianæ ſectio fiat ab initio ſi vniuerſum corpus ſanguine abundet melancholico, ſecundum viriū tolerantiam. Si mediana non appareat, commodè maleoli talive venam ſecabimus, potiffimum in mulieribus,

bus, in quib. menstrua suppressa sunt, aut viris qui hemorrhoidibus expurgari solebant. Si verò cerebri vitio fiat; non tam erit necessaria venæ sectio, nisi fortasse aliis non curetur, tunc enim cephalica secabitur; quo facto, si adhuc persistat malum, etiam vena frontis aperietur.

A lenioribus auspicandum, rariúsque purgantibus medicamentis vtendum erit, cum plus equo exsiccare calefacereque possint; eritque per intervalla vacuanda materia, vt natura releuetur, idque duobus aut tribus diebus postquam sanguinem eger miserit. Semper autem medicinis solutius humectantia permiscebuntur, & quæ confortare possunt partes principes & spiritus.

AVERTENTIBVS.

Clysteres ex decocto seminum anisi, fœniculi, carthami, lupuli, thymi, epithymi, maluæ, mercurialis, fumarie, buglossæ, polypodij, senæ, diasenæ, confectione hamech, diacatholicone, hiera logodali, cassia, oleo violarum, amygdalarum dulcium addito.

Suppositoria.

Frictiones extremarum partium, earundemque ligaturæ, & foci ex aqua calida.

Sternutamenta.

Masticatoria.

Hæmorrhoidum mensiumque prouocatio fiat, si ex eorum suppressione ortum habuerit.

Cucurbitulæ sine scarificatione hypochondriis vtiliter apponentur.

Sanguisugæ fronti aliisque locis apponantur.

Cauteria in sutura coronali fiant, fluereque permittantur diu loca vicerata. Trepano etiam cranei densitas imminui poterit, vt vaporibus fuliginosis exitus pateat.

CORROBORANTIBVS *resoluentibusque reliquias,*
& temperiem emendantibus.

Electuarium lëtificans Galeni de gemmis. Diamarga;

ritum frigidum, dianthos.

Pleresarcoticum. Confectio de granis tinctoriis. Diagonalanga, diacuminum, diabuglossatum, diaboraginatun.

Diambra, electuarium Conciliatoris. Diamuscum dulce & amarum.

Syr. cidoniorum, de pomis.

Conserua magna nostræ descriptionis, boraginis, buglossæ, violarum, rosarum, fumariz. Cortices citri conditi. Conserua enulæ campanæ.

Conserua satyrionis.

Decoctum radicum Cynæ.

Lactis serum per decoctionem eiusdem temperatum.

Saccharum violatum, rosatum, manus Christi.

Odoramentum ex aqua rosacea, violacea.

Irrigatio capitis rasi ex decocto florum nymphææ, lactucæ, maluæ, stœchados, violarum, camomillæ, althææ, capitem veruecum; quo pluribus diebus manere vteretur.

Epithema pro corde ex aqua buglossæ, boraginis, nymphææ, violarum, vino odorifero, foliis melissophylli, nuce muscata, behen utroque, caryophyllis, semine acetosæ.

Fomentatio fiat ventris ex oleo in quo cocta sint semina cumini, rutæ, dauci, anethi.

Unguentum pro spina dorsi ex oleo violarum, amygdalarum dulcium, anethino, camomelino, nymphææ.

Balnea frequentia mirifice profunt ex aqua dulci, in qua decocta sint folia maluæ, violarum, rosarum, nymphææ, capita veruecum, semina lini, foeni Græci, flores buglossæ, camomillæ, meliloti.

CORRIGENTIBVS *accidentia.*

Syrupis de papauere, violarum cum aqua lactucæ.

Philonium Romanum. Triphera magna. Requies N.

Pillulæ de cynogloss.

Lotio capitis ex decocto florum nymphææ, violarum, folio.

foliorum & radicum mandragoræ, hyoscyami, papaveris albi.

Vnguentum ex oleo anethino, nenupharino, populeonis, violarum, croco, opio.

Conciliantibus somnum studiosè vtemur; hinc enim plurimum alleuabitur æger; vti contra vigiliis continuus malum incrementum sumet. Opiata tamen non admittantur, nisi magna vrgeat necessitas.

THEORICA ET EMPIRICA MEDICAMENTA nobilia in MELANCHOLIA, sæpius cum summa salute plurimorum agrotorum à Gualtero Bruel experta.

CURATIO MELANCHOLIAE.

℞ foliorum betæ, maluæ, violarum, mercurialis, lupuli, ana m. j. β. boraginis m. ij. epithymi ʒ β. florum sambuci m. j. β. seminum anisi, lini ana ʒ j. seminum carthami contusi, polypodij quercini ana ʒ j. β. senæ Alexandrinæ ʒ j. corticum ellebori nigri ʒ j. coquantur in sero lactis q. s. ad lb j. β. colaturæ addatur sp. hieræ logod. ʒ β. olei violarum, liliorum ana ʒ j. β. salis ʒ j. fiat *Clystere*; eo bis in septimana vtetur.

℞ syrupi de epithymo, syr. de pomis, violarum ana ʒ j. buglossæ, fumaris ana ʒ β. aquarum buglossæ, fumaris, violarum ana ʒ iij. fiat *Serapium*.

℞ seminum anisi ʒ iij. foliorum senæ ʒ j. β. epithymi ʒ β. pruna damascena numero x. crassiusculè contundantur, macerenturque die vno in sero lactis caprini q. s. fiat *Haustus*.

℞ rad. foeniculi, graminis ana ʒ j. β. florum boraginis, violarum, epithymi ana m. j. β. lupulorum, fumaris ana m. j. seminum anisi ʒ β. vuarum passarum enucleatarum, hordei mundi ana ʒ j. glycyrrhizæ rasæ ʒ iij. corticum tamarisci ʒ β. senæ alexandrinæ ʒ j. β. rhabarbari, myrobalan. Indorum ana ʒ ij. polypodij quercini ʒ x. coquantur in aqua q. s. ad lb j. β. colaturæ ad ʒ

datur syrupi de epithymo, de fumaria ana \mathfrak{z} j. β . fiat *Potio*.

*R*z confectioⁿis hamech \mathfrak{z} v. pulueris sancti \mathfrak{z} j. syrupi de epithymo \mathfrak{z} j. aquarum fumarie, boraginis ana \mathfrak{z} j. β . fiat *Haustus*.

*R*z confectioⁿis hamech, diapruni compositi ana \mathfrak{z} iiij. syrupi de cichoreo cum rhabarbaro \mathfrak{z} j. decoctionis communis q. s. fiat *Haustus*.

*R*z pillularum Indarum \mathfrak{z} ij. pul. hierę logod. \mathfrak{z} j. trochisc. alhandal gr. iiij. syrupi de epithymo q. s. fiant *Pillule*.

*R*z massę pillularum de hiera composita \mathfrak{z} β . cochiarum \mathfrak{z} j. trochiscorum alhandal gr. iiij. syrupi stęchados, violarum ana q. s. fiant *Pillule*.

*R*z pillularum de lapide lazuli, aggregatiuarum Indarum \mathfrak{z} j. diagridij, gr. iiij. syr. de epithymo q. s. fiant *Pillule*.

*R*z hierę logod. \mathfrak{z} j. hierę diacolo. \mathfrak{z} j. senę Alexandrinę \mathfrak{z} j. β . syr. violarum \mathfrak{z} j. β . aquarum violarum \mathfrak{z} iiij. fiat *Haustus*.

*R*z rad. raphani iuste magnitudinis, diuersis in locis perforetur, infiganturque clauⁱ ellebori albi; post tertium diem vbi viribus ellebori perfusa erit radix raphani, coquatur raphanus in oxymelite squillitico, prius exemptis quā diligentissime partibus omnibus ellebori, huius \mathfrak{z} ij. exhibeantur cum \mathfrak{z} iiij. aquę calidę; fiat *Vomit^orium medicamentum*.

*R*z radicem ellebori albi \mathfrak{z} iiij. infundantur in aquę buglossę \mathfrak{z} β . in cineribus calentibus maceretur aliquamdiu, hinc coletur, & cum melle de pumato fiat syrupus. detur cochlear vnum cum iusculo parum pingui, cui addantur hierę logod. \mathfrak{z} ij. fiat *Vomit^orium medicamentum*.

*R*z conseruę violarum, buglossę ana \mathfrak{z} j. β . sp. lętificantis Gal. \mathfrak{z} ij. dianthos, diamusci dulcis, elect. de gemmis ana \mathfrak{z} ij. diamargariti frigidi, diatragacathi frigidi ana \mathfrak{z} j. β . syr. violarum, pomorum ana q. s. fiat *Electuar.* detur \mathfrak{z} j. duabus horis ante cibum.

*R*z ele-

℞ electuarij lætificantis Gal. ʒ sem. corticum citri conditorum ʒ ij. sacchari violarum, rosarum ana ʒ se. syr. de succo boraginis q. s. fiat *Electuar.* molle.

℞ plerisarcho, lætificantis Gal. ana ʒ ij. sacchari violacei & rosacei ana ʒ j. dentur ʒ iiij. cum vino aliquo generoso.

℞ conseruæ buglossæ ʒ j. sem. sp. lætificantis Gal. ʒ j. sp. diarhodonis abbatis sine mosco ʒ sem. seminum cinamomi electi ana ʒ sem. syr. violarum, buglossæ ana q. s. fiat *Conditum* in forma opiati.

℞ sp. electuarij de gemmis ʒ j. sem. dianthos, diambræ ana ʒ ij. sacchari albissimi dissoluti in aqua violarum & buglossæ q. s. fiat *Electuarium in Tabulis*.

℞ florum nenupharini, boraginis, buglossæ, violarum ana m. ij. camomillæ, meliloti ana m. iiij. foliorum maluæ, althææ ana m. ij. seminum lini, fœni Græci, hordei ana ʒ iiij. cucumeris, cucurbitæ ana ʒ ij. capita duo vel tria veruecum, coquantur omnia in aqua q. s. aliquamdiu; fiat *Balneum*, addendo lactis vaccini recenter mulcti libras aliquot, butyri recentis non saliti libras iiij. eo repente corpus sex horis ante cibum lauetur.

℞ florum camomillæ m. ij. sem. stœchados, nymphææ ana m. j. lactucæ, maluæ, violarum, althææ ana m. j. sem. capita veruecum duo, coquantur in aqua q. s. ad tertias, fiat *Embrocha*, qua per per multos dies caput madefiet spongiis rasum. Hinc pulmonem arietis adhuc calentem capiti applicabimus.

℞ olei violacei ʒ j. amygdalarum dulcium, camomelini ana ʒ sem. anethini. olei de maceribus ana ʒ ij. fiat *Vnguentum*: quo caput post lotionem vngendum erit.

℞ olei violarum, liliorum ana ʒ j. amygdalarum dulcium, pinguedinis gallinæ, axungia humanæ ana ʒ sem. fiat *Vnguentum*; quo dorsum vngatur cum balneum exhibet.

℞ syr. de papauere ʒ j. sem. violarum ʒ sem. aquarum violarum, lactucæ ana ʒ j. sem. fiat *Syrupus* somnum concilians.

C

R \acute{e} olei violarum, mandragoræ, nenupharini ana 3 se-
nucis muscatæ 3 sem. croci gr. quinque, opij gr. iij. ceræ
q. s. fiat *Unguentum* pro somno; quo tempora, pulsus ma-
nuum, & volæ pedum iniungentur.


R \acute{e} foliorum vitis, violarum, lactucæ ana m. ij. salicis,
florum violarum, buglossæ, nenupharini ana m. j. capita
papaueris albi quatuor vel quinque; coquantur in a-
qua q. s. pro balneo manuum atque pedum somni causa
commendatum.

A P P E N D I X

ad prædicta procuratione MELAN- CHOLIÆ inserviens.

*Om̃ium primò alius clysteri emolliente ; flatûsque discuti-
ente , nec non humores concoquente , solvatur. Demum vena
secabitur. Hinc humores naturæ obediētes reddentur. Tan-
dēque purgantibus medicamentis , primò multum lenibus,
(ne exiccemus calefaciamûsque corpus) excludentur è corpore.
Demum paulò fortioribus utemur , potissimùm si contumax
malum fuerit: uti est hiera diacolocynthidos , logod. Potius au-
tem potioribus purgantibus quàm pillulis utemur , quòd magis
siccant pillulæ liquidis medicamentis. Humores postea à cere-
bro auertemus ligaturis , frictiōibus , clysteribus fortioribus.
Suppositoriis, cucurbitulis , similibûsque diuersionum instrumen-
tis. Mox corroborabimus principes corporis partes , cerebrum
potissimùm atque cor , necnon reliquias resolvemus. Somnum
quoque quæ conciliare possunt , interea temporis administrabi-
mus. Quæ omnia nunc anteaquæ dictis medicamentis felicissi-
mo cum successu consequentur , modò uniuersalia particulari-
bus debita ratione adhibeantur. Omnibus autem medicamen-
tis addemus ea quæ humectare possunt, cum maiori ex parte ab
intemperie sicca hic morbus proueniat. Sunt subinde hoc morbo
laborantes nonnulli , qui rem admodum seriò agunt , eò quòd
serpentes aut ranas, aut spiritum, aliudve simile se in visceribus
habere existimant: quorum nonnulli sanati sunt, eò quòd in excre-
mentis*

mentis eorum dum purgantia medicamenta oblata fuerunt, huiusmodi data opera insciis agris, immissa fuerint: iis enim visis, falsam imaginationem deposuerunt.



Methodus pro Cognitione

MELANCHOLIAE HY-
POCHONDRIACAE IN-
SERVIENS.

HYPOCHONDRIACA melancholiā vel flatuosa, fit quotiescūque iuxta ventriculum aut hypochondria feculentus exassatur sanguis, ex intemperie iecoris, ventriculi aut venarum mezeraicarum. Hinc enim contingit vapores crassos adustosque atque malignos ad arcem cerebri eleuari, eamque perturbare, & melancholica symptomata, ut antē diximus, excitare, ratione ferē simili qua in suffusione ab acribus fuliginosisque vaporibus ab inferioribus partibus transmissis, symptomata eius mali excitantur. Contingit enim hic ab atris vaporibus à ventriculo, iecore, mezenterio, aut partibus illis adiacentibus ad cerebrum transmissis, temperiem ipsius cerebri tempore mutari, unde etiam imaginatrix facultas læditur, memoria cogitationēque illæsa permanente. Materia huius mali, humor nimirum atrabilarius, magna ex parte principium suum habet partim à iecore, partim à liene. A iecore equidem frequenter, ob eiusdem intemperiem generatur humor huiusmodi melancholicus atque atrabilarius; cum verò splen hunc non attrahit humorem propter aliquam eiusdem quoque visceris noxam, tunc humor hic in venis mezeraicis subsistit locisque vicinis.

PARS AFFECTA etiam hîc ipsum est cerebrum. afficitur autem aut per consensum ventriculi, aut hypochondriorum; illis enim in locis sanguis ipse melancholicus sepe quasi in parte inflammata coaceruatur. Aliquando quoque ab aliis partibus ventriculo vicinis calentibus iusto magis, transmittitur; hinc enim sanguis vicinus quoque incalescit, & in melancholicum degenerat; contingitque cerebrum ab illis partibus in consensum rapi.

SIGNA, præter communia melancholicorum signa, ex humoris ardore, æstus in præcordiis sentitur, cibis que frigidis iuuari videtur; sepe etiam ventriculi hypochondriorumque concurrunt dolores, potissimum sumpto cibo concoctu difficili; hinc etiam cruditates multe: & quo maiores fuerint cruditates, eò magis crescit malum, & contra, leuatur. Multa edunt, adstrictam interim aluum habent. Flatus ruētūsque acidi redduntur frequentes ab humoribus crudis melancholicisve dictis in locis conclusis. Iisdem in locis rugitus frequentes admodum seu quædam murmura oberrant, estque signum huic morbo maximè proprium. Frequenter etiam humeri scapulæque illis dolent, hypochondria sursum trahuntur, arteriæ moleste valideque pulsant. A vaporibus eleuatis, aurium sonitus, venarum, oculorumque inflammationes fiunt. Somnus tum brevis tum turbulentus fit. Vertigine infestantur. In plurimis partibus saltus quidam diuersi frequenter eueniunt. Vomitus fit pituitæ crudæ, cui bilis aliquando permiscetur. Leuantur postquam bene concoxerint assumpta, item post alui deiectionem, vomitionem atque ructus.

CAUSA frequenter fit splenis vitio, cum vix attrahit sanguinem melancholicum à iecoris intemperie factum. Alias contingit sanguinem qui est in venis ipsius ventriculi, mezenterij, splenis, abdominis, intestinorum, partibusque adiacentibus, à calore nimio, qui ex obstructione sepe fit, assari, aliave aliqua ratione in
atrum

atrum succum degenerari, cui sepe diffunditur per mesenterium, splenem, partesque ventris adiacentes: unde magna sequitur intestinorum caliditas, indeque vapores ad cerebrum transferuntur, unde hæc iam dicta symptomata efflorescunt.

PROGNOSTICA. Longè est mitius hoc malum superioribus dictis, tempore interim in illas species degenerare contingit, quemadmodum autem ex proba concoctione sumptorum plurimum leuatur æger; sic cruditatibus maximè exasperatur morbus. Diuturno autem errore si altius radices agat hoc malum, furorem accersit, aliquando quoque febrem hecticæ non absimilem. In principio mali curatur facilius, vix autem remediis tollitur si inueterauerit.



Methodus pro curatione

MELANCHOLIAE HY-
POCHONDRIACÆ IN-
SERVIENS.

Perficitur autem subsequentibus remediorum generibus.

VICTVS RATIONE.

A Er conuenit calidus atque humidus. Victus ratio ad humidum vergeat. Carnes conueniunt gallinarum, pullorum, caponum, perdicum, vitulinæ, phasianorum. Iuscula quoque carniū in parua quantitate data plurimū conueniunt, cum alioqui fluctuationem cruditatēque in ventriūo faciant. admittuntur vūq; passæ, cerasa dulcia, pruna, poma affata, quibus parum sacchari addatur, sintque refrigerata: erūntque medicamenti alimentique loco.

C iij

Potus. Cremor ptisanæ cum parua cinnamomi seminumque anisi quantitate. Vinum album aquosum. Serum lactis, caprinum autem potius expetitur.

Motus vitandus validus, & quidem conuenit equitatio, nauigatio, ambulatio, natatio in balneo artificiali dulci.

Somnus conciliandus arte, si parum dormiat, plurimum equidem confert.

Animi perturbationes procul relegandæ, musicisque instrumentis, cantilenisque oblectantibus animus reficiendus est.

P R A E P A R A N T I B V S.

Syr. de succo fumarix, violarum, capillorum Veneris.

De pomis odoriferis, de succo boraginis, indiuiæ, de epithymo.

De corticibus citri, de absinthio.

Syrupus Byzantinus absque aceto.

Aquæ lupulorum, buglossæ, fumarix, melissophylli, boraginis, violarum, endiuiæ, scabiosæ.

Decoctum radicum asari, fœniculi, petroselini, asparagi, rusci, graminis, valerianæ, ciperi, cichorei.

Decoctum pulegij & centaurei minoris, nec non absinthij, à multis felici cum successu sumitur.

Obstructionem quæ tollere possunt, ventriculūmq; confortare, permiscebuntur hîc præparantibus medicamentis.

V A C V A N T I B V S.

Confectio hamech, diacatholicon, diaphœnicum.

Diasena, puluis sanctus.

Elleborifinus Mathioli, hiera logod. diacolocynthidos.

Pillulæ de lapide lazuli, fumarix, Indæ.

Syr. de multiplici infusione rosarum.

Sena, polypodium, elleborus niger, epithymus.

Manna.

Vomitum plurimum iuuat, si diuturnum fuerit malum, potissimum si facile vomat, ventriculūque crudis opprima-

opprimatur humoribus. Post cibum autem excitabitur cum aqua tepida, oxymelite simplici, aut cum infusione radicum raphani & ellebori albi vel nigri.

Clystere ex decocto camomillæ, betonicæ, artemisiæ, centaurei minoris, betæ, cuscutæ, lupulorum, fumariæ, carthami, epithymi, polypodij, foliorum senæ, addito melle, hiera picra, logod. ol. liliorum, violarum.

Venæ sectio fiat iecorariæ sinistri brachij, si plenitudo magna fuerit; aut saluatellæ, si menses hæmorrhoidesve subsistant. Et si pertinax morbus fuerit, secabitur quoque vena frontis.

Vti autem præparantia medicamenta, sic etiam purgantia sæpius reiterare conuenit, eò quòd humores hunc morbum facientes, secundum plurimum multum sunt terrestres, vnde morbi plurimum oriuntur contumaces.

AVERTENTIBVS.

Lotiones, frictionesque, necnon ligaturæ crurum.
Clysteres.

Hæmorrhoidarum mensiumque prouocatio.

Cucurbitulæ cum scarificatione hypochondriis apponantur si dolor nullus adsit, flatus enim validè educunt.

Multum hîc momenti habent ea quæ à capite auocare possunt humores caput grauantes.

CORROBORANTIBVS, *intemperiemq;
membrî emendantibus.*

Theriaca, diacuminum, aromaticum rosatum, diamaragaritum frigidum.

Electuarium de gemmis, diamuscum dulce, diagalanga.

Conserua radicum & florum buglossæ, violarum, conserua magna.

Decoctum centaurei minoris, pulegij, absinthij, chamæpityos, chamædryos, seminum anisi, fœniculi, petroselini.

C iij

Syrupus fiat ex radice asari, boragine, buglossa, cichoreo, floribus rosarum, centaurei minoris, camomillæ, foliis fumariæ, absinthij, chamædryos, chamæpityos, scolopendrij, boraginis, lupulorum, hyssopi, betonicæ, seminis anisi, fœniculi, dauci, uvis passis, syrupo granatorum, pomorum dulcium & acidorum.

Unguentum pro hypochondriis & ventre ex oleo capparorum, liliorum, camomillæ, rutæ, amygdalarum dulcium, floribus genistæ, seminibus nigellæ Romanæ, cinnamomo, ammoniaco, aceto.

Odoramentum,

Fomentum fiat pro hypochondriis ex aqua & vino, in quibus sint decocta abrotanum, melilotus, ebulus, camomilla, epithymus, thymus, artemisia, fena, poly-podium, aceti aliquid addendo.

Balneum aquæ dulcis mirificè iuuat ex maluis, violis, beta, camomilla, rosis siccis, fœniculo, butyro, lacte.

Medicamenta valenter calefacientia & exiccantia hic non admittemus, ut est aurea Alexandrina, aliaque similia. Imò assignatis pulueribus cordialibus modicè admodum utemur, cum corpus humoresque siccent, eaque ratione morbum augeant.

CORRIGENTIBVS *accidentia.*

Cucurbitulæ sine scarificatione mirè flatus resoluunt.

Fomentatio hypochondriorum ex decocto pulegij, anethi, rutæ, absinthij, foliorum lauri, serpylli. Aut fiat ex aceto in quo decocta sint semina cumini, anisi, pulegium.

Sacculus ex floribus camomillæ, rosarum, seminibus anisi, cumini, fœniculi, fœnugræci, foliis lauri, serpylli, absinthij, rutæ, pulegij. Aceto irrigetur, caleatque dum apponitur ventriculo.

Unguentum ex oleo nardino, absinthij, rutæ.

Cataplasma ex radice cyperi, floribus camomillæ, seminibus fœniculi, anisi, cumini, fœnugræci, foliis artemisiæ, ebuli, roris marini, absinthij, oleo rutaceo, absinthij,

Irrigatio

Irrigatio fiat capitis, cum aqua dulci in balneo descripta; omnium equidem optimè allicit.

Dolorem horum nonnulla mitigant, nonnulla flatus discutunt, aliqua sunt quæ somnum inuitare possunt.

THEORICA ET EMPIRICA MEDICAMENTA nobilia in HYPOCHONDRIACA MELANCHOLIA, sæpius cum summa salute plurimorum egrotorum à Gualtero Bruel experta.

CURATIO MELANCHOLIAE HYPOCHONDRIACAE.

℞ foliorum mercurialis, maluæ, pulegij, florum sambuci, camomillæ, meliloti, centaurei minoris ana m. j. genistæ m. j. β. foliorum betæ, brassicæ, lupulorum ana m. β. cuscutæ m. j. seminum anisi, carthami, fœniculi ana 3 vj. polypodij quercini 3 j. β. senæ Alexandrinæ 3 j. epithymi 3 v. coquantur in aqua q. s. ad lb j. s. colaturæ addatur sp. hierę logod, pul. sancti ana 3 j. s. confectionis hamech 3 iiij. olei liliorum, violarum, anethini ana 3 j. mellis violacei 3 j. s. salis communis 3 j. fiat *Clystere*, quo semel in septimana vratur, & residuo clysteris poterit fieri cataplasma pro splenis regione. Reddito clysterio dentur sequenti die mithridati optimi, theriacæ magnæ ana 3 ij. vini Hippocratici subiecti 3 iiij. fiat *Hauftus*.

℞ syrupi de epithymo, violarum ana 3 j. de succo boraginis, byzantini absque aceto ana 3 j. β. aquarum violarum, boraginis, lupulorum ana 3 iiij. fiat *Iuleb*.

℞ radicem fœniculi, graminis ana 3 j. boraginis 3 ij. foliorum betonicæ, pulegij, hyssopi, centaurei minoris ana m. β. seminum anisi, fœniculi, dauci ana 3 iiij. fumaris, capreolorum lupuli ana m. j. epithymi 3 β.

nucis muscatæ 3 iij. corticum citri 3 v. vuarum passarum enucleatarum 3 j. glycyrrhizę rasę drachmas quinque, seminis cucumeris 3 vj. florum cordialium ana m. j. coquantur in aqua q. s. ad tertię partis consumptionem, colaturę addatur syrupus granatorum, pomorum dulcium acetosorumque, de succo boraginis ana 3 j. fiat *Potio*.

Rz rad. boraginis 3 j. β. centaurei minoris, pulegij ana m. j. β. seminum anisi, fœniculi ana 3 iij. vuarum passarum 3 j. β. foliorum fenę, polypodij quercini ana 3 j. epithymi 3 β. florum cordialium ana m. β. coquantur in aqua q. s. ad lb j. β. colaturę addatur diacatholiconis 3 j. sp. hierę logod. 3 j. syr. byzanthini, de epithymo ana 3 j. β. fiat *Potio*; qua frequenter vtetur.

Rz confectiōis hamech 3 iij. pulueris sancti 3 j. diacatholiconis 3 ij. fiat *Bolus*.

Rz pul. hierę logod. 3 j. β. sp. hierę picrę Gal. 3 ij. syr. de absinthio q. s. fiant *Pillule*. Post horam bibat decocti hordei mundi, aut ptisanę haustum, addendo aliquid sacchari. Vomitus postea prouocetur cum vinciis sex aquę tepentis, in qua oxymellis 3 ij. dissolutę sint. aut cum raphani succo, qui ellebori albi viribus perfusus sit, in quem finem dragma vna ellebori albi raphano passim inferatur, & per triduum detineātur partes, hinc succus raphani expressus propinetur.

Rz confervę rad. buglossę 3 j. β. violarum 3 β. diamusci dulcis, rosatę nouellę ana 3 ij. lętificantis Galeni 3 ij. β. syrupi de succo borag. de corticibus citri ana q. s. ad *Electuarij* mollis consistentiam.

Rz sp. diarhod. abbatis 3 ij. rosatę nouellę, aromatici rosati Gabri ana 3 j. florum buglossę 3 j. β. corticum citri 3 j. seminum anisi 3 iij. sacchari violacei, rosacei, confervę radicum buglossę ana 3 j. syr. de succo boraginis q. s. fiat *Electuarium* in forma opiati.

Rz radicum borag. 3 ij. polypodij 3 β. corticum radicum capparorum 3 ij. seminum anisi, carui ana 3 iij. florum violarum, buglossę ana m. j. β. coquantur in duab. libris

libris aquę ad mediętatis consumptionem; sub finē co-
cturę adde vini odorati libram, modicęque vnā bul-
liant, hinc colaturę adde nucis muscatę, cinnamomi, ro-
satę nouellę, ana 3 ss. sacchari albi q. s. secundum artem
fiat *Potus Hippocraticus*.

R̄ pulegiij, abrotani ana m. j. ss. florum camomillę,
meliloti ana m. j. seminum anisi, cumini ana 3 j. epi-
thymi, polypodij quercini ana 3 vj. centauri minoris,
rutę, ana m. ss. coquantur in æquis portionibus aquę
& vini, ad tertię partis consumptionem; sub finem ad-
datur aliquid aceti squillitici; fiat *Fomentatio* pro ven-
triculo.

R̄ olei capparorum, liliorum, amygdal. dulcium ana
3 ss. seminum nigellę, anethi, cinnamomi electi ana 3
ss. croci g. xij. ammoniaci 3 ij. cerę q. s. fiat *Vnguentũ* mol-
le, quo post fomentationem partes ventriculo subiectę
vngentur matutina vespertinaque hora.

R̄ olei rutacei, in quo semina anisi, cumini, centaurei
minoris cocta sint, 3 j. picis naualis 3 iiij. misceantur ven-
trique accommodentur, si flatibus turbetur; stomachus
autem cum oleo mastichino atque macis vngatur.

R̄ rosarum rubrarum, florum camomillę ana m. j. fo-
liorum centaurei minoris, pulegiij, absinthij ana 3 iiij.
seminum rutę, anisi, fœniculi, cumini, fœni Gręci ana 3
j. ss. crassiusculę contendantur; fiat *Sacculus* pro stoma-
cho, cum aceto vinoque albo irroretur sæpius, ventri-
culoque applicetur calens.

R̄ radicem ebuli 3 j. foliorum rutę, sambuci, anethi
ana m. ss. seminum anisi, cumini, dauci ana 3 j. cinna-
momi 3 ss. contusa coquantur in æqua portione vini o-
doriferi & aquę; fiat *Fomentatio* abdominis, in quo fla-
tus obmurmurare solent.

R̄ rad. ebuli 3 ij. foliorum berę, violarum, brassicę,
maluę, mercurialis ana m. ij. lupulorum, fumarię, cętau-
rei minoris ana m. j. ss. florum camomillę, meliloti ana
m. ij. ss. seminum lini, fœni Gręci ana 3 iiij. coquan-
tur in aqua q. s. ad tertię partis consumptionem; in quo

lactis mensuræ aliquot infundantur, & butyri recentis ℥ iiij. dissoluantur, fiat *Balneum*. Cum ficibus; fermento, sinapio, cantharidibus, aceto, fiat *Cauterium* potentiale; quod sinistro hypochondrio superponatur.

APPENDIX

Ad prædicta pro curatione MELANCHOLIAE FLATULENTAE inferuiens.

Beneficio clysteris aluus primò subducatur, hinc vena aperiat. Humor deinde melancholicus obediens naturæ reddatur. Humores demum noxi e corpore protrudantur. Mox quæ corroborare cerebrum, iecur atque splenem, & quæ reliquam materiam dissipare possunt, præscribantur. Hinc rursus propter pertinaciam mali humores prædicto modo concoquemus atque purgabimus; partesque prædictas roborabimus; idque toties repetemus donec malum mitescere videbimus. tandem etiam e loco affecto materiam peccantem aut ventosis aut emplastris rubificantibus educemus. Quæ omnia nunc, anteaquæ dictis medicamentis felicissimo cum successu consequi poterimus, modò uniuersalia particularibus debita ratione adhibeantur. Cauendum autem hic diligenter à multum calefacientibus atque exiccantibus, siue alimenta hæc fuerint, siue medicamenta. Vnde nonnulli ut ventositates rugitusque compescant, huiusmodi utentes medicamentis, nec non alimentis, plurimum peccant, morbum sic augentes. debent tamen medicamenta subinde declinare magis ad calidum, a'ias magis ad frigidum, secundum exigentiam rerum circumstantium, materiei nimirum accidentiumque. Ea insuper quæ flatus generare, aut in corpore existentes retinere possunt, hic quoque inhibenda sunt.

Metho-



Methodus pro cognitione

VERTIGINIS IN-
SERVIENS.

VERTIGO malum est in quo tum caput, tum alia omnia circumagi videntur, ita quidem cerebrum sensusque exagitans, ut sæpe laborans corruat, nisi propinquis nitatur adminiculis. Contingit enim hoc malo laborantes in terram subinde citra corporis rotationem in circuitum cadere, haud secus atque illi qui in circumlum circumiuvantur; hocque si attentent, ab una rotatione id illis accidit, quod aliis à pluribus contingit, cum etiam citra circuitum illud illis accidat quod aliis evenit cum frequenter in circulo circumferuntur. Imò idem aliquando perpetiuntur, si alium aliquem, aut rotam, aut aliud aliquid circumagi viderint. Læditur hinc virtus visiva, hinc sensus communis, necnon imaginativa. Est autem hæc passio Epilepsiæ multum vicina, à qua differt in hoc, quod sensibus vertiginosus non priuatur, neque ad modum spasmatis, diverso raptu afficitur.

PARS AFFECTA est cerebrum; ex functionum oblæsione hoc euidenter constat; animalis enim functio oblæditur. In hoc malo cerebrum subinde primario afficitur, tuncque præcessit capitis dolor, eiusdemque grauitas, olfactus gustusque læsio, aurium quoque sonitus, nulliusque partis subiectæ læsio observata fuit. Alias verò cerebrum ipsum afficitur, eò quod ori ipsius ventriculi, præcordiis, aliisve partibus inferioribus consentiat; sæpe enim ibi pravi humores acervantur, aut alimenta corrupta continentur, cruditatesque generantur noxiæ. Tunc præcedit nausea, stomachique morsus, prostratio appetitus, cordis erosio. Si ab aliqua corporis parte fiat, mensibusve suppressis; id ex


propriis signis elucebit. Est autem vertigo symptoma pertinens ad actionem læsam facultatis visuæ & imaginatiuæ; vtraque enim deprauata est.

SIGNA. Intuitum non ferunt eorum quæ velociter in gyrum mouentur. Fit visio deprauata quoque, omnia enim circumagi videntur, oculisque sæpe tenebræ offunduntur. Adde quod dispositio fiat ad casum. Sæpe etiam cadunt si vel parum admodum in circulum circumuertantur; animalis enim actio princeps & sensibilibus læditur. Fit & imaginatio deprauata: concurruntque prius capitis grauitas. Erunt autem huiusmodi accidentia magis continua, si primario cerebri vitio fiat, nec alterius alicuius partis subiectæ affectio aliqua per propria signa adesse intelligatur.

CAUSA. Frequenter fit ab abundantia sanguinis feruidi, multumque spirituosissimi, si naribus non reiciatur paratus ut effluat. Hoc frequenter in acutis obseruamus morbis. Sæpe quoque ab humoribus fit crudis, subinde etiam malignis, qui aut in capite aut in subiecta corporis parte aliqua generantur, & ut plurimum à stomacho, dum multæ cruditates in eo generantur, nec non à matrice ortum habet, propter communitatem quam dictæ partes cum cerebro obtinent. Præterea consuetæ excretiones suppressæ; & ut in genere dicam, omnes humores à quibus generantur atque eleuantur multi vapores spiritusque statuosissimi, crassi atque calidi, turbulenti, malignique; hi enim postea suo motu mouent spiritum animale (qui animæ vehiculum est potissimum in anterioribus ventriculis cerebri) in circuitum, aut alio quasi simili motu inordinato, ita quidem serio, ut homo idem exterius fieri existimet quod interius accidit; sicque imaginatricis facultatis iudicium peruertitur; seque homo verè circumagi, necnon prolabi subinde existimat. Nec mirum, in orbem equidem feruntur dicti vapores haud secus atque flamma; necnon fumus in furno circumagi solet; dum iis exitus non patet per cerebri meatus obstructos. Fit etiam ab
in-

intemperie calida ipsius cerebri, quæ multos vapores validè allicere potest, necnon humores extenuare, & in feruorem furorémque agere. Rursus omnia quæ cerebrum conturbare aut humores exagitare calefacereque possunt, vti sunt exercitia immodica, solis calor, aliæque consimilia quæ accessionem reuocare possunt, malum etiam hoc excitare solent.

PROGNOSTICA. Vertigo si diu durauerit, apoplexiæ & morbo comitiali proxima est, & quidem paruum Epilepsiam superior ætas vocauit; vnde negligenda nequaquam est, cum in perniciosissimos iam dictos affectus facile permutari possit.



Methodus pro Curatione

VERTIGINIS INSER-
VIENS.

Perficitur autem subsequenibus remediorum generibus.

VICTVS RATIONE.

A Er sit temperatus, lucidus atque purus. Cibis conuenit qui bonum succum generare possit, & qui facilè concoquitur, minimèque existat flatuosus; sit quoque stomacho gratus.

Tam autem hîc cauendum à fame quàm à satietate.

Potus sit vinum aquosum.

Motus atque exercitium conuenit temperatum. capiti tamen quies potius expedit.

Somnus conuenit mediocris.

Excremēta alui arte aut natura promouēda sunt in dies.

Animi perturbationes non admittat, iram nimirum, mærorem tristitiā uve.

VACVANTI BV S.

Syr. de multiplici infusione roiarum.

Diaprunum solutium.

Diacatholicum, electuarium de psyllio, hiera logodij.

Hiera picra, diacolocynthidos.

Pillule cocciaë, aureaë, arabicaë, mastichinaë, aggregatiuaë, sine quibus esse nolo, de quinque generibus myrobalanorum.

Tamarindi, rhabarbarum.

Manna, fena, polypodium, epithymus, myrobalani citrini.

Agaricus trochiscatus.

Vomitus confert dum à ventriculo ortum habet.

Humori peccanti conuenientia eligemus medicamenta ; neque enim vnus est semper humor peccans ; frequenter enim bilis aliis humorib. prauis in hoc malo permisceri solet, & propterea quæ bilem purgare possunt, aliis magna ex parte permiscenda sunt.

REVELLENTIBVS *diuertentibûsque.*

Vena cephalica secetur, id quæ repetitis vicibus, modò à sanguine, vel à calidis humoribus malum fiat.

Clysteres acres plurimùm hîc profunt, potissimùm si sanguinem educere non licet.

Frictiones extremitatum panno lineo calente fient ; plurimùm enim laudantur : descendemus autem sensim, à brachiis colloque vsque ad pedes. Caput autem non attingemus ; eius enim frictio nocet, nisi optimè purgatum fuerit antea corpus vniuersum, cum caput potius repleat vaporibus humoribûsque.

Cucurbitule cum scarificatione partibus distantioribus primò applicentur, hinc occipitio apponantur.

Hæmorrhoidarum venarum apertio fiat, menstruorumque prouocatio.

Sternutamenta.

Gargarismi.

Apophlegmatismi.

Cauterium è fermento, cantharidibus, aceto ; occipiti post aures apponentur. Vel eius loco fiat cauterium actua-

actuale in capitis summitate; optimè enim resoluuntur vapores hac ratione.

Errhina è succo cyclaminis, aut anagallidis, qui naribus attrahetur. Aut nigella oleo veteri, introque admixto; prædicto modo naribus attrahatur; optimè enim caput per nares purgat.

SISTENTIBVS spirituum motus turbulentos.

Syrupus cidoniorum, granatorum, rosatus.

Saccharum rosaceum.

Succus berberorum, Ribes.

Dacidonium sine speciebus.

Aqua lactucæ rosacca, violarum, plantaginis, melissophylli.

Odoramentum cum camphora, rosas, acetoque fiat.

Oleum rosaceum.

Irrigatio capitis ex oleo rosaceo & aceto.

Postquam alimenta sumpserit æger, dentur præsentia in eum finem, ne vapores ad caput ferantur.

CONFORTANTIBVS & resolventibus reliquias.

Syrupus de pomis, stœchade, buglossa.

Conserua boraginis, buglossæ.

Saccharum rosatum.

Diarhodum abbatis, aromaticum rosatum.

Diatragacanthum frigidum, diatrium sandalorum.

Diamuscum dulce.

Decoctum rorismarini, betonici, euphrasie, menthæ, saluie, stœchados, centaurei minoris, galangæ, cinnamomi, seminum fœniculi, anisi, glycyrrhizæ.

Odoramentum ex nigella, maiorana, castoreo.

Embriochia capitis fiat ex digerentium materia.

Balneum fiat ex iisdem.

Cauterium prædictum.

THEORICA ET EMPIRICA MEDICA-

menta nobilia in VERTIGINE sæpius cum summa salute plurimorum ægrotorum à Gualtero Bruele experta.

D

CVRATIO VERTIGINIS.

R^x radicū aconit, galangæ, angelicæ ana 3 iiij saluæ,
origani, menthæ, ana m. j. sem. florum betonicæ, stœcha-
dos, centaurei minoris ana in. j. seminum anisi, fœnicu-
li, carui ana 3 j agarici albi & leuis 3 ij. seminum car-
thami 3 sem. polypodij, senæ Alexandrinæ ana 3 vj.
coquantur in aqua q. s. ad t^h j. sem. colaturæ adde pulue-
ris diasenæ 3 ij. hieræ diacolocynth. 3 j. diacatho. 3 j.
fiat *Clystere*.

R^x syrūpi de cichoreo cum rhabarbaro 3 ij. syrūpi de
succo endiuicæ 3 j. sem. aquarum absinthij, cichorei, en-
diuicæ ana 3 iiij. fiat *Iuleb*.

R^x rad. graminis 3 j. sem. foliorum endiuicæ, cichorei
ana m. j. sem. seminum anisi, fœniculi ana 3 iiij. glycy-
rhizæ rasæ 3 sem. polypodij quercini 3 j. rhabarb. electi
3 iiij. coquantur in aqua q. s. ad t^h j. sem. colaturæ adde
syrūpi rosarum solutiui 3 iiij. fiat *Potio*.

R^x pillul hieræ picræ Galeni, aggregatiuarum ana 3
j. sc. syrūpi mentæ q. s. fiant *Pillule* quæ imperabuntur si
à vetriculo mobiles vapores cerebri spiritus perturbent.

R^x pilli. Arabicarum, sp. hieræ simp. Galeni ana 3. sem.
rhabar. optimi, agarici trochiscati ana 3 sem. diagridij
gr. iiij. syrūpi mentæ & stœchados q. s. fiant *Pillule*; ante
cœnam sumat hora vna semel in septimana dragmam
mediam.

R^x radicū betonicæ, asari ana 3 j. hordei mundi 3 se.
seminum raphani 3 j. coquantur in aqua q. s. ad tertiæ
partis cōsumptionem. Huius colaturę sumatur 3 v. qui-
bus adde oxymæilis squillitici 3 ij. sumantur in aurora.
Postea sumat iusculi gallinarum bonā quantitātē, pau-
lō q. pōt ad vomendum se cōponat, & reiteret iuscula.

R^x syrūpi granat. acetosi simplicis ana 3 j. sem. deco-
ctionis hordei 3 vj. aquarum endiuicæ, plantaginis, la-
tucæ ana 3 j. sc. fiat *Iuleb*. vapores ascendentes prohi-
bet, & stitque spirituum morus.

R^x carnis cidoniorum 3 ij. conseruæ rosarum 3 j. an-
thos 3 se. aromatici rosati Gabri. 3 j. sc. syrūpi rosati 3 j.
se. mi-

se. misceantur; fiat *Mixtura*; à cœna necnon à prandio detur dragma vna.

℞ foliorum saluiae m. iij. seminum pæoniæ ʒ j. anisi ʒ se. glycyrrhizæ rasæ ʒ vj. castorei ʒ j. coquantur in vini sufficienti quantitate ad lb j. fiat *Potio*.

℞ radicum galangæ, zedoariæ ana ʒ iij. saluiae ʒ ij. se. zinziberis conditi ʒ j. nucis muscatæ, cinnamomi ana ʒ j. seminum pæoniæ ʒ j. se. iuniperi ʒ j. mentæ ʒ j. se. syrupi rosati simplicis q. s. fiat *Electuarium* molle.

℞ aromatici rosati, diarhod. abbatis sine moscho ana ʒ j. sacchari albissimi & aquarum absinthij ana q. s. fiat *Electuarium in Tabulis*.

℞ seminum nigellæ Romanæ ʒ ij. nitri ʒ j. olei antiqui q. s. fiat *Caputpurgium*.

℞ succi betæ, maioranæ ana ʒ j. se. succi foliorum cucumeris siluestris ʒ iij. nigellæ Romanæ ʒ j. misceantur; huius portio al qua naribus attrahatur.

℞ vuarum passarum enucleatarum ʒ ij. hyssopi, organi ana ʒ j. acori conditi, seminum sinapi ana ʒ j. se. piperis, mastichis ana ʒ j. mellis q. s. fiat *Masticatorium*.

℞. radicum asari ʒ se. foliorum betonicæ, saluiae ana m. j. pyrethri, seminum sinapi ana ʒ se. coquantur in aqua q. s. ad tertijæ partis consumptionem; colaturæ adde oxymellis ʒ ij. fiat *Gargarismus*.

℞ olei liliorum alborum ʒ j. sem. de castoreo ʒ sem. vini odoriferi ʒ iij. bulliant ad vini consumptionem; hinc adde ceræ & aceti parum; fiat *Vnguentum*.

℞ foliorum betonicæ, florum camomillæ, rosarum ana m. j. seminum nigellæ ʒ sem. coriandri præparati ʒ iij siccata modicè contundantur, & consuantur in pan-nolineo ad *Pileoli* formam.

A P P E N D I X

ad prædicta pro curatione VERTI-
GINIS inferuiens.

Omnium primò acri clysterio excrementa quæ in intestinis ob-

D ij

hærent, à quibus vapores acres ad caput deferuntur, educemus. Demum venæ sectionem instituimus ut prædictum est: si nihil impediat. Hinc purgâre medicamēto vacuabimus plenus humores peccantes, vaporūque copiam generātes. Postea frictionibus, ventosis scarificationibus, clysteribus reuellemus vaporum impetum in partē oppositam. Adstringētia, vaporūque ascensum ad caput prohibentia, etiam mox à principio imperabūtur, cum aquæ nimirum rosatæ ℥ ij aceti ℥ iij. Postremò ventriculum caputque roborabimus, reliquiāsque discutiemus masticatoriis, nasi purgiis, aliisque huiusmodi ingeniis. Quæ omnia nunc anteaque dictis medicamentis felicissimo cū successu cōsequi poterimus, modò universalia particularibus debita ratione adhibeantur. Si à stomacho malum originē habeat, quod ut plurimum fit, vomitus promoveatur, ut prædictum est. Si à matrice aut aliis membris id fiat curetur ut in iis locis ostenditur, post confortetur cerebrum. Si fiat à rebus velociter circumductis vel motis, à conspectu eorum ablegetur. Si ob diuturnam fiat inediam, crustam panis in vino generoso madefactam sumat. Si ab humoribus subsistentibus fluereque solitis oriatur, eorum excretionem usitatam sollicitabimus.



Methodus pro Cognitione

INCUBI

INSERVIENTS.

INCUBVS est passio, in qua homo à magna mole incubēte suffocari se in somno putat, loquēdi respirandique cōcurrit magna difficultas, sensūsque stupefcūt, nō autē adimūtur. Ab epilepsia differt in eo, quòd materia epilepsiā faciēs sit venenata, nequaquā autē in incubo. Præterea hīc nulla sit convulsio uti in epilepsia euenit.

PARS AFFECTA. Præcordia diaphragmatisque partes hīc affici contingit; id quod ex actione laesa constat, homo equidem se suffocari ab aliqua re incumbente imaginatur; spiritus quoque cum difficultate magna ducitur. Cerebrum insuper in hoc malo lædi contingit, per con-

per consensum partium subiectarum; à fumis equidem ascendentibus contingit motrices sensibilisque functiones perturbari; sensus equidem fit torpidus, difficilisque motus. male denique imaginantur.

SIGNA. Difficilis fit motus, atque ab aliqua re se inuadi aut opprimi homo credit; aliquid enim suo insidere pectori putat, torpidusque fit in somno sensus, suffocationisque fit imaginatio, ita ut vocem edere non possit etiam si clamare laboret, aut saltem incerta maleque discreta editur vox, & aliquando quoque mugit ut flentes. Phantasia ita quoque offenditur, ut subinde spectrum serio adesse existimet, unde anxietas tandem etiam concurrit, clamandique desiderium enascitur, hincque sanguinem quasi ebullire contingit atque incallescere, sicque spiritibus attenuatis, meatibusque apertis, perrupto somno, repente homo excitatur.

CAUSA. A crassa frigidaque pituita, necnon à sanguine crasso atque melancholico circa præcordia venasque pectoris existente oritur, unde vapores crassi eructantur; quibus quotiescunque vapores multi crudi à crapula enati permiscentur, tunc dictis in locis partes diaphragmatis premuntur, necnon pulmonis, unde impeditè homo respirat, seque suffocari putat; hinc ubi in fauces se insinuat, vox suppressi videtur. In cerebrum denique si transmittantur, sensum ipsamque mentem perturbant tristibus quibusdam spectris. Tales vapores aliquando etiam eructant hæmorrhoides mensisque suppressi in illis in quibus fluere consueuerunt. Nequaquam autem ab insultante fit vetula, ut multis persuasum est etiam hodie.

PROGNOSTICA. Incubo diæta utens tenui vix molestat, multis autem cruditatibus oneratis familiare est. Rarius quoque irruit in illos qui in lateri incumbunt. Hic affectus si frequentius diutiusque concurrat, apoplexiam tandem minatur, aut epilepsiam, necnon maniam, sæpius melancholiam hypochondriacam, vertiginem, paralysem, spasmus, nervorum distentionem.

D üj

aut subitam mortem: Neque enim rarum est multos fuisse è medio ablatos tempore somni in lecto. Pueris magis est frequens malum, & obesis corporibus, nec non quibus concoctio impeditur. In hoc malo postquam expectati fuerint, frigidi sudores, cordisve tremores si fiant, pessimum est.



Methodus pro curatione

INCUBI

INSERVIENS.

Perficitur autem subsequentibus remediorum generibus.

VICTVS RATIONE.

Aer moderatè sit calidus atque lucidus. Frigora, ventos, solarèsque radices vitent.

Cibus sit facilis concoctionis bonique succi, non ventosus. Parùmque comedat, potissimùm tempore cenæ.

Potus sit vinum album, aquosum.

Somnus diurnus, & potissimùm qui statim à cibo admittitur, noxius est.

Excrementa alui respondeant arte, aut natura.

Animi quies concilianda.

RRAPARANTIBVS.

Syr. stœchados, menthæ, absinthij.

Oxymel simplex.

Melicratum.

Aqua absinthij, maioranæ, buglossæ, betonicæ, fumaricæ.

Decoctum radicum fœniculi, petroselini, rorismarini,

hyssopi, endiuicæ, boraginis, buglossæ, fumaricæ, cuscuta,

ceterach, cichorei, summitatum lupulorum, capil-

lorum Veneris, florum violarum, corticum capparo-

rum, glycyrrhizæ, viuarum passarum, melle & saccharo addito.

Syrupus

Syrupus fumaræ, lupulorum, pomorum.

Prioribus dum pituita plus æquo redundat, posterioribus verò dum melancholia exuberat, utemur. Idem in purgantium materia obseruetur.

VACVANTIBVS.

Venæ sectio fiet si corpus fuerit plethoricum, aut si menses aut hæmorrhoides retineantur præter consuetudinem, primò quidem saphenæ, postero die secetur humeraria, eoquæ liberius educatur quò sanguis crassior fuerit: tandem si præcedentium subsequen-
tiumque usu malum non profligatur, vena frontis, aut ea quæ sub lingua est, secetur.

Pillulæ coccinæ, de agarico, mastichinæ, stomaticæ.

Hiera picra Galeni, Hiera diacolocynthides, legodij Ruffi.

Cassia fistula.

Pillulæ de lapide lazuli.

Diacatholicum, Diaphœnicum.

Diasena.

Sena.

REVELLENTIBVS *deriuantiblsquo.*

Clysteres acres.

Cucurbitulæ furis crurum appositæ.

Frictiones capitis in posteriori parte fiant, atque pectinationes.

Errhina leuia.

Gargarismi.

Sternutamentum cientia.

Apophlegmatismi leues.

PROHIBENTIBVS *vapores su, sum
ascendere.*

Diarhodum abbatis.

Caro cydoniorum sine speciebus.

Diamargaritum frigidum.

Saccharum rosatum.

Corallum.

D. iiij

CORROBORANTIBVS, *digerentibus, resolventibusque reliquias.*

Theriaca, Diambra; Dianoscum dulce.

Aromaticum rosatum; Plinifarcoticum.

Dianthos.

Conserua anthos, buglossę, acori.

Pæonię semen nigrum & radix.

Nux muscata.

Unctio capitis, pectoris, & ventriculi ex oleo camomelino, anethino, calido vino.

Fomentatio capitis ex oleo anethino calente.

Dropax tum capiti, tum hypochondriis aptari potest ex quinque partib. picis, & vna olei spicę, vel mastiches; modicę autem caleat dum applicatur, linteolq; detrito implicetur, ne cuti pertinaciũs inhæreat.

Sacculus ex floribus buglossę, violarum, rosarum, foliis melissę, quę vino albo & aqua melissę irrorentur, cordique applicentur; modicę autem caleant.

Cucupha fiat ex betonica, sampsucho, floribus anthos, stœchados, rosarum rubrarũ, cortice citri, caryophyllis, nuce muscata, radice cyperi, coriandro præparato, oleo anethino.

THEORICA ET EMPIRICA MEDICAMENTA nobilia in INCUBO, *sæpius cum summa salute plurimorum agrotorum à Gualtero Bruel experta.*

CVRATIO INCUBI.

℞ decocti subiecti lb. j. in eo dissoluantur sp. hierælogod. 3 j. β. pul. sancti 3 ij. β. ol. camomelini, anethini, rutacei ana 3 j. vini maluatici 3 iiij, fiat *Clystere*.

℞ radicum acori 3 β. angelicę 3 vj. foliorum betonicę, chamęd. violarum ana m. j. rosarum rubrarum, camomillę, meliloti ana m. β. coquantur in iusculo car-

carniū q. s. ad lb j. s. colaturę adde pul. diasenę 3 ij. hierę logod. 3 j. diacatho 3 s. olei rutacei, camomel. ana 3 j. s. salis 3 j. fiat *Enema*.

R̄ syr. stœchados, absinthij ana 3 j. s. oxymellis simpl. syr. menthę ana 3 s. aquarum absinthij, buglossę, lupulorum ana 3 iiij. fiat *Iulepium*: dentur 3 iiij.

R̄ diasenę 3 j. s. diaturbith cum rhabar. 3 vj. oxymellis simpl. 3 j. aquarum lupulorum, fumaricę ana 3 j. s. fiat *Haustus*.

R̄ pili. de agarię. cochiarum ana 3 j. s. pul. hierę logod. 3 s. syr. stœchados q. s. fiant *Pillulę* viij. sumantur post medium noctis.

R̄ theriacę androm. 3 j. mithridat. angel. ana 3 j. aquarum angelicę, cardui benedicti ana 3 j. s. fiat *Bolus*: detur postero die manẽ.

R̄ oxymellis squillitici 3 ij. decocti raphani 3 vj. olei dulcis 3 j. s. fiat *Vomitorium* medicamentum, quo cruditates ventriculi ex crapula enati propellantur.

R̄ rad. acori, angelicę, pęonię ana 3 s. fęniculi, graminis ana 3 j. fumaricę, betonice, cuscutę, scolopendrię, acetosę ana m. j. hyssopi, prassij, endiuicę, boraginis ana m. s. sem. anisi, cumini ana 3 s. vuatum passarum 3 j. pruna Damascena numero viij. flor. cordial. ana m. s. senę Alexan. polypodij quercini ana 3 j. agarici albi & leuis, zinzib. ana 3 j. s. nucis muscatę 3 ij. coquantur in aqua q. s. ad lb j. s. colaturę adde mellis optimę despumati, sacchari albißimi ana 3 j. fiat *Potio*; qua vtetur vbi plenius concocti ex vrina obseruabuntur humores: dentur 3 iiij. in aurora per quatuor vel quinque dies.

R̄ conf. acori 3 iiij. detur 3 j. singulis vicibus post sumptum pharmacum.

R̄ arom. ros. Gabri. 3 iiij. theriacę veteris 3 j. s. plerisarcotici 3 iiij. diamulci dulcis 3 ij. s. conseruę anthos, acori ana 3 iiij. seminum pęonię 3 iiij. coriandri præparati 3 ij. syrupi stœchados q. s. ad *Electuary* consisten-
tiam: detur à cibo 3 j.

℞ diacimi 3 ij. seminum anisi, rad. enulæ campanæ, angelicę ana 3 j. ꝑ. aromat. rosati Gabrielis 3 ij. ꝑ. nucis muscatæ, cinnamomi ana 3 j. corticum citri cond. 3 j. ꝑ. syr. de epithymo q. s. fiat *Elect.* ad formam opiati.

℞ olei anethini, amygdalarum dulcium ana 3 j. camomelini 3 ꝑ. seminum pæonię 3 ꝑ. vini generosi non-nihil, & ceræ q. s. fiat *Unguentum* pro thorace & ventriculo.

℞ betonice sicce 3 j. florum stœchados, rosarum rubrarum, flor. anthos ana 3 ꝑ. nucis muscatæ, caryophylli ana 3 ij. rad. cyperi, corticum citrei mali ana 3 iij. fiat *Cucupha*.

℞ corticum citri sicci 3 ꝑ. cyperi, caryophyllorum ana 3 ij. cœcci infectorij 3 iij. coriandri præparati 3 ij. ꝑ. sampsuchi sicci, betonice sicce ana 3 ꝑ. stœchados Arabici, rosarum rubrarum ana 3 ij. fiat *Pulvis* crassiuscule contusus pro *Sacculo*; qui capiti accommodatus, plurimum confortat cerebrum.

℞ seminum corticum citri, rad. galangæ ana 3. iij. foliorum melissę m. j. florum buglossæ, boraginis, stœchados, rorismarini ana m. j. electuarij de gemmis 3 j. ꝑ. fiat *Sacculus*, qui cordi applicetur cum vino maluatico irrigatus.

APPENDIX

Ad prædicta pro curatione INCUBI inferuens.

Clysteri primò leni materiæ communes educantur; hinc sanguine abundante venæ sectio fiat, ut prædictum est. Demum humores peccantes naturæ obediētes reddantur; postea conuenientibus medicamentis e corpore excludantur. Hinc cerebrum vacuandum quoque erit gargarismate, aut apoflegmatismate, sternutatoriūve medicamento conuenienti, alijsq; ingenijs antè dictis. Postea quæ vaporum accensum ad cerebrum prohibere possunt præscribantur. Tandem corroborantibus, reliquijsq; consumen-

summentibus locus erit. Quæ omnia nunc anteaque dictis medicamentis felicissimo cum successu consequi poterimus; modo universalia particularibus debita ratione adhibeantur.



Methodus pro cognitione

EPILEPSIÆ IN-
SERVIENS.

EPILEPSIA, seu morbus caducus, est conuulsio omnium corporis partium, non perpetua, sed quæ temporum accidit interuallis, cum mentis ac sensuum oblæfione. Noménque inditum est à symptómate ingenti quod in hoc malo hominẽ vigere solet. Statuuntur autem epilepsiæ differentiæ tres. Vel enim fit cum cerebrum laborat per se, quòd fit cum fomes mali ibi ortum habet: Vel oritur propter consensum oris ventriculi malè affecti, aut propter consensum cuiuspiam alterius partis subiectæ, à qua per occultos ductus in cerebrum serpit veneni labes: aliqui enim dicunt se laboraturos antequã paroxysmus inuadat; sentiunt enim causam mali ex ea parte corporis in qua mali fomes est, instat vaporis, frigidiorisq; auræ, in cerebrum traduci per partium continuitatem. Estque causa mali plerumque vapor quidã venenosus ab inferiori aliqua corporis parte ad cerebrum delatus; tuncque homo subito conuulsione concidit. Capite autem primaria affectione laborante, oculi obscurantur & caligant, caput dolet, eiusque concurrit grauitas. Tarditate sensuum atque mentis laborant, turbulentis insomniis agitantur, subitoque fit accessio. Dum ab ore ventriculi malum originem habuerit, plerumque ægri deterius se habent, imò & paroxysmus inuadit, cum diu ieiuni permanet, aut cibum nullum sumunt. Et antequã accessio fit, nauseam, erosionem, atque perturbationem iuxta stomachum per-

cipiunt, necnon fluctuationem palpitationemque. Tandem etiam syncope succedit. Hinc pituitæ aut bilis vomitus concurret cum paroxysmus soluitur. Differt à spasmis speciebus, eò quòd in epilepsia non sit perpetua conuulsio, vti est in speciebus spasmis. Sensibiles denique operationes, necnon principes, in epilepsia laborant; in spasmo verò principes functiones illæse permanent. Est etiam leuior epilepsiæ species, in qua symptomata multo mitiora concurrunt, affinitatem magnam cum vertigine habens.

PARS AFFECTA est cerebrum, id quod patet ex functionibus oblæsis. Læduntur enim tam principes quàm motrices atque sensibiles facultates. Cerebrum autem hîc, vti dictum est, afficitur aut per se, aut per consensum oris ventriculi, aut per consensum alterius partis. Signa autem partis affectæ, ex prædictis patent. Cum autem subitanea sit accessio, cerebrum vt instrumentalis pars, secundum ventriculos nimirum afficitur, & potissimum secundum medium, non ita secundum anteriores. Non autem afficitur, vt similis, cum id absque intemperie fieri haud possit. Est autem epilepsia symptoma pertinens ad actionem læsam facultatum animalium, contingit enim motum, sensum, principelque facultates omnes obledî, differenter tamen: motrix equidem facultas deprauata est, princeps autem & sensibilis, ablata læsa est.

SIGNA. Cum multa spuma fit accessio sæpe subitò. Estq. præcipua seu peculiaris huius mali nota, spuma; quæ in longum deduci potest si trahatur. In leuiori tamen epilepsia non apparet. Hinc sensibus orbatus vbi est, sequitur casus cum calida corporis concussionem, contorta concurret facies, oculi quoque inuertuntur, subinde pectori maxilla impingitur, aliquando verò in scapulas contorquetur. Sæpe quoque seminis, subinde etiam stercoreis, necnon vrine inuoluntaria sit effusio, solutis musculis, hæcque fortis epilepsiæ signa sunt. Præterea stertunt, interdumque vociferantur, impotens

VOX

vox sæpe concurrir, qualis sit angulatis pænè. Linguam sæpe exerunt, quam ne dentibus vulnerent, periculum est. Aliàs ita arcte dentes inter se colliduntur, & ita arcte clauduntur, vt ne suffocetur quoque periculum sit. Tempore aliquo interposito ad se redeunt, propriisque viribus surgunt vbi remissio fit mali. Præcedit autem frequenter spiratio impedita. Aliqui ab occipitio ad capitis verticem vaporem sentiunt ascendere frigidum. Venter præcordiaque flatibus tument, & sæpe obmurmurant aliquibus. Faciei etiam præcedit pallor, inordinatusque linguæ motus, capitisque dolor atque grauitas, necnon obliuio, tristitia, animique inconstantia, somnia turbulenta, hinc vertigine agitantur. Obiiciunt se oculis aliquando tenebræ, aliàs splendores obscuri varique.

CAVSA. Magna ex parte fit à copia humoris melancholici atque pituitosi, vnde vapores corrupti, venenosi, virulentique efflorescunt, à quibus obstructions in meatibus cerebri fiunt, spirituumque hac ratione transitus impeditur; vnde cerebrum, principiumque nervorum, vt expellat id quod obluetur, seipsum quasi contrahit atque concutit, id quod noxium est vt propellat, siue vapor, siue humor fuerit.

PROGNOSTICA. Pueros maximè molestare solet hæc calamitas, eò quòd humidior sint cerebro; deinde adolescentes, post hos ætate consistentes, minimè omnium senes. Magis etiam familiaris est viris quàm feminis. Longus autem solet esse morbus, qui nisi pubertatis tempore, vel menstruorum initio tollatur, vsque ad mortis diem sæpe prorogatur. Cum enim magnæ alterationes fiant in pubertate, si tunc non soluantur, vsque in maturam ætatem comitabitur. Epilepsia inueterata incurabilis est, vti & ea quæ ab ortu comitatur. Quemadmodum autem tempore. Veris magis irruit hic morbus, si eodem quoque tempore magis est periculosus. Rursum cum vniuersum corpus afficitur, & derepente irruit, absque eo quod sensum ipsius mali in aliqua cor-

poris parte à capite semota prius percipiat, vix sanescit. Si quoque morbus hic acutissimus fuerit, crebrisque accessionibus, & symptomatum magnitudine urgeat, breui tempore ipsum iugulabit. Quartana aliave febris diuturna si corripatur, saepe pro valetudine est ipsi epileptico.



Methodus pro curatione

**EPILEPSIÆ INSE-
VIENS.**

Perficitur autem subsequentibus remediorum generibus.

VICTVS RATIONE.

AER sit calidus atque siccus.
Cibus. Carnes conueniunt, caucularum montanarum, gallinarum. Vitentur pisces, legumina, carnes porcinae, allium, sinapi, cepe, daucus, nuces, palmulae. Capparorum vsus plurimum hic prodest. Incidentibus extenuantibusque alimenta rebus condiantur, vti est serpyllum, hyssopus, pulegium.

Potus. Vinum sit aquosum tenue, non vetustum. Mulsas.

Exercitationes corporis proderunt, capitisque frictiones. Vti moderatus vsus Veneris iuuat, sic immodicus plurimum nocet.

Somnum fugiat quam maximè diurnum; sitque nocte mediocris.

Excrementa alui respondeant arte, aut natura.

Sollicitudines, timores, aliaeque animi perturbationes vitentur.

PRAEPARANTIBVS.

Oxymel squilliticum, simplex.

Syr. de hyssopo.

Syr.

Syrupus stœchados.

Syrupus de absinthio, pomisq̃ue.

Syrupus acetosus simplex & compositus.

Decoctum betonicæ, hyssopi, stœchados, radicum & seminum pæoniæ, maioranæ, rorismarini, absinthij, seminum fœniculi, anisi, cinnamomi, glycyrrhizæ, oxymelle simplici addito.

Aqua beronicæ, pæoniæ, hyssopi, primulæ veris, saluiæ, buglossæ, meli ssophylli.

VACVANTIBVS.

Venæ malleoli sectio fiet; hinc cephalicæ in principio veris, si inueteratum sit malum; & si per consensum fiat.

Diaphœnicum, electuarius Indum.

Agaricus trochiscatus præstans in hoc malo est medicamentum.

Hiera Galeni simplex, logodij, hiera diacolocynth. præstans est & hoc medicamentum.

Pillulæ aureæ, sine quibus esse nolo, alephanginæ, asai eret, & hermodactylis.

Pillulæ coccinæ, fœtidæ, mastichinæ, de euphorbio.

Elleborus niger.

Decoctum radicum pæoniæ, foliorum saluiæ, hyssopi, betonicæ, primulæ veris, meli ssophylli, stœchados, buglossæ, seminum anisi, pæoniæ, glycyrrhizæ, cinnamomi, nucis muscatæ, addito electuario Indo, agarico trochiscato.

AVERTENTIBVS.

Clysteribus ex decocto aristolochiæ, mercurialis, camomillæ, radicum pæoniæ, betonicæ, thymi, pulegij, centaurei minoris, agarici, calaminthæ, addita hiera picra, melle rosato, hiera diacolocynthidos, oleo rutaceo.

Suppositoria.

Apophlegmatismi ex seminibus pæoniæ, pyrethro, mastiche.

Masticatoria ex hyposso, nuce muscata, castoreo, radice

pæoniæ, pyrethro, zinzibere, mastiche, staphisagria, vuis passis.

Nasalia ex succo radicum pæoniæ, rutæ, mummiæ, melle.

Gargarismus ex vino & aceto in quo coquantur flores stœchados, folia origani, hyssopi, betonicæ, sampsuchi, calaminthæ, sinapi, pyrethrum, nigella Romana; addaturque oxymel squilliticum.

Sternutatorium ex pipere, elleboro, castoreo, radice pæoniæ, nuce muscata.

Cucurbitulæ cum scarificatione, scapulis atque hypochondriis, necnon poplitibus vel malleolis affigendæ, si per consensum fiat. Hinc etiam occipitio. Maxime autem apponentur partibus extremis, si ab illis malum deriuetur, & potissimum si pars ea ligari non possit, ut est matrix: hinc emplastra apponenda, aut mithridatum, aut theriaca, aut hæc eadem cum rubificantibus apponantur.

Ligaturæ partium extremarum fient, præsertim si ab iis malum oriri videatur, viâque sic vapor præcludatur.

Frictiones fient à partibus supernis ad infernas transfundo.

Hæmorrhoides aperiantur sanguisugis.

Sanguisugæ fronti apponantur, aut aliis convenientibus locis ipsius capitis.

Cauteria in posteriori capitis parte fiant, si per se laboret cerebrum. Nequaquam autem id fiat dum à parte distantis cerebro vapor venenosus communicatur, nisi ubi temporis diuturnitate cerebrum per essentiam laborauerit.

Rubificantia medicamenta collo, necnon parti à qua vapor venenatus profunditur, adhiberi quoque poterunt, ex sinapio, euphorbio, pipere, cantharidibus, aceto forti, fermentoque.

CORROBORANTIBVS, *resoluentibusque materiam reliquam, intemperiemque cerebri emendantibus.*

The-

Theriaca, mithridatum, horumque sit usus longus.

Conserua magna nostre descriptionis mirabiles in hoc morbo sepe vires exerit.

Plirisarcoticum, diarhodum abbatis, diacorum, diamus- cum dulce & amarum.

Conserua rorismarini, acori, stœchados, saluię.

Cortices citri saccharo conditæ, pyrethrum conditum.

Aqua floribus tilię destillata, præstans est. sic & scobs eboris, necnon viscus quercinus.

Cornu ceruinum, ungula asinina, ossa humana combu- sta, assafoetida, pyrethrum, hyssopus, herba paralytis, enula campana, pœonię radix & semen, ruta, smarag- dus, palmę Christi semen, agaricus, craneum huma- num, pro femina maris, & contrà, ad albedinem v- sum. Ex eius usu quotidiano malum in aliquibus sa- natur; dosis dragma vna. Vesica apri ab animali cum vrina calens exempta, siccataque in furno donec in puluerem redigi possit. medicamentum ex squilla. Decoctum guaiaci, sarsaparillę, cynę.

Oleum philosophorum.

Unguentum ex oleo rutaceo, euphorbij, de lateribus, vulpino.

Cataplasma ex pane tosto, & tritico cum mithridato, radice pœonię, serpyllo, aqua mulsa.

Balneum.

Cauterium fiat in occipitio, aut in carnosa brachij par- te, si prioribus nihil profecerimus, aut in commissura capitis anteriori.

~~~~~

**THEORICA ET EMPIRICA MEDICA-**

*menta nobilia in EPILEPSIA, sæpius cum summa salute plurimorum egrotorum à Gualtero Bruel experta.*

**CURATIO EPILEPSIAE.**

**R**

℞ radicū pēonię ꝥ j. acri, aristolochię ana ꝥ sem. rutę, centaurei minoris, absinthij, saluie, hyssopi, betonicę ana m. se. seminum anisi ꝥ j. pulpę colocynthidos ꝥ j. coquantur in aqua q. s. ad lb. j. sem. colaturę adde sp. hierę logod. ꝥ j. diacatho. ꝥ j. sem. olei camomelini ꝥ iij. mellis ꝥ ij. salis communis ꝥ j. fiat *Clystere*, detur ante prandium hora conuenienti, tum in accessione si diutius duret, tum extra.

℞ syrupi stœchados, hyssopi, oxymellis squillitici ana ꝥ j. sem. decoctionis hyssopi, stœchados, calaminthę, saluie, betonicę, rorismarini ꝥ x. fiat *Zuleb*; dentur vncię quatuor in aurora per quatuor vel quinque dies.

℞ oxymellis squillitici lb. se. detur ꝥ j. se. cum decocto saluie, pæonię, hyssopi.

℞ pill. fœtidarum, alephanginarum, cocciarum ana ꝥ j. ellebori nigri gr. vj. syrupi stœmachados q. s. fiant *Pillulę* octo, dentur post medium noctis.

℞ radicū acri, angelicę ana ꝥ iij. corticū radicū sambuci ꝥ se. seminis rutę ꝥ se. radicis pēonię ꝥ se. foliorum betonicę, rorismarini, hyssopi, pulegij, absinthij, thymi, saluie, melissę ana m. j. stœchados arabici, maioranę ana m. se. florum buglossę, boraginis ana m. j. se. seminum anisi fœniculi ana ꝥ iij. glycyrrhizę rasę ꝥ v. vuarum passarum enuncleatarum ꝥ j. agarici albi & leuis ꝥ vj. seminum carthami contusi ꝥ sem. polypodij quercini ꝥ j. se. visci quercini ꝥ iij. senę Alexandrinę ꝥ vj. ellebori nigri ꝥ i. zinziberis ꝥ i. coquantur in aqua q. s. ad lb. i. sem. colaturę addatur nucis muscatę, cinnamomi ana ꝥ i. se. syr. de hyssopo, oxymellis simplicis ana ꝥ i. sem. fiat *Potio*.

℞ hierę diacolocynthidos, pillul. fœtidarum, agarici trochiscati ana ꝥ i. castorei gr. vi. fiant *Pillulę* octo, cum syrupo stœchados q. s.

℞ agarici trochiscati ꝥ ii. ellebori nigri, nucis muscatę, piperis ana ꝥ sem. castorei grana octo, syrupi stœchados q. s. fiant *Pillulę*.

℞ mithridati ꝥ i. theriacę ꝥ se. castorei gr. iiii. detur  
in die

in die paroxysmi cum decocto hyssopi, vt antè.

R<sup>x</sup> rad. betonicæ, raphani ana & i. seminum nasturtii, atriplicis, raphani ana 3 ii. coquantur in aqua q. s. ad tertiæ partis consumptionem, dentur & vi. huius colaturæ, tempore paroxysmi, addendo olei nardini & i. fiat *Vomitatorium* medicamentum.

R<sup>x</sup> nucis muscatæ, radicū pēoniæ ana 3 i. ellebori nigri 3 ii. pyrethri, piperis albi ana 3 i. misceantur: fiat *Pulvis sternutatorius*, cuius portio calamo suffletur in nares.

R<sup>x</sup> nucis muscatæ, radicū acori, pēoniæ, zinziberis conditi ana 3 iiii. sinapi candidi, pyrethri ana 3 i. sem. vuarum passarum, mastiches ana 3 i. fiant *Pastilli Masticatorij*.

R<sup>x</sup> corticum radicū sambuci & i. pyrethri, galangæ ana 3 sem. foliorum betonicæ, origani, melissophylli ana m. i. glycyrrhizæ rasæ 3 iiii. seminum anisi 3 iiii. cubebarum 3 i. se. vuarum passarum enucleatarum m. i. coquantur ad 1/2 i. se. in sufficienti quantitate aquæ. colaturæ adde oxymellis squillitici & iiii. fiat *Gargarismus*.

R<sup>x</sup> conseruæ rorismarini, buglossæ ana & i. diamusci dulcis 3 ii. theriacæ veteris, mithridati optimi ana 3 i. se. seminum pēoniæ & radicū ana 3 ii. herbæ paralysis, rhabarbari ana 3 i. pyrethri, seminis sanctonici ana 3 ii. se. saluiæ 3 ii. visci quercini 3 i. ossis caluariæ 3 ii. corticum citri conditorum 3 ii. se. syrupi de hyssopo q. s. fiat *Mixtura*; postquam purgatus erit, detur 3 i. quatuor horis antè prandium, superbibat aliquantulum post haustum decocti hyssopi.

R<sup>x</sup> sp. diamusci dulcis 3 se. nucis muscatæ, myrrhæ ana 3 se. granorum pēoniæ 3 ii. pulueris cranei humani vsti, rasuræ eboris, cornu ceruini ana 3 i. sacchari albissimi dissoluti in aqua rorismarini & hyssopi q. s. fiat arte *Electuarium in Tabulis*, capiat morsellum vnum aliquando.

R<sup>x</sup> pul. cranei humani vsti, pulueris radicū & seminum pēoniæ ana 3 i. se. castorei, opopanax, mithridati optimi ana 3 ii. fiat *Electuar.* cum syrupo facto cum decocto saluiæ, pēoniæ, rorismarini, betonicæ, squinanthi.

E ij



R<sup>x</sup> afflæ foetidæ, castorei ana ʒ ij. seminum & radicum pæoniæ ana 3 j. nucis muscatæ ʒ ij. diagalange 3 ij. cum iam dicto syrupo fiant *Pillulæ*; detur ʒ se. tēpore somni.

R<sup>x</sup> radicum ireos, pæoniæ, cyperi ana 3 se. seminum pæoniæ, caluariæ humanæ ana 3 ij. macis, nucis muscatæ ana 3 j. se. florum camomillæ m. se. fiat *Cucupha*.

R<sup>x</sup> visci quercini, radicis & seminis pæoniæ ana 3 j. se. nucis muscatæ 3 j. seminum anisi 3 j. sem. sacchari buglossati dragmas septem; fiant *Pillulæ*; dosis 3 j.

## A P P E N D I X

### ad prædicta pro curatione EPILEPSIÆ inserviens.

*Abstineat à rebus vaporosis, & ab iis quæ morbum hunc à proprietate provocare solent, uti est apium vulgè, capro caprina, lactuca, portulaca, omniæque refrigerantia. Tempore intermissionis in maioribus natu. clysterio materiæ cōmunes educantur; hinc si plethoricum sit corpus, venæ sectio fiat. Demum humores peccantes conveniētibus medicamētis naturæ obediētes reddātur, hinc è corpore perturbētur, idque fiat semel singulis septimanis. Humores postea ad cerebrū ruentes, auerātur frictionibus, clysteribus paulo fortioribus. Vinculis quoque vaporibus venenosis præcludatur via, si ab extrema aliqua parte ascendere videantur. & ad cerebrum repere. Vincula autem parum supra locum unde vapores eleuantur, applicabimus. Demū quæ caput uniuersūque corpus corroborare possunt imperabimus. Quæ omnia nūc, anteaque dictis medicamētis felicissimo cū successu consequi poterimus, modò uniuersalia particularibus, debita ratione adhibeantur. Prædictis autē si parū profecerimus, cauterium actuale aut eius loco potentiale profundum excitabimus, ex cantharidibus; fermento acetoque in commissura coronali, si à cerebro huiusmodi venenati vapores profundantur. In pueris autem fiet maximo cum commodo in posteriori parte capitis; vesiculæ autē acu pūgātur: fluereq. per 60. dies permittātur. Trepano quoque absque detrimento in eundem finem craneū aperiri poterit, ut vapores scilicet atri exhalari, materiæque à qua illi eleuātur, possit consumi. Prædicta cauteria locum etiā habebūt in partibus subiectis, à quibus huiusmodi vapores ascen-*

res ascendunt. Tempore autem paroxysmi, si diu perseveret, ut citius finiatur, vocetur sonora voce, nares constringantur, digitus contorqueantur, sternutamenta prouocentur, fiant ligaturae fritionesque partium dolorificae, dentes deducantur mediante baculo; linguae faucesque fricentur: linguae extremitati linteolum adaptetur, intingatque in succo rutae in quo theriaca sit dissoluta. Ruta quoque confricetur, castoreoque, necnon seminibus paeoniae commisceatur naribusque indatur, plurimum enim abbreviabit accessionem. Si per consensum oris ventriculi fiat; vomitus excite- tur, deinde cum hiera purgetur; hinc unguenta, emplastra, alia- que Stomachum conformantia praescribantur medicamenta.



### Methodus pro Cognitione

## SPASMI INSER- VIENS.

**S**PASMVS, conuulsio, seu distensio neruorum, est affectio quæ neruos musculósque ad eundem præter voluntatem cogit affectum, in quem ab animali facultate cum naturalem habitum seruarent, ducebantur; inuoluntarius equidem hic fit motus in parte quæ voluntate moueri solebat. Aliquando autem totum corpus conuulsione subito corripitur; id quod in Epilepsia accidere diximus; in quo casu neruorum principium læditur, cerebrumque totum quasi contrahitur in se, noxium ut expellat. Vnà autem hinc cum sensibus etiam mens ipsa vitatur, propterea quòd ipsum cerebrum hinc laboret. Per interualla quoque perturbat ægrum, quasi quæ recurrit malum; non autem continuo affligit, uti in reliquis neruorum distentionibus accidit. Interdum autem contingit omnes corporis partes, capite excepto, conuelli. Sepius quoque accidit vnā solummodo corporis partem distendi; oculum nimirum, linguam se-

cundum eius radicem, frontis cuticulam, ceruicem, crus, brachium. Motus autem iste deprauatus qui in conuulsis partibus accidit, à motu naturali eiusdem partis non aliter differt, quàm quòd muscoli neruique versus suam originem trahantur vt in motu naturali, sed hìc pręter voluntatem illud fit, & etiam cum maximo dolore. Contingit equidem motum naturalem à voluntate procedere, quę iuxta principium neruorum residens in cerebro, primis neruis confert principium motionis, & hisce mediantibus ipsis musculis conferitur; sicque cōtingit musculos tendi, & ad initia propria retrahi, corporisque partes quibus implantantur, hac ratione secum etiam trahunt. Est quoque conuulsionis quędam species interim superioribus multo leuior; quę à crassis flatibus originem habet, dum in neruorum substantiam se insinuant; dolorem autem & hi quidem validum excitant, interim perbreuem; sæpius enim per se breuissimo temporis spatio soluitur; aliàs etiam frictione mitescit. Per horę autem spatium vix affligit; experimurque hanc speciem spasmī frequenter in cruribus, aliàs in manuum pedumque digitis. Nonnullis tamen ita arctē ex hac causa contrahuntur crura, brachięque, & subinde etiam manus, vt vix magnis viribus ab assistantibus exporrigi possint, priusquam accessio finiatur.

**PARS AFFECTA.** Aliquando afficitur hìc cerebrum primariò, tuncque concurrit conuulsio faciei cum toto corpore, nullaque affectio pręcedit. Sæpius verò accidit conuulsio musculis determinatę partis, vnde partes affectę musculum affectum ostendunt; semper enim affectio referri debet ad musculum aut neruum qui author est istius motus qui iam lęsus est in parte aliqua. Musculis enim est proprium motionis instrumentum, qui si pręter voluntatem ad suum principium contrahatur, lęsus meritò dicitur; vt in oculi spasmō, qui strabismus dicitur, muscoli ipsum mouentes conuelluntur, sicque de cęteris partibus; in omnibus enim huiusmodi malis semper musculus vnus, aliquādo etiam



etiam plures ad sua ipsorum principia contrahuntur, partemque cui inferuntur secum adducunt, motuque priuant, ita ut aut recta videatur, aut inflexa aut contorta. Si labra conuellantur, musculus latus affectus, est, ex quo labiorum muscoli oriuntur. Idem de aliis corporis partibus dicendum.

**SIGNA.** In omni neruorum distentione dolor plerumque concurrit vehementissimus, qui vires immodicè consumere potest, si persistat. Pars affecta sic versus suam originem attrahitur, mediantibus neruis musculisque; idque præter voluntatem, ut ad pristinum habitum reduci non possit. Dum autem partes omnes capiti subiectæ conuellantur, contingit præter dicta, corpus aut nullo modo inflecti posse, aut in priora ita detorqueri, ut caput scapulis quasi comittatur. Facies rubore perfunditur doloreque molestat. Ex oculis lacrymæ fluunt, qui etiam distorquentur, os ipsum vix aperiri potest. Dorsum, maxillæ, manus atque crura rigent. Hinc ubi malum incrementum sumit, dolorum magnitudine ita excarnificatur æger, ut è lecto exiliat pollicem pugno concludens, clamoribus vociferatur, quasi que mente sit captus magnas profundit nugas, tandem etiam potum aliquando per nares reiecit.


**CAUSA** efficiens est aut repletio aut inanitio. Repletio autem fit vel à sanguine; tuncque accidit conuulsio repète etiam in corpore sano, præcessit vita otiosa, crapula, temulentia. Fit etiam simili ratione ab humore pituitoso, qui se uti sanguis in neruorum musculorumque substantiâ insinuat; sic enim contingit ipsos aliquando intumescere & dilatari secundum profunditatem atque latitudinem, & secundum longitudinem necessario contrahuntur, sicque spasmus efficiunt. Dum verò pituitosus humor solidam substantiam ita penetrat ut non intumescat membrum, sed potius relaxetur ob madorè, tunc paralytis, ut antè diximus, fit. Diuersa itaque ratione & spasmus & paralytim humor pitui-



tosus efficere potest. Fit etiam ab apostemate, necnon ex suppressione alicuius vacuationis consuetæ. Aliquando etiam à vaporibus fit crassis, tuncque ut subito oritur, sic facile etiam desinit. Inanition quoque seu siccitas nervi, frequenter spasmus causa est, tuncque longiori gignitur tempore, præcessitque labor vel vigilia immodica, febris ardens, fames, sollicitudo, sudor immodicus, vomitus, alui deiection, sanguinis immodicum profluuium, nimis coitus, inflammatio ardorque magnus partium nervosarum. Ex istis enim causis contingit corpus subinde, & etiam ipsos nervos ita exiccare proprio nervorum humido radicali exhausto, ut propterea haud secus atque coria iuxta ignem posita siccescant, ac in se contrahantur.

**PROGNOSTICA.** Conuulsio ex vulnere vii ex elleboro, lethalis est. Insanabile quoque malum ferè est si ex inanitione fiat, imò omnium pessima est conuulsio talis, solumque laborabimus ne fiat, causam auferendo. Difficulter quoque curabitur, si febris ardentis occasione enata sit, unde febrem conuulsioni superuenire melius est, quam feбри conuulsionem; qui enim à conuulsione vel nervorum distentione tenetur, febre superueniente liberatur. Quicumque tetano corripuntur, in quatuor diebus pereunt; si verò hos euaserint, sani fiunt. Sæpe nimis doloribus excarnificatus æger, furibundo similis redditur: si tunc etiam vocis usum amittat, viribusque destituatur, sudoribusque dissoluatur, potumque per nares reiiciat, mortiferum est.

*Methu*



*Methodus pro Curatione*

**S P A S M I I N S E R -  
V I E N S.**

*Perficitur autem subsequentiis remediorum generibus.*

**V I C T U S R A T I O N E.**

**A** Er sit calidus & siccus.  
Cibus. Conuenit cremor ptisanæ, ouum sorbile, caro caponum, gallinarum, pullorum; assæ autem potius sint quàm elixæ. Inter olera, maiorana, saluia, serpyllum, hyssopus. Inter fructus conueniunt amygdala, vuæ passæ.

Potus. A vini potu in principio mali abstineat; cuius loco bibat aquam mulsam, in qua nonnihil saluiæ aut cinnamomi decoctum sit.

Motus vitandus, quiesque imperanda. frictiones interim vertebrarum fiant atque colli.

Somnus sit mediocris.

Excrementa alui quotidie respondeant.

Animi perturbationes fugiendæ.

**V A C V A N T I B V S.**

Diaturbith cum rhabarbaro.

Hiera logodij, diaphænicum,

Agaricus trochiscatus,

Infusum agarici.

Pillulæ coccix, foetide, de sagapeno, de opopanace. quibus castorei nonnihil addemus.

Venæ sectio ipsius medianæ præscribatur, si à sanguine conuulsio fiat, satisque tunc liberè educat: partitis tamen id fiat vicibus, eò quòd vires ratione morbi hîc admodum resoluantur; feces alui tamen antè enemate leni emolliantur.

Præparantibus medicamentis vix vti conceditur, eò quòd peracutus sit morbus, non dans inducias, cùm vires breui temporis spatio omnino prosteruantur, eaque ratione medicamentis purgantibus clementioribus vtemur à principio, etiamsi materia non sit concocta. Morbus autem periculum si non minetur, tunc vti licebit præparantibus medicamentis in paralyfi di-  
ctis.

#### AVERTENTIBVS.

Clysteres ex decocto seminum fœniculi, anisi, radicum pæoniæ, saluiæ, betonicæ, maioranæ, hyssopi, pullegij, camomillæ, rorismarini, oleo communi addito.

Sternutamentum cientia.

Nasalia.

Masticatoria.

Gargarismata.

Frictiones cum pannis calentibus plurimum profunt, & potissimum si à flatibus fiat.

Cucurbitulæ cum scarificatione muscutorum principio aut medio, non fini apponentur, purgato corpore, morboque progresso & cùm materia iam fluere desierit.

Vniuersum corpus hîc optimè purgandum erit, antequam ad præsentium vsum deueniamus.

MITIGANTIBVS *dolorem qui plerumque intolerabilis est.*

Balneum ex decoctione seminum lini, fœnugræci, maluæ, althææ, camomillæ, saluiæ, betonicæ, stœchados, capitum veruecum aut vulpium, cui addetur olei vulpini bona quantitas; non diu tamen permittantur in balneo, eò quòd vires multum resoluat, & propterea redeuntibus doloribus balneum rursus intret; aut si vires non admittant balneum, irrigationes fiant partium laborantium ex materia iam dicta.

Sacculus sale torrefacto refertus, plurimum si nervis affectis

fectis apponatur, in doloris mitigatione valet.

Fotus fiat ceruicis partiumque vicinarum, cum lana in oleo emolliente tepido immersa, aut camomelino, ut natius partis calor conseruetur.

Vesica oleo tepente ex dimidio impleta, parti superponetur; natium enim calorem conseruat; simili enim calore natius noster calor gaudet.

Oleum liliorum, vulpinum, cyprinum.

Vnguentum ex oleo lumbricorum, ligni guaiaci, terebinthinæ, liliorum, camomillæ, medulla cruris vaccæ, axungia humana. Eo post exitum balnei vngetur tota ceruix & vertebræ dorsi. Si verò ab inanitione fiat post exitum balnei dulcis aquæ atque tepidæ, vngentur dictæ partes oleo rosaceo, violaceo, ne humiditas balneo acquisita exspiret.

Cataplasma ex lumbricis terrestribus, oleo vulpino.

Cum sæpè dolor intolerabilis in hoc malo concurrat, statim confugiendum erit ad præsentium medicamentorum usum, quæ emollire possunt vehementem neruorum contractionem. Nulla autem ratione admittemus ea quæ astringere possunt, siue linimenta siue fomenta fuerint, cum morbus ex iis incrementum potiusumat quàm leuamen.

**CORROBORANTIBVS**, reliquiæque digerentibus.

Theriaca, confectio anacardina.

Mithridatum semel in septimana.

Conserua magna nostræ descriptionis nobile est in omnibus spasmis speciebus medicamentum.

Diacorum, diamusculum dulce.

Acorus conditus. Castoreum cum mulla præstans est hic quoque medicamentum.

Opopanax.

Syrupus de calamintha.

Aqua cardui benedicti data in potu plurimum iuuat.

Vnguentum ex oleo vulpino, liliorum, bdellio adipe gallinæ, axungia humana, anseris, pinguedine ca-



tuli, oleo philosophorum, de euphorbio, de piperibus.

Catuli viui per medium secti, vel

Pulmones è viuis animalibus exempti, parti distentæ circumponantur quamdiu calebunt post vnctiones prædictas; maximo enim id fiet cum commodo.

Pelles felium, vulpium, veruecum, lupulorum, quibus partes conuulsæ vestiri debêt mox ab vnctione conuenienti; quæ postquam refrixerint, iterum in oleo calente immergende sunt vt recalescant, iterumque superponi possint.

Vnguentum ex oleo terebinthino, amygdalino, liliorum, de castoreo, guaiaci.

Succus malorum siluestrium, locis affectis accommodatus debite.

Suffitus sub papilione fiant ex decocto materiarum pro clysteri inferuentium, igniti que lapides coctiles iniciantur in cacabum sub papilione ita compositum, vt calor vaporque non expirent.

Balnea naturalia, sulfurea, salsa aut aluminosa, hisce si destituamur, arte fiant ex sulfure, sale, alumine, aut ex saluia, betonica, malua, hypericone, foliis lauri, absinthio, ruta, abrotano, maiorana, pulegio, meliloto, camomilla, radicibus liliorum, ireos, semine lini, fœnugræci. Plurimum sæpe profuere huiusmodi balnea post diligentem corporis purgationem, cum ab omnibus partibus æqualiter reliquias resoluant, bis terte autem in die illis vtetur.

Cucurbitulæ conuenient tandem cum scarificatione collo occipiti que applicatæ; à quibus abstinendum quamdiu cacochymia corporisque plenitudo affuerit; periculum enim est ne maior excrementorum copia in partem distentam illabatur.

**T H E O**

**THEORICA ET EMPIRICA MEDICAMENTA nobilia in SPASMO, sepius cum summa salute plurimorum egrotorum à Gualtero Bruel experta.**

**CURATIO SPASMI.**

℞ radicum liliorum alborum ℥ j. aristolochiæ rotundæ 3 iij. foliorum saluiæ, betonicæ ana m. j. β. florum cardui benedicti, camomillæ, mercurialis, centauri minoris ana m. j. furfuris m. ij. agarici albi & levis ℥ β. coquantur in aqua q. s. ad lb. j. β. colaturæ addantur sp. hieræ picræ simplicis 3 j. β. benedictæ laxatiuæ 3 j. mellis rosati ℥ j. olei liliorum alborum ℥ iij. salis parum; fiat *Clystere*. Omnium primò tamen ex decocto hordei, liliorum, foliorum maluæ, althææ, seminum lini, fœnugræci, oleo liliaceo communi; fiat *Enema emolliens*.

℞ syrupi de calamintha ℥ ij. oxymellis squillitici, syrupi de hyssopo, stœchadæ ana ℥ β. aquarum cardui benedicti ℥ vj. decoctionis cicerum, betonicæ, cardui benedicti lb. β. fiat *Tuleb*.

℞ florum anthos, stœchados, foliorum saluiæ, betonicæ, origani ana m. j. hyssopi m. j. β. fiat decoctio in aqua q. s. ad tertiæ partis consumptionem; colatura iterum coquatur cum mellis sufficienti quantitate ad syrupi consistentiam: detur ℥ j. β. cum decocti foliorum saluiæ, betonicæ, cardui benedicti 3 iij.

℞ cassiæ recenter extractæ 3 j. terëbinthinæ 3 β. nucis muscatæ 3 j. fiat *Bolus*.

℞ theriacæ veteris 3 j. castorei 3 j. β. olei amygdalarum dulcium, liliorum alborum ana 3 j. misceantur; fiat *Haustus*: detur tempore matutino.

℞ conferuæ acori 3 iij. granorum iuniperi 3 j. β. castorei, affæ fœtidæ ana 3 j. β. syrupi de calamintha, stœchados ana q. s. fiat *Electuarium*.

℞ conferuē anthos, betonicæ ana 3 vj. confectio-  
nis anacardinæ 3 ij. diamusci dulcis 3 iij. mithridati o-  
ptimi 3 j.β. castorei 3 ij. syrupi stœchados q. s. fiat *Mix-  
tura.*

℞ nucis muscatę, maceris ana 3 j. pyrethri, seminum  
staphisagriæ ana 3 j.β. mastiches 3 ij. acori conditi, zin-  
ziberis conditi ana 3 ij. β. succi betæ q. s. fiant *Pa-  
ssilli mansiles.*

℞ betonicæ 3 j. seminis nasturtij, erucæ ana 3 ij. se-  
minis raphani 3 j.β. coquantur ad tertias; decocti colati  
sumantur 3 v. oxymellis squillitici, olei liliorum albo-  
rum ana 3 j.β. misceantur; fiat *Potus* vomitum prouo-  
cans: detur à comestione.

℞ foliorum saluiæ, rutæ ana m. iij. seminum fœ-  
nugræci ℥ ss. olei communis & aquæ q. s. fiat *Fomen-  
tatio.*

℥ radicum maluę, liliorum, narcissi ana 3 vj. folio-  
rum saluię m. iij. absinthij, origani ana m. ij. florum ca-  
momillæ, meliloti, stœchados ana m. ij. ss. seminum li-  
ni, fœnugræci ana ℥ j. coquantur in aqua q. s. pro bal-  
neo in mali principio; demùm addatur olei liliorum  
aut communis ℥ j. Eo ter aut quater in die vtatur. Cum  
prædictis quoque magno cum commodo vulpes coqui  
poterit.

℞ olei nucis muscatæ 3 ij. terebinthinæ, liliorum,  
nardini ana 3 β. castorei, vermium terrestrium, hyperi-  
conis ana 3 ij. fiat *Vnguentum.*

℞ olei liliorum alborum, terebinthinæ ana 3 j. ss. i-  
rini 3 iij. axungię vulpis, humanæ, vnguenti Agrippę  
ana 3 ss. fiat *Linimentum*; eo molliter posterior pars ca-  
pitis, nucha nimirum, ac tota spina dorsi, parsque spaf-  
matica iniungenda erit atque fouenda, lanæque iis im-  
mersa erit contegenda.

℞ florum rorismarini, stœchados, serpilli, sampsu-  
chi, hyssopi ana m. j. maceris, cinnamomi, nucis mu-  
scatæ, caryophyllorum ana 3 ss. castorei 3 j. coquan-  
tur in oleo liliorum, irino; fiat *Vnguentum*, quo vte-  
tur

tur à balneo; hinc lana succida inuoluantur partes vñ-  
ctæ.

R̄ salis torrefacti adhuc calentis, furfuris frixi, florum  
camomillæ ana m. j. seminum lini 3 iiij. misceantur, fiat  
*Sacculus*.

R̄ artemisij, rutæ, camomillæ ana m. ss. nucis mu-  
scatæ, granorum iuniperi ana 3 ij. coquantur in oleo  
communi q. s. addendo farinam seminum lini, fœnigræ-  
ci ana 3 ij. hordei 3 j. galbani 3 ij. mellis, terebinthinæ  
ana q. s. fiat *Cataplasma*.

Ab inanitione si fiat: R̄ conseruæ buglossæ, vio-  
larum ana 3 j. manus Christi 3 ss. diamargariti frigi-  
di 3 v. nucleorum pini 3 ss. syrupi stœchados q. s.  
fiat *Electuarium* molle. Clystere fiat ex decocto capo-  
nis, foliorum violarum, maluæ, hordei, capitum a-  
gnorum, veruecum; addanturque olei violarum vñciæ  
tres.

R̄ foliorum maluæ m. iiij. capita quatuor aut quin-  
que veruecum, coquantur aliquandiu in sufficienti  
quantitate aquæ, addendo lactis recenter mulcti lb. viij.  
butyri non saliti lb. ij. fiat *Balneum*.

R̄ olei violacei 3 iiij. liliorum 3 ij. amygdalorum  
dulcium, mastichini, rosacei ana 3 j. Spinalis medulla  
eo inungatur vnguento atque locus affectus. Aut to-  
tum etiam corpus inungi eo poterit post exitum bal-  
nei, postquam autem vñctæ fuerint partes, pelle vulpi-  
na vestientur.

## APPENDIX

ad prædicta pro curatione SPASMI  
inferuiens.

**P** A repletionem frigidorum potissimum humorum dum fiat spas-  
mus, primò clysterio aluum soluemus, deinde clementioribus me-  
dicamentis humores præparabimus, modò malum inducias ad-  
mittat. Hos demum euacuabimus, hinc quæ auertere, nec non



euacuare è parte affecta humores possunt, præscribantur; ut sunt frictiones, ligaturæ cucurbitulæ, sternutatoria medicamenta, gargarismata, clysteres, apophlegmatismi. Postremò quæ reliquias dissoluere, partesque nervosas corroborare possunt, ex usu erunt; siue intrò sumantur, siue extrinsecus adhibeantur. Quæ omnia nunc anteaque dictis medicamentis felicissimo cum successu consequi poterimus, modò uniuersalia particularibus debita ratione accommodentur. Obseruandum autem est in hoc malo, ut unguenta, emplastra, cataplasmata, aliaque quæ extrinsecus admoventur, in principio sint moderatè calida, hincque paulatim calidiora admittentur, ut est castorium. Præterea unà quoque emolliant, digerant, resoluant oportet. A flatibus si fiat, cum pannis calentibus partes fricentur placidè. Si fiat à venenosorum animalium morsibus conuulsio, contundatur scabiosa, cui theriaca aliquid cum oui vitello permisceatur, partique affectæ superponatur. A punctura verò nerui si fiat, cum plerumque dolor validissimus concurrat, oleo rosato aliquid terebinthinæ permisceatur, neruòque læso accommodetur, dolorem enim mirè compefcit. Aut in oleo terebinthinæ aut lumbricorum terræ lumbrici incoquantur, ex quibus tam fons, quàm cataplasma fiet efficacissimum.



### Methodus pro Cognitione

## APOPLEXIÆ INSER- VIENS.

**A**POPLEXIA est totius corporis, sensus & motus priuatio cum principis animæ functionum noxa. Nomen habet inditum à maximo symptomate quod in hoc malo accidit. Morbus attonitus vocari potest, eò quòd vnà cum corpore etiam mens stupeat: periculosissimumque est malum, à quo perpauci liberantur; aut etiam si superuiuant, in paralyfim tamen frequenter transcunt,

transeunt, tuncque mens ipsa restituitur homini. Affectionis autem seu periculi magnitudinem metiemur commodissime ex anhelitus magnitudine. anhelitus enim inter omnes animales functiones maxime necessarius est; vita equidē aufertur, vbi ille omnino ablatus fuerit; in apoplexia enim & in omnibus aliis similibus affectibus licet sensus motusque auferatur, sola tamen respiratio seruetur, contingitque apoplecticos mori, eò quod respirare non possint. Periculosissimam itaque dicimus esse apoplexiam, maximamque in cerebro esse noxam, cum ægrum spirare non percipimus; omnino enim aliquando mortuo est apoplecticus similis, tuncque an adhuc viuatur signis à respiratione sumptis est perquirendum; quod fieri commodè poterit, si vasculum aliquod aqua impleatur, pectorique superponatur; ex motu equidem aquæ certum vitæ erit indicium, cum hominem adhuc respirare nobis significare possit; respiratio enim à vita separari non potest, quemadmodum nec vita à respiratione. Idem lana molliter carpta, aut speculo terfo, aut candela cerea ardente addisci poterit, si ori admoueantur; si enim viuatur, continget flammam non nihil moueri, speculūque caligine obduci. Dum autem spiritus omnino intermittitur, aut cum eos spirare percipimus magna interim violentia, illos magno morbo & graui, fortique apoplexia laborare dicimus. Qui autem spiritum ducunt, prioribus minus violenti, etiam si inæqualiter inordinateque id fiat, non ita fortiter tamen laborant, mitiorique apoplexia affliguntur; atque in hac aliquando sensus est, subinde etiam motus, sed multū stupidus, ut paralytis alterius partis plerūque etiam relinquatur. Affine multum hoc malum est cum præfocatione forti vteri, vti ex eius tractu facile constat; differt tamen ab eo malo, eò quod in apoplexia semper ferè spiritus difficulter trahitur, in vteri verò strangulatu respiratio satis facilis liberaque sit.

**PARS AFFECTA.** Cerebrum quod est neruorum principium, in hoc malo oblaesum esse constat, eò

F

quòd præter sensibiles & motrices animæ functiones, ipsæ etiam principes animæ facultates lædantur, quarum fons ac commune principium ipsum est cerebrum. Iphis ergo omnibus oblæsis facultatibus, necessario & cerebrum oblæsum erit. Potissimum autem in ipsius cerebri ventriculis præcipuis impedimentum erit, potius quàm cerebri corpore, eò quòd subitanea eius est generatio. Est autem apoplexia symptoma pertinens ad actionem læsam omnium functionum, cum sensus, motus, principesque functiones non tantum minuantur, sed auferantur. Sequitur autem morbum in via, constipationem nimirum aut astrictionem aut obstructionem ventriculorum cerebri.


**SIGNA.** In apoplexia non fortissima subitus fit in terram lapsus cum clamore, tantæque mox oritur spiritus difficultas, ut sensum quasi effugiat, iaccatque ut suffocatus æger, pectore ita se habente, ac si vinculo ligatum attolli prohiberetur. Subito quoque animales actiones è medio tolluntur, fitque motus ac sensus privatio, ita ut etiam rectrix anima quasi extincta videatur: dormientium instar eorum oculi occluduntur, solæque respiratione à mortuis dissident; quæ mox etiam admodum fit difficilis, uti diximus. Capitis dolor subito adueniens, vertigo, extremarum partium totiusque corporis frigus apoplexiam sæpe præcedunt, validissima tamen apoplexia subito inuadit nullis præcurrentibus signis prædictis.

**CAUSÆ.** Frenquetissimè à pituita lenta, crassa, frigidaque excitatur apoplexia; ab ea enim contingit cerebri ventriculos arteriasque retis admirabilis, per quas spiritus ex corde in cerebri ventriculos influunt, impleri affatim, unde spiritus ipsi, facultatesque animales etiam impediuntur ne in sensum motuumque instrumenta diffundantur, unde contingit sensu motuque hominem privari. Ob similem causam quoque malum istud à cruditatibus, crebrisque ebrietatibus, à vini generosioris plurimo usu, ab aëre ambiente admodum frigido,

gido, à victus ratione quoque frigida excitatur. Rursus casus, capitisque ictus, humorum fluxus promouet ad ipsum cerebrum; qui si principales ventriculos cerebri impleant, apoplexiam excitant; contingit aliquando copiam prædictorum humorum esse minorem quàm vt fortem apoplexiam excitare possit. Concidunt quoque nonnulli apoplecticorum morte ex obstructione leui, quæ fit subinde à vaporibus crassis, aut ab humoribus paucis impactis in cerebri ventriculis.

**PROGNOSTICA.** Apoplexiæ exponuntur crapulæ addicti maximèque senes, item qui frequenter graui sopore tentatur, corporisque pigritia magna corripuntur, ex quibus frequenter tenebræ oculis offunduntur, qui breuē angustamque habent ceruicē. Morbus attolitus si magnus fuerit, vix sanatur, vnde remedia non sunt adhibenda, cum suapte natura exitialis sit. debilis autem difficulter sanatur. Quamuis autem perpauci ab hoc malo liberantur, ij tamen qui periculum mortis effugiunt, in diuturnum plerumque morbum incidunt, paralysem nimirum aliquarum partium, subinde etiam totius corporis, aut memoriæ iacturam faciunt: senes autem potissimum si temperamento pituitosiores, modoque simili victus ratione vsi fuerint, huic morbo maxime obnoxij sunt, paucissimique euadunt, propter morbi magnitudinem ætatisque grauamen. Dum hic me perfrigidi venti spirant, densæque nebulæ cælum obsident, hic morbus potissimum insultare solet. Fortiter sternutamentum prouocantibus si æger non sternutet, neque impressionem sentiat, mortale.





*Methodus pro curatione*

## APOPLEXIÆ DEBILIS INSERVIENS.

*Perficitur autem subsequenter remedium  
generibus.*

### VICTVS RATIONE.

**A**ER sit calidus.

Cibus, vbi malum remiserit nonnihil, conuenit paucus, sit calidus, concoctu facilis, & qui facile quoque distribuatur; vt sunt pulli, gallinæ, capi. Poterunt alimenta condiri cum saluia, thymo, hyssopo, roremarimo, maiorana.

Potus, aqua mulsa. A vino abstineat.

Exercitij loco frictiones validæ, extremarumque partium ligaturæ fiant, cucurbitulæque humeris affigantur, commodè quoque pensili lecto gestabuntur, aut curriculo vehentur: balneum quoque post duas aut tres septimanas conuenit.

### VACVANTIBVS.

Electuarium Indum maius, diaphœnicum.

Trochisci de agarico, alhandal.

Pillulæ fœtidæ, coccinæ, de fumo terræ, Arabicæ, de lapide lazuli, de euphorbio.

Hiera diacolocynthidos, picra, logodij, pacchij.

Vomitoriis medicamentis in morbi progressu vtetur commodius quàm in principio.

Clysteria.

Venæ sectio fiat in corpore plethorico, cum melius nonnihil spirabit, & postquam clysteri alius soluta fuerit, ipsius cephalicæ in utroq; brachio, non vnica autē vice, sed sensim educatur sanguis, repetendo venæ sec-

na sectionem si prima vice non satis euacuaueris.

Si paululum ad se redeat æger, & loqui incipiat, viresque recolligat, istis purgantibus vtemur medicamentis. A mitioribus autem clysteribus primum auspicabimur. Præparantibus autem medicamentis hic non vtemur, eò quòd morbus non dat inducias; versus declinationem tamen præscribi poterunt.

## A V E R T E N T I B V S.

Clystere ex betonica, saluia, roremarino, stœchade, hyssopo, foliis lauri, maioranæ, ruta, centaurea minori, pulegio, seminibus fœniculi, anisi, colocynthide, hiera diacolocynthidos, hiera picra, logodij, polypodio, sena, sale, oleo rutaceo, laurino, camomelino.

Venæ sectio.

Suppositorio alius subducatur interea temporis quo clystere paratur, quo etiam vtiatur si clystere non reiciatur, ex hiera Galeni, logodij, agarico, elleboro.

Ligaturæ dolorificæ arctissimæque fiant partium extremarum, vt facultas consopita excitetur, vtque horum dolorum vehementia natura irritata expellantur ea quæ parant obstructionem in cerebro.

Frictiones duræ multæque cum linteolo asperiori, nec non corporis agitationes concussionésque fiant validæ circa collum, vbi arteriarum venarumque congeries est. Vniuersû etiã agitabitur corpus, cum aliquid subinde cõcidât apoplecticorû more, propter obstructiones leues; tuncque sperandû est, quòd hæ obstructiones potissimû leues, ex corporis ipsius agitationibus discutiêtur, naturalisq. vis excitabitur. sanguis quoque atque humores fundêtur, cõgelarique prohibebûntur.

Pilorum vellicatio fiet tum barbæ tum pubis.

Cucurbitulæ quoque lumbis, scapulis, natibus, venis iugularibus, inferioribusque partibus, hypochondriis exceptis (ne musculis abdominis impedimêto simus, qui respirationi inseruiunt) applicentur, aliquando leues, subinde etiam cû scarificatione, modò venæ sectione vires non patiantur, aut venæ ita lateant, vt admini-



strari non possit. Maiori autem cum commodo iugularibus affigetur venis, eo quod maioribus viribus auertantibi hæretes quã aliis locis dictis, si apponatur. Sanguisugæ dictis quoque locis, necnon hæmorrhoidibus apponentur etiam cum scarificatione.

**Errhina, gargarismata.**

**Sternutamentum** scientia ex castoreo, pipere, elleboro, euphorbio, quod potentissimè sternutamentum mouet, perque nares cerebrum purgat: non admittendum tamen antequam bene purgatum erit corpus.

**Apophlegmatismus** ex pipere, pyrethro, castoreo per palatum materiam obstruentem viscosam educit. Palatum autem, reliquasque oris partes internas digitis fricabimus pul. prædicto.

**Sinapismus** ex sinapio, ficubus decoctis in aqua ad formam emplastri.

**EXCITANTIBVS** *cerebri vim sopitam.*

**Odoramentum** ex galbano, castoreo, opopanace.

**Vnguentum** ex dictorum materia.

**Sartago candens** capiti à longè applicetur, prius autem capilli abradantur. calor enim sic capiti conciliatur, humores crassi imminuuntur, & in vapores vertuntur.

**Sinapi comminutum** salique permixtum & in aqua vitæ maceratum, ori iniiciatur, naribusque illinatur.

**CORROBORANTIBVS**, *intemperiemque cerebri emendantibus.*

**Aurea Alexandrina, anacardina confectio, theriaca, mithridatum, diamuscum dulce.**

**Diacorum, diambra, acorus conditus.**

**Conserua betonica, maioranæ, acori, saluiæ.**

**Aqua vitæ**, in qua prædictorum nonnulla macerari poterunt, aut nux muscata, castoreum, radix acori, salvia, mastix aut propinentur cum aqua vitæ.

**Castoreum** magnarum est virium in hoc malo.

**Irrigatio lotioque** fiat capitis rasi ex oleo aut aqua, in qua decocta sint flores stœchados, folia origani, lauri, rorismarini, saluiæ, camomille, melilori, pulegij, saturegiæ, nux muscata, ruta

**Empla-**

Emplastrum vesicatorium rubificans ex oleo euphorbij, castorei, sinapio, sagapeno, euphorbio, castoreo.

Vnguentum cum oleo castorei, aqua vitæ.

Vnguentum ex oleo liliorum, irino, nardino, rutæ, spice, nuce muscata, euphorbio, castoreo, pipere, sinapio, pyrethro, aceto, cera, sitque rasum caput.

Balneum tandem conuenit post tres septimanas.

**THEORICA ET EMPIRICA MEDICAMENTA nobilia in APOPLEXIA cum summa salute plurimorum egrotorum à Gualtero Bruel experta.**

CURATIO APOPLEXIÆ.

℞ radicum angelicæ 3 vj. saluiæ, rutæ, mercurialis, betonicæ, hyssopi, ana m. j. florum stœchados, centauri minoris ana p. j. seminum anisi, vrticæ, cumini, fœniculi, lauri ana 3 iiij. agarici albi & leuis 3 β. colocynthidos 3 ij β. fiat decoctio in sufficienti quantitate aquæ ad lb j. β. colaturæ addatur hiera logodij, diacolocynthid. ana 3 j. β. benediæ laxatiue, diaturbith cum rhabarb. ana 3 iiij. opopanacis 3 ij. mellis rosati 3 ij. olei de castoreo, laurini ana 3 j. ss. salis 3 ij ss. fiat *Enema*; quo paulatim & per interualla vacuabimus humores è toto corpore, donec pharmacum solutium per os sumere poterit. Hoc autem clysterio vti poterimus, si summum impendere periculum videatur; alioqui præstat prima vice omittere colocynthidem, necnon hieram diacolocynthid. Tertia verò vice assignatum iniicitur enema: postquam equidem prima corporis regio inanita fuerit ex parte, tunc attrahere licebit à partibus superioribus validioribus medicamentis. bis autem aut ter iniici licebit lene clystere, vt fiat euacuatio auersioque.

F iiij



℞ nucis muscatę 3 j. ellebori albi, pyrethri, castorei ana 3 j. nigellę, piperis albi ana 3 j. fiat *Pulvis sternutatorius*, infumetur in nares pauxillum eius calamo.

℞ oxymellis squillitici, decoctionis raphani ana 3 iij. olei liliorum 3 ij. fiat *Vomitorium medicamentum*. aut sic:

℞ radicum asari 3 j. s. radicum raphani 3 j. coquantur in aqua communi q. s. ad medietatis consumptionem; huius colaturę 3 vj. addantur oxymellis squillitici 3 ij. s. olei liliorum alborum 3 ij. fiat *Vomitorium medicamentum*.

℞ mithridati 3 ij. theriacę antiquę, confectionis anacardinę ana 3 j. s. castorei 3 s. aquę vitę in qua infusa fuit nux muscata, saluia 3 j. oxymellis squillitici 3 ij. aut decocti nucis muscatę, acori 3 ij. fiat *Haustus*.

℞ hierę logodij, hierę diacolocynthidos ana 3 j. castorei 3 s. theriacę veteris 3 ij. decocti saluię, roris marini, calendulę, betonicę, centaurei minoris q. s. fiat *Potus*: detur postquam clysterio leuatus erit; syphone autem poterit dimitti iugulam. Si clystere non reddatur tempore expectato;

℞ hierę logodij 3 j. colocynthidos 3 s. salis gemmę, castorei ana 3 j. mellis cocti & concreti q. s. fiat *Suppositorium longum*; filoque alligatum immittatur, aut,

℞ ellebori nigri, hierę diacolocynthidos ana 3 j. s. salis communis 3 s. mellis cocti & concreti q. s. fiat *Suppositorium*.

℞ mithridati, theriachę magnę ana 3 ij. hierę diacolocynthidos 3 ij. castorei 3 j. vini generosi 3 iij. fiat *Potus*.

℞ pillularum de agarico Mesuę, de euphorbio ana 3 j. cochiarum 3 j. s. castorei 3 j. diagrid. gr. iij. decocti saluię, nucis muscatę, betonicę, angelicę, 3 iij. aquę vitę 3 j. fiat *Haustus*.

℞ pillularum foetidarum, cochiarum nurearum ana 3 j.

℞ j. diagrid. gr. v. castorei ℞ j. fiant *Pillulae*, quæ dum deglutire potest imperabuntur, alioqui prædicto modo solvantur.

℞ hyssopi, saluæ, ana m. j. ss. florum rorismarini m. iij. nucis muscatæ 3 j. ss. in aquæ vitæ lb ss. maceretur viginti quatuor horis aqua calente, hinc coletur abiectisque prioribus noua imponantur, dictoque modo aqua calente macerentur, idque aliquoties repetatur, fiatque *Potus* præstans atque generosus.

℞ conseruæ betonice, maioranæ, acori ana 3 j. confectionis anacardinæ 3 vj. diamusci dulcis, diambre ana 3 ij. ss. mithridati electissimi, theriacæ veteris ana 3 iij. ss. nucis muscatæ, zinziberis ana 3 j. syrupi stœchados q. s. fiat *Conditum* in forma opiati; post horam si bibat haustum decocti hyssopi, multum proderit.

℞ foliorum lauri, hyssopi, saluæ, betonice, rorismarini ana m. ij. florum camomillæ, meliloti, stœchados, betonice, calaminthæ, maioranæ, ana m. j. coquantur in æquali quantitate aquæ & vini ad tertiæ partis consumptionem; fiat *Embrocha*; qua caput irroretur atque madefiat mediante spongia, ab alto decidente liquore.

℞ radicum liliorum alborum 3 ij. florum camomillæ, meliloti ana m. j. ss. foliorum maioranæ, pulegij, melissæ, rutæ, origani ana m. j. semin. anisi 3 j. coquantur in aqua q. s. ad tertiæ partis consumptionem; fiat *Fomentatio* pro capite. Prædictis si addatur olei rutacei 3 j. olei liliorum alborum q. s. poterit fieri *Cataplasma* quod capiti accommodabitur.

℞ olei nardini, petrolei ana 3 j. castorei 3 ij. euphorbij 3 ss. fiat *Vnguentum*, quo caput abrasum vngatur.

℞ olei lateritii, de castoreo, laurini, iuniperi ana 3 ss. in his dissoluatur euphorbij ℞ ss. ceræ & aceti parum, fiat *Vnguentum* molle pro capite spinalique medulla, eiusque potissimum principio. Interiora

rò narium vngantur oleo nardino rutaceoque ; in quibus aliquid castorei nucisque muscatæ dissolutum sit.

℞ olei nucis muscatę , nardini ana ℥ ij. rutacei ℥ j. de castoreo ℥ vj. fiat *Linimentum* molle cum pauca cera, quo tota spina dorsi inungatur, incipiendo ab eius principio ; hinc inspergatur pulvis ex radice pyrethri, seminibus sinapi, staphisagrię, euphorbij, castorei. os aperiatur, & palatum linguęque confricetur cum mithridato ; confectione anacardina, theriaca veteri, aut confectionis anacardinę ℥ j. ꝑ. in ore ponatur ægroti.

℞ olei liliorum alborum ℥ ij. castorei ℥ ꝑ. euphorbij ℥ ij. olei nardini ℥ iij. fiat *Vnguentum* pro capite spinęque dorsi ; quo utemur si prioribus lenioribus parum profecerimus.

℞ olei mastichini, nucis muscatę, absinthii ana ℥ vj. menthę ℥ ꝑ. macis, nucis muscatę, cinnamomi ana ℥ j. fiat *Vnguentum* pro stomacho. Cauterium potentiale commissurę coronali applicetur, vesiculę acu perforentur, granumque ciceris sic paulatim imprimatur, vt vestigium eius relinquatur æquale ; apertumque seruetur per duos aut tres menses. aut eius loco actuale fiat cauterium candente ferro, quod apertum seruabitur eodem modo, crusta vbi ablata erit. Licebit etiam cauterij loco sartaginem, aut cream patellam candente foco ignire ita vt rubescat, sicque capiti accommodabitur vt cutis incalescat, capillique quasi exurantur, idque repetendum donec excitetur.

℞ castorei ℥ vj. euphorbij ℥ ꝑ. seminis sinapi ℥ ij. vrticę ℥ ꝑ. ficum pinguium molliter coctarum, caricarum ana xij. numero ; fiat *Emplastrum*, quod capiti raso imponetur, vt materia foras euocetur.


APPEN-



A P P E N D I X

ad prædicta pro curatione APOPLEXIAE debilis, & in qua respiratio non ita intercipitur, inseruiens.

*Fortis enim incurabilis est, cum sit morbus acutus, celerimeque hominem occidat. validis autem utcumque debemus hic uti medicamentis, omniumque maxime statim à principio fortes conveniunt clysteres. Huiusmodi autem permiscenda sunt medicamenta quibus totum corpus incallescere possit, obstructionesque tolli. Omnium autem primò agitandus atque concutiendus est æger, ligneoque bacillo os apertum servabitur. Extremarum quoque partium vinculis, frictionibus dolorificis; cucurbitulis, suppositoriis, clysteribus, venæque sectione humores accipite auertemus. Demum medicamentis sternutamentum cientibus, necnon apophlegmatismis, gargarismatibus caput vacuabimus, & quæ uniuersum corpus purgare possunt eodem quasi tempore offeremus. Tandem quæ caput uniuersumque corpus corroborare, necnon reliquias digerere possunt, imperabimus. Si vena iugularis aperiatur, emplastrum fiat è bolo Armena, aloë, pilis leporinis, albumine oui, superponaturque foramini ne sanguis immodicè profundatur.*



*Methodus pro cognitione*

LETHARGIÆ SEU VETERNI INSERVIENS.

**L**ETHARGIA seu Vaternus, est cum inexpugnabilis dormiendi necessitas vrget, seu morbus est obliuiosus ab apostemate proueniens cerebri frigido. Magnam affinitatem cum isto malo Caros habet; à quo tamen differt in hoc, quòd febris non laboret Caro correptus. Maior quoque & profundior dormiendi necessitas



urget in Caro; stimulati enim vix excitantur, interrogatique non respondent. Aphrenitide differt in eo, quod illi insomnes permanent, cuius contrarium in lethargia accidit. Ab apoplexia Caros seu Veternus grauis vix discernitur, cum hic eodem modo non solum sensus & motus, sed etiam mentis functio concidat. Differt tamen, quod ille qui Caro laborat, liberè facilèque respiraret, cuius contrarium accidit in apoplexia: sensim enim respiratio hic opprimitur, ita ut tandem stertat æger.

**PARS AFFECTA**, est ipsius cerebri substantia, & maximè quidem posterior eius pars, non autem eius ventriculi, id quod ex functionibus cerebri oblæsis constat: in hoc enim malo experimur potissimum memoriam atque rationem lædi, quæ præcipua ipsius cerebri munia sunt. Estque symptoma pertinens ad actionem læsam facultatis memoratiuæ potissimum, necnon ratiocinatricis, imaginatricis, sensusque communis.

**SIGNA.** Inexpugnabilis pænè dormiendi necessitas urget, cumque obliuione, febris concurrit lenta continuaque; plerumque tamen vix persentitur febris, dum leuiter scilicet phlegma putrescit. Tardè respondent etiam si urgeantur. Oculis plerumque iacēt clausis, subinde tamen aperiunt si altius voce compellantur, quibus oclusis, mox ad pristinum somnum redeunt, aliquando ita pertinaciter, ut æger capillis fortiter tractus non doleat, ita stupore oppressus est; id quod potissimum fit cum in substantia cerebri ipsum apostema fuerit factum. Quo casu oculi quoque magis eminent. Maior quoque fit difficultas motus, necnon linguæ adest albedo. Obliuio aliquando hic concurrit tanta, ut omnium veluti amentes obliuiscantur; matulam enim expetentes meiendi causa, mingere tamen nonnulli obliuiscuntur, vnde memoriam rationemque abolitam esse, dicere licebit, imaginationemque deficere, oscitant frequenter, cumque lenta febre concurrit pulsus lentus, vndosus, languidus atque tardus. Excrementa alui liquidiora sunt nonnullis, aliis verò compressa est aluus; sic quo-

quoque & urinæ fluor, fiuntque iumentorum urinis similes, magnamque spirituum perturbationem in venis significant. Sudor aliquibus vnâ cum tremore occurrit. Spiratio magna, rara, & imbecilla est. Magna est vniuersi corporis segnities grauitasque, potissimum tamen ipsius capitis. Etiam si in latus ab astantibus conuertatur æger, in dorsum tamen vltro reuoluitur.

**CAUSA.** Ex intemperie cerebri frigida humidâque oritur. Hanc autem intemperiem cerebri frigidam efficit pituitosi humoris putrefacti, ita vt febrem accersere possit, magna copia in cerebri corpore redundans, frigidumque tumorem efficiens: vnde mirum non est, etiam si difficultas mouendi atque insensibilitas quædam hominem opprimat, cum ex calore motus, ex frigore vero segnities proueniat.

**PROGNOSTICA.** Hic affectus celerrimè iugulat, nisi celeriter occurratur; in septem enim diebus occidit; hos verò si effugerint, sæpe sani euadunt. Vti autem lethargia vera vt plurimum est mortalis, sic quoque maximi periculi in hoc malo, nuncius tremor est, itemque frigidus circum caput sudor. Conualescentibus quoque ex hoc malo, suppuratio frequenter in pectore nascitur. Optimum autem est abscessum in lethargo post aures fieri; malum equidem tunc soluitur. Ea quæ aluo excluduntur, magna ex parte liquida sunt, periculûmque minantur si multa sint atque liquida quæ deiciuntur.



*Methodus pro curatione*

LETHARGIÆ INSER-  
VIENS.

*Perficitur autem subsequenter remedium ge-  
neribus.*

VICTVS RATIONE.

**A** Er sit lucidus calidus atque siccus; rectificeturque cum lignis iuniperi, roremarino, foliis lauri.

Cibus sit extenuans. Caro caponum, gallinarum, perdium, pullorum, auicularum montanarum, phasianorum; condianturque cinnamomo, caryophyllis. Iuscula quoque conueniunt carniū, in quibus nonnihil cinnamomi aut piperis detorquetur.

Potus sit vinum tenue, ptisana, fiatque cum thymo, hyssopo, aqua mellis seu hydromel. à potu aquę sibi caueat.

Somnus impediatur, quoad fieri potest, punctione, pilorumque euulsione, aut fumo è sulfure, castoreo, galbano, sagapeno; atque ita naribus subiiciatur, ut attrahere per nares fumum cogatur. acerrimo quoque aceto nares irritabimus in eundem finem.

Excrementa alui subducantur clysteri aut glande.

Exercitij loco, frictiones ligaturęque partium extremarum fiant, pedum nimirum manuumque.

PRÆPARANTIBVS.

Decoctū saluie, hyssopi, thymi, maioranę, betonice, pullegij, fœniculi, apii, adiathi, melissę, radicū rusci, graminis; colaturę mel rosaceum aut oxymel addatur.

Syrupus stœchados, betonice, boraginis,

Mellicratum, hydromel.

Oxymel simplex, compositum.

Aqua maioranę, rorismarini, betonice, saluie, stœchados.

Præ-



Præparantibus hisce medicamentis primò vtemur, modò diuturnum malum esse cœperit, alioqui purgantibus potiùs malum oppugnabimus medicamentis. Per fistulam autem conuenientem medicamenta vtumat laborabimus si negligat sumere.

## VACVANTIBVS.

Clystere è malua, camomilla, salua, calamintha, maiorana, origano, centaurea minori, roremarino, betonica, semine fœniculi, colocynthide, agarico, hiera simplici, hiera logod. Archigenis, electuario Indo, diaphœnicone, oleo camomelino, rutaceo, melle rosato.

Hiera diacolocynthidos, logedij, picra.

Diaphœnicum.

Electuarium Indum maius.

Agaricus trochiscatus, agaricus.

Suppositorium ex hiera picra, benedicta laxatiua, colocynthide, melle, & sale communi.

Vomitum cum decocto raphani, atriplicis, anethi, oxymelle squillitico.

Venæ sectio fiat ipsius cephalicæ statim ab initio, eò quòd magna ex parte concurrat repletio corporis.

Deinde frontis quoque vena secabitur, feces tamen prius clysteri leni educuntur.

Repetendus est horum medicamentorum ordo. potiusque hîc conueniunt clysteres acres, suppositoriaque fortia quàm medicamenta per os sumpta.

## AVERTENTIBVS, ægrumque excitantibus.

Venæ sectio. Clystere. Suppositorium.

Frictio palati arque linguæ fiet cum melle, aceto; quibus pyrethrum, sinapi, theriaca, mithridatum, aurea Alexandrina permiscebitur. Extremæ corporis partes fricabuntur absque intermissione donec rubescant, doleantque.

Vellicationes & punctiones partium extremarum fient, capitisque capilli validius trahendi subinde, vt excitetur, & vt materia reuellatur.



**Cucurbitulæ** occipitio capitis, necnon primæ secundæque vertebræ apponendæ; Item clunibus cruribusque: nonnullæ earum cum scarificatione. aliæ absque ea, plurima tamen cum flamma.

**Errhina** ex aceto fiant, in quo decoquantur origanum, thymus, pulegium. Eius vapor naribus exceptus, crassitudinem humorum difsecat aliquualiter.

**Suffumigium** è galbano, & cornu ceruino, hoc malo correptum excitat.

**Gargarismus**, apophlegmatismi.

**Epithema** fiat è ruta in vino cocta.

**Sternutamentum** cientia ex elleboro albo, pipere, castoreo.

**Irrigatio & fomentatio** capitis prius rasi, & potissimum sincipitis, ex decocto rutæ, origani, satireiæ, serpylli, hyssopi, castoreo in oleo communi dissoluto.

**Sinapismus** sinapi, caricis, columbarum stercore, cantharidibus, quibus addi poterit piper, euphorbium, si validius expetatur. Postquam autem mediocriter vires exercuerit hoc medicamentum, tunc loca ipsa calido oleo sunt fouenda; dolorque sedandus erit decocto rosarum, maluæ, camomillæ, si res ita dicet.

**Crura** cum vrtica fricentur.

#### REPELLENTIBVS.

**Vnguentum** pro capite ex oxyrhodino, minuta aceti quantitate addita.

**Vnguentum** ex oleo rosaceo, camomelino, paruaque quantitate aceti.

Primo die medicamento hoc ex oxyrhodino utemur, versus augmentum verò eo vnguento quod sequitur. Aut eius loco priori incoquantur thymus, calamintha, pulegium, radices liliorum alborum, necnon aliquid castorei, coronali autem commissuræ admo-  
uenda sunt hæc medicamenta.

#### CORROBORANTIBVS, *intemperiemque relictam emendantibus.*

**Therica**, mithridatum cum aqua vitæ: **Diamuscum**  
dulce, **diambra** **Conser-**

Conserua saluiae, betonicae, maioranae.

Castoreum cum oxymelite detur, magnarum enim est virium in cura huius mali.

Odoramentum fiat e succo laserpitij, pulegio, abrotano, thymo, origano, galbano, fagelino, castoreo, cornu ceruino, aceto, ruta.

Balneum ex aqua dulci praestans est.

Vnguentum fiat ex castoreo pro capite, aut ex oleo laurino, itino, philosphorum, de piperibus, costino, nardino, aceto squillitico.

Embroca e betonica, saluia, serpyllo, maiorana.

Sacculus capiti raso imponendus e milio, saleque tosto.

Hic opus est fortibus resoluentibus praeter morem aliorum apothematum, eo quod resolutio apothematis aliter vix fieri poterit, propterea quod in cranei parte interna obhaereat.



**THEORICA ET EMPIRICA MEDICAMENTA nobilia in LETARGIA, saepius cum summa salute plurimorum aegrotorum a Gualtero Brues experta.**

**CURATIO LETHARGIAE.**

℞ radicis liliij albi ʒ j. foliorum rutae, saluiae, maioranae, maluae ana m. j. florum rorismarini, camomillae, melilori, centaurei minoris, betonicae ana m. sem. seminum lini, anisi ana ʒ sem. agarici albi & leuis ʒ iij. polypodij quercini ʒ j. colocynthid. ʒ j. se. coquantur in aqua q. s. ad lb j. sem. colaturae addatur hierae logod. ʒ se. electuarij Indi ʒ v. mellis rosacei ʒ j. sem. olei rutacei ʒ iij. castorei ʒ j. se. fiat *Clystere*. Aut eius loco suppositorium fiat ex mellis ʒ j. se. hierae logod. ʒ se. salis communis ʒ j.

℞ syrupi stoechados, betonicae ana ʒ j. boraginis, oxymellis simplicis ana ʒ se. aquarum rorismarini, hyssopi, betonicae, maioranae, ana ʒ iij. fiat *Iuleb*: dentur ʒ iij. hora matutina.

℞ radicum fœniculi, petroselini, graminis, angelicæ ana ʒ vj. hyssopi, thymi, pulegij, melissæ, ana m. j. saluix m. se. florum betonicæ, rorismarini ana m. j. boraginis, buglossæ, ana m. se. seminum anisi, fœniculi, apij ana ʒ iiij. glycyrrhizæ rasæ ʒ se. coquantur in aqua q. s. ad lb j. se. colaturæ addatur mellis rosacei, oxymellis simplicis ana ʒ j se. misceantur, fiat *Potio*: dentur ʒ iiij. in aurora.

℞ elect. Indi maioris ʒ ij. diacatholiconis ʒ iiij. diaphœniconis, diaturbith cum rhabarbaro ana ʒ j. syr. stœchados ʒ j. aquarum betonicæ, saluix, ana ʒ j. sem. misceantur, fiat *Haustus*.

℞ pillularum hieræ picræ Galeni ʒ ij. hieræ diacolocynthidos, pillularum cochiarum, castorei ana ʒ se. sem. cum syrapi stœchados q. s. fiant *Pillulæ* octo. aut si deuorare illas non possit, dissoluantur ʒ iiij. aqua betonicæ, mellis rosati ʒ j. fiat *Haustus*; ita enim stupet hîc sentiendi facultas, vt amaris parum admodû molestetur.

℞ hieræ logod. ʒ j. sem. hieræ diacolocynthidos ʒ ij. decocti serpylli, pulegij, betonicæ, calendulæ ʒ iiij. syrapi stœchados ʒ j. fiat *Haustus*.

℞ decocti raphani ʒ v. oxymellis simplicis, squillitici ana ʒ se. olei communis ʒ ij. misceantur, fiat *Vomitorium* medicamentum, quod tepidum bibet, aliquamdiu autem post si vltro non vomat, penna in oxymelite squillitico intincta, cui nonnihil permistum sit sinapij, fauces atque palatum irritet.

℞ confectiōnis anacardinæ, mithridati, theriacæ ana ʒ se. nucis muscatæ, castorei ana ʒ se. aquæ vitæ, calendulæ ana ʒ j. se. fiat *Potio*.

℞ conferuæ anthos ʒ j. aromatici rosati Gabrielis ʒ j. sem. theriacæ veteris ʒ ij. mithridati ʒ j. syrapi stœchados q. s. fiat *Conditum* in forma opiati.

℞ radicum angelicæ ʒ se. satureiæ m. iiij. thymi, pulegij ana m. j. coquantur in vino albo q. s. fiat *Potus*; dentur in aurora ʒ iiij. per aliquot dies.

℞ origani, betonicæ, satureiæ, serpylli, pulegij, rutæ, ana m. j. florum stœchados m. j. se. coquantur in æquali  
portione

portione vini & olei camomelini, ad consumptionem vini, fiat *Fomentum* pro capite.

R̄ nucis muscatæ, piperis ana ʒ ij. ellebori albi, euphorbij ana gr. vj. castorei, pyrethri, nigellæ ana ʒ se. fiat *Sternutatorium* medicamentum, cuius portiunculam per nares attrahât, postquam commodè purgatus erit; non autem in principio; periculum enim est ne noxia materia nimirum exagitetur.

R̄ hyssopi ʒ j nucis muscatæ ʒ se. pyrethri, sinapi ana ʒ j. sem. staphisagriæ ʒ iiij. linteolo tenui insuantur contusa, fiatque apophlegmatismus.

R̄ confectionis anacardinæ, mithridati ana ʒ j. aureæ Alexandrinæ ʒ ij. sinapi, rodicum pyrethri ana ʒ j. hieræ picræ Galeni ʒ j. mellis parum; fiat *Mixtura*, quâ palati, linguæque fiet illinitio atque frictio. Id quod cum solo quoque sinapi contuso, melli acetoque permixto fieri potest.

R̄ gummi ammoniaci, assæ foetidæ ana ʒ j. cornu cervi ʒ ij. galbani, castorei ana ʒ se. thuris ʒ j. se. fiat *Suffumigium*.

R̄ olei de lateribus ʒ j. de euphorbio ʒ iiij. itini, laurini ana ʒ vj. castorei ʒ j. sem. euphorbij gr. x. nucis muscatæ ʒ j. fiat *Unguentum*.

R̄ olei lateriti, laurini, liliorum ana ʒ iiij. nucis muscatæ ʒ j. se. castorei ʒ ij. theriacæ ʒ j. sem. ceræ q. s. fiat *Ceratum*.

R̄ seminum sinapi ʒ se. cantharid. alis, capitibusque ablatis numero vj. fermenti, stercoreis columbarum ana ʒ j. euphorbij ʒ se. cepæ crudæ ʒ se. emplastri apostolorum ʒ iiij. aceti parum, fiat *Emplastrum* rubificatorium, quod posteriori capitis parti accommodabitur abrasis capillis.

R̄ olei irini, aceti squillitici, ana ʒ iiij. in quibus coquatur nonnihil thymi, pulegij, origani, addendo colaturæ castorei parum, capillorum hominis combustorum ʒ se. misceantur, naribus frontique accommodetur totum.

G ij



## APPENDIX

ad prædicta pro curatione LETHARGIAE  
atque cari inferuiens.

Omniū primò ipsius cephalicæ sectio fiat: clystere interim emolliens atque lene præmitti poterit. Secta autem vena, enema fortiori materia grauians euocabitur, idque aliquoties repetetur eò quòd humores hîc uscidi crassique sint, viriûsque sopita. Inter ea autem temporis etiam statim à principio repellentibus utemur medicamentis quamdiu materia ad cerebrum ruit in eum finem, ut repellant materiam à cerebro, oleo nimirum rosaceo & aceto, quæ commissuræ coronali applicabimus. Post quartum autem diem resoluentia addemus prædicto unguento, ut est oleum liliorum, castoreum, oleum rutaceum, camomelinum, telâque linea prædictis imbuta, commissuræ coronali accommodabitur. Quæ verò retrahere diuenterèq. possunt materiam mali ægrotumque excitare, maximè hîc necessaria sunt: id quod fit clysteribus, ligaturis, frictionibus, cucurbitulis, quæ humeris admouebuntur cum scarificatione in principio potissimū mali. Versus autem statum occipiti accommodabuntur Purgantibus deinde medicamentis locus erit. Cùm autem morbus acutus sit statimque occidat, diligenti cura prædicta medicamenta administrabuntur, etiam si concoctionis signa non appareant. Postremò quæ corroborare intemperiemque relictam emendare possunt, præscribantur. Hæc autem omnia nunc antea, quæ dictis medicamentis felicissimo cū successu cōsequi poterimus, modò uniuersalia particularibus debita ratione accommodentur.



## Methodus pro Cognitione

# CATALEPSIS SEU CONGELATIONIS

INSERVIENS.

**C**ATALEPSIS seu congelatio, est subita quædam detentio, tum animæ, tum corporis, qua qui corripitur, eam partium corporis retinet figuram quam habebat

bebat cum corripereetur; sedens equidem aut iacens permanet, si iacebat aut sedebat dum corripereetur; unde stupor vigilans ab aliquibus dicitur, eò quòd hoc morbo correptus, sensus expers redditur, & motum in toto corpore amittit. Cum apoplexia convenit in hoc, quòd quemadmodum hic, sic etiam in catalepsi sensus & motus voluntarius perit. Differt autem in eo, quòd hic ipsi spiritus etiam afficiantur, nam congelantur quasi quietique manent, in quacunque corporis parte intercepti fuerint, partesque permanent rigidae; hoc autem nequaquam in apoplexia fit, tantummodo enim propter obstructionem impediuntur quò minus ad partes corporis diffundantur, unde partes relinquuntur quasi resolutae atque laxae, non frigidae neque rigidae, ut in catalepsi. Priorem quoque figuram commutare possunt in apoplexia ipsa membra cum spiritus sint integri. Oculi apoplecticis quoque clauduntur.

**PARS AFFECTA.** Cerebrum hic quoque affectum esse indicat actionis animalis, tam imaginativae quam sensitivae atque motivae, laesio. Læditur autem cerebrum hic secundum posteriorem eius partem.

**SIGNA.** Statim obmutescit æger; interrogatus enim responderet, motu denique atque sensu corpus priuatur, & licet vigilantis formam retineat, adeò tamen mens & omnes sensus consopiantur, & quidem subito, ut admiratione suspensos reddat æger intuentes, ita quidem vehementer, ut nonnulli eos raptos esse existiment in quod nescio cælum potius quam mortuos; tam enim mens validè detinetur, ut in eadem figura permaneant in qua erant cum percellerentur; nam ne oculi quidem clauduntur, si prius aperti erant, sed attentè astantium iudicio rem aliquam intuentur, fixae equidem permanent palpebrae. Si sedebat, sedens permanet; si cubuerit, in eadem quoque figura permanet. Alui & urinae fit suppressio propter sensuum torporem; sensus enim stupidus est effectus. Pulsus est parvus, languidus, multumque densus, interim æqualis.

**CAVSA** huius mali, est intemperies valdè frigida atque sicca cerebri, vnde contingit tum cerebrum, tum spiritus animales congelari areferique; non tantum autem refrigerari. Hanc autem intemperiem frequenter materia frigida & sicca introducit, qualis est melancholia. Aër quoque valdè frigidus & siccus eius causa est. Commistio quoque pituitæ cum flava bile, cum simul immodicè exuperant, eandem intemperiem proferunt. Prædictæ hæ causæ cerebrū spiritūsque animales non tantum refrigerant, sed etiam arefaciūt & quasi congelant.

**PROGNOSTICA.** Frigidioribus regionibus malum hoc magis familiare est quàm calidis. Laborant autem periculosissimè qui catalepsi corripuntur; quare confestim medicandi erunt; nisi enim maturè curentur, stupidi ac veluti quodam frigore enecti, moriuntur. Si tamen congelatio fuerit fortis, vix aut numquam curabitur.



*Methodus pro curatione*

**CATALEPSIS INSERVIENS.**

*Perficitur autem subsequentibus remediorum generibus.*

**VICTVS RATIONE.**

**A** Er sit calidus atque humidus.

Cibus, Pusianæ conuenit succus.

Potus, Vinum album, tenue, subastringens.

**PRAEPARANTIBVS.**

Syrupus de epithymo.

De succo fumarix.

Stœchados, buglossæ.

Aqua buglossæ, fumarix, melissophylli, lupulorum, betonicæ.

**Deco-**

Decoctum apij, fœniculi, calaminthæ, anethi.

## VACVANTIBVS.

Decoctum fumarię, lupulorum, boraginis, polypodij,  
senæ, epithymi, in quo diasena dissoluatur.

Confectio hamech.

Diacatholicum.

Diasena.

Hiera logodij, Hermetis, hiera diacolocynthidos.

Sena, polypodium quercinum.

Vomitus prouocetur.

Clystere satis acutum fiat è stœchade, saluia, beta, calamintha, pulegio, epithymo, camomilla, mercuriali, boragine, buglossa, thymo, polypodio, sena, elleboro nigro, hiera logodii, confectione hamech, Indo maiori, oleo camomillæ. In phlegmate vitreo purgantium iam dictorum loco, ponatur agaricus, colocynthis, electuarium de baccis lauri.

## AVERTENTIBVS.

Venæ sectio fiet cephalicę, dum à magna sit copia sanguinis & vires constant; educemusque sanguinem liberaliter.

Clystere superius commemoratum.

Frictiones, ligaturęque fiant brachiorum, dorsi, crurum, pedumque.

Hæmorrhoides, potissimum si antè fluxerint, prouocentur.

Clamores fortes fiant.

Sternutatoria medicamenta cum elleboro nigro.

*CORROBORANTIBVS, resoluentibus, intemperientque relictam emendantibus.*

Theriaca, mithridatum.

Confectio anacardina, diamuscum dulce.

Lætificans Galeni.

Plirisarcoticum.

Diambra.

Conserua radicum buglossæ.

Vinum maluaticum, hypocraticum.

G. iij



Fomentum pro posteriori capitis parte ex aqua vitæ.

Vnguentum martiatum & dialthææ.

Decoctum pro fomento fiat ex maiorana, stœchade, salvia, betonica, floribus camomillæ, meliloti in vino.

Fomentatio ex oleo liliorum, camomelino, amygdalorum dulcium, sesamino. Tempore verò vtilicebit fortioribus; laurino nimirum, rutaceo, euphorbii, spicato, aut prædictis aliquid euphorbii addetur.

Vnguentum pro capitis parte posteriori ex oleo liliorum, camomillæ, sambuci, anethi, rutæ, castoreo addito. In prædictis quoque coquere licebit hyssopum, thymum, serpyllum, epithymum, fumum terræ, flores buglossæ, boraginis; linteolis excipiantur & apponantur.

**THEORICA ET EMPIRICA MEDICAMENTA nobilia in CATALEPSI cum summa salute plurimorum egrotorum à Gualtero Bruel experta.**

**CVRATIO CATALEPSIS.**

℞ florum camomillæ, meliloti ana m. ij. mercurialis m. j. ꝑ. salviæ, thymi, pulegii, epithymi ana m. j. polypodii quercini, senæ Alexandrinæ ana ʒ v. epithymi ʒ ij. ellebori nigri ʒ j. coquantur in aqua q. s. ad fʒ j. ꝑ. colaturæ addantur confectionis hamech ʒ iiij. hieræ logodii ʒ viij. ꝑ. mellis rosati, olei communis ana ʒ ij. salis communis ʒ j. ꝑ. misceantur; fiat *Clystere*.

℞ Theriacæ præstantioris ʒ j. ꝑ. mithridati ʒ j. aquarum cardui benedicti ʒ iiij. fiat *Haustus*: detur statim ubi enemate purgatus fuerit.

℞ hieræ logodii ʒ ij. hieræ diacolocynthidos ʒ j. diagridii grana sex, salis communis ʒ j. mellis coctura concreti q. s. fiat *Suppositorium*, quod filo alligatum immittatur, si clystere non retineatur, aut præter expectationem.

cio-

tionem diutius in corpore obhareat.

℞ syrupi de epithymo, stœchados ana ℥ j. syrupi de fumoterræ, buglossæ ana ℥ β. aquarum lupulorum, boraginis, betonicæ ana ℥ iij. fiat *Iulch*.

℞ diasenæ ℥ iij. confectiōnis hamech ij. syrupi de epithymo ℥ j. aquarum betonicæ, cardui benedicti ana ℥ j. β. fiat *Haustus*: detur in aurora.

℞ radicū buglossæ, boraginis ana ℥ j. β. florum stœchados, buglossæ, cardui benedicti, epithymi ana m. j. feminum fœniculi ℥ v. hordei mundati ℥ ij. vuarum pasfarum enucleatarum ℥ j. β. coquantur in aqua buglossæ & betonicæ q. s. ad lb. j. addatur sub finem cocturæ vini albi & tenuis parum in quo nux muscata duodecim horarum spat̃o infusa fuerit, colaturæ expressæ permisceantur syrupi stœchados ℥ iij. syrupi de epithymo ℥ j. β. fiat *Potio*.

℞ foliorum senæ ℥ β. rhabarbari electi ℥ j. polydii quercini ℥ iij. florum stœchados m. β. nucis muscatæ ℥ ij. β. infundantur in prædicti decocti lb. j. horis duodecim, colaturæ addantur syrupi stœchados ℥ iij. fiat *Potio*.

℞ specierum lætificantis Galeni ℥ ij. conferuæ radicū buglossæ ℥ ij. nucis muscatæ ℥ j. β. omnia infundantur in vini malueatici librâ vna & media duodecim horarum spat̃o, detur *Haustus* vnus ter in die.

℞ Diamusci dulcis, lætificantis Galeni, trochiscorum de eupatorio ana ℥ ij. radicū angelicæ ℥ β. aquarum cardui benedicti, angelicæ & sacchari albißimi q. s. fiat *Electuarium* in tabulis. Sumat morsellum vnum donec conualuerit manè & vesperi.

℞ theriacæ veteris ℥ j. diamusci dulcis, lætificantis Galeni ana ℥ j. β. conferuæ buglossæ, anthos ana ℥ β. syrupi buglossati q. s. ad electuarii mollis consistentiā.

℞ foliorum betonicæ, saluix ana m. iij. fumarix, epithymi, melissophylli ana m. j. radicū liliorū alborū ℥ ij. florum stœchados, cardui benedicti, camomil-



læ ana m. j. ꝑ. coquantur in æquis portionibus vini & aquæ, fiat capitis lotio ipsa colatura; reliqua vero sacculo concludantur calentia, podicique subiiciantur propius, pannisque calentibus calor conseruetur.

℞ radicū buglossæ, boraginis ana ꝑ. ij. specierum diamusci dulcis, lætificantia Galeni ana ꝑ. iiii. florum cardui benedicti m. iii. vna ebullitione facta in vini maluatici sufficienti quantitate, fiat pro cordis confortatione *Epithema*.

℞ olei anethini, camomelini, liliorum ana ꝑ. j. ꝑ. coquantur in iis hyssopi, thymi, & serpylli aliquid: postea addatur colaturæ castorei ꝑ. i. ꝑ. fiat *Vnguentum* pro capitis parte posteriori, quo etiam à principio vti poterimus.

℞ olei liliacei, sambucini ana ꝑ. i. castorei ꝑ. ii. euphorbii ꝑ. i. aquæ vitæ ꝑ. ꝑ. fiat *Vnguentum* cum cera mediocriter molle.

## APPENDIX

### ad prædicta pro curatione CATALEPSIS inseruiens.

*Pro curatione huius gravissimi mali iis quæ modicè calida atque humida sunt, egemus. Omnium autem primò alius eluenda est prædicto clysterio. Hinc clamoribus, ligaturis, frictionibusque partium extremarum dolorificis ægrum excitabimus. In eundem etiam finem sternutatoria medicamenta præscribantur. Venæ quoque sectionem eodem tempore instituemus, ut prædictum est, si res ipsa patiatur. Vnguentis denique confortantibus, resolventibusque malum remitemus. Posteriori autem capitis parti ea potissimum accommodabimus. Ba'neum quoque ex oleo tepente communi, in eundem finem præscribetur. Vbi autem nonnihil ad se redierit æger, iis commodè utemur quæ humores naturæ obediētes reddere possunt, idque per quatuor aut quinque fiat dies. Demum eosdem è corpore annexis medicamentis propellemus. Postea quæ corroborare, reliquiasque consumere possunt, præscribantur. Quæ omnia nunc, antea-*  
*que*



que dictis medicamentis felicissimo cum successu consequi poterimus, modò uniuersalia particularibus debita ratione adhibeantur. A mitioribus autem medicamentis resoluedi vim habentibus auspicabimur, hinc ad validiora sensim transitio fiet. A principio quoque cum pannis calentibus frictions uniuersales instituemus. Ab acetosis hîc diligenter abstinendum, aliisque multum siccantibus medicamentis.



Methodus pro Cognitione

MANIÆ INSE-  
VIENS.

**M**ANIA, furor seu infania, est intentio melancholiae ad maiorem feritatem, alienationemque mentis sine febre, timore, & mæstitia. Instar ferarum quasi furere aliquando videntur hoc malo laborantes: cum enim calidus sit hic humor peccans, grauiâ admodum deliramenta excitat, qui humor quamdiu absque putredine in corpore heret, sine febre hominem vrget. Differt autem à phrenitide in hoc, quòd in phrenitide semper febris concurrat, furor autem semper à febre immunis est. Denique phrenitici semper primaria affectione cerebri laborant; maniâci verò etiam per consensum aliarum partium. A melancholia autem differt, quòd ex calida cerebri intemperie mania excitetur, melancholia verò fit à frigida. Præterea melancholia fit cū metu & mæstitia, mania nequaquam. In melancholia quoque imaginatio solum lèditur, in furore autem lèditur cum imaginatione ipsa etiam cogitatio seu ratiocinatio.

**PARS AFFECTA** est ipsum cerebrum, quod patet ex principalibus animæ functionibus oblesis. Contingit autem cerebrum hîc subinde laborare per se, aliàs verò per consensum aliarum partium; atra enim bilis à qua hoc malum fit, aliquando in capite oritur,


aliàs in toto corpore hæret, aliàs quoque in ipsis generatur præcordiis. Est autem symptoma pertinens ad actionem læsam principum facultatum, quæ depravatè læduntur; non autem ablatè, neque diminutè.

**SIGNA.** Proni sunt magna ex parte nunc in risum hilaritatemque, nunc in mærorem, interdum etiam (rarius tamen) in timorem inanum rerum labuntur. Subitò etiam temerarii, iracundi, clamosi & minaces fiunt. Aliquando saltant, inordinataque corporis agitatione feruntur. Nonnunquam verò ita seriò rem agunt, ut amicos atque astantes, aut verberibus, aut moribus, aut aliis iniuriis lædant, morésque quasi ferinos expriment. Toruos, intrepidus, attentosque habent oculos, semperque aliquid mali meditantur. Tantum etiam subinde insaniunt, ut sibi ipsis iniurientur, tuncque vinculis detinendi sunt. Vigiliæ etiam immodicæ concurrunt, à febrî tamen pro maiori parte sunt immunes. Excavantur oculi tempore. Præcedit plerumque insaniam iracundia præter consuetudinem. Oculis splendores, auribus autem sonitus extranei obuersantur. In Venerem pronitas oritur, nec non curæ de rebus extraneis, quæ paulatim omnia augentur.

**CAUSA.** Oritur ex calida cerebri intemperie, quæ subinde sola est. Aliàs ex humorum calidorum mordaciumque præsentia fit, & subinde quidem ex melancholico humore plurimum exusto, ita ut in atram bilem degeneret, fit; tuncque semper ferè cum metu delirant, taciturnique per intervalla fiunt, qui, cum loqui incipiunt, silere nequeunt, ita ut admodum loquaces rursus fiant. Aliàs etiam fit ex præassata bile flava, atque tunc ferina deliramenta excitantur, ita ut admodum fiant temerarii; plerumque etiam fortitudo aliena comitatur, ita ut violento corporis impetu formidabiles fiant. sæpè tunc obuiis, etiam domesticis frequenter vim inferunt, percussores equidem & iniuriosi evadunt. Aliquando etiam ex copia feruentis sanguinis exusti, in atramque bilem mutati, generatur, si ad caput

put impetum fecerit, tunc plerumque cum risu atque cantu immodico insanire solent. Hæc autem victus ratio, temperamentum, aliæque similia indicabunt. Aliàs etiam oritur insania ex immodicis vigiliis, sollicitudinibus, nimis cerebri excalfactionibus.

**PROGNOSTICA.** Magis est frequens iuuenibus ac mediæ ætatis hominibus hoc malum. Desipientiæ quæ cum risu fiunt minus periculosa sunt iis quæ cum studio accidunt, eoque periculosiores sunt quo maior concurrit temeritas. Omnium verò periculosissime sunt desipientiæ quæ superaffatione flauæ bilis fiunt. Menses autem hemorrhoidesque hîc si fluant, bonum est. Malum est appetitum prostratum esse, viceræque in facie, ano, pedibusve enata esse.



*Methodus pro Curatione*

**MANIÆ INSER-  
VIENS.**

*Perficitur autem subsequenter remediorum generibus.*

**VICTVS RATIONE.**

**A** Er sit temperatus, ad humiditatem nonnihil vergens.

Cibus sit liquidus, sorbilis, corpusque humectans in principio, uti est ptisana. Iusculum colaticium, gallinarum, perdicum, pullorum. Minimè sint flatuosa quæ offeruntur, bilémve gignentia.

Potus sit aqua hordei. Vinum non admittatur. Interim si ob metum aut melancholiam adustam hoc malum originem habuerit, vinum proderit tenue.

Exercitium conuenit moderatum.

Somnus hîc quoque conuenit consueto tempore diu-



turnior, qui prouocandus omnino erit, tum sumptis tum admotis medicamentis.

Excrementa alui arte, si non reddantur natura, prouocanda sunt, aluum enim necessum est habeat humidam.

Amicorum admittatur praesentia, ignotorum verò, quibusque iratus est, ingressus prohibeatur,

PRAEPARANTIBVS.

Syrupus violarum, fumariae, nenupharinus.

Acetosus simplex.

Syrupus buglossae, boraginis.

Syrupus de cichoreo cum rhabarbaro.

Aquae violarum, lupulorum, buglossae, nymphaeae, cichorei, endiuiae, acetosae.

VACVANTIBVS.

Venae sectio fiat si ex abundantia feruentis sanguinis infania excitetur, & quidem copiose tunc educatur. Primò autem saphenae sectio fiet, sequenti autem die secabitur mediana humeraria. Postea secabimus etiam venam in fronte, si malum non leuetur. Nequaquam autem vena secabitur, si malum hoc à cholera fiat adusta absque sanguinis plenitudine, cum sanguis sit frenum cholerae.

Syrupus de multiplici infusione rosarum.

Confectio hamech, diacatholicum.

Diasena Nicolai, hiera logodii.

Hiera picra, hiera diacolocynthidos.

Pillulae Inde, de lapide Armeno.

Potus ex violis, cichoreo, fumaria, intubo, buglossa, chamedri, floribus nymphaeae, seminibus frigidis maioribus, fumaria, glycyrriza, vuis passis, epithymo, manna, casia, polypodio, sena, myrobalanis citrinis.

Clystere ex foliis violarum, lactuca, althaeae, maluarum, seminibus frigidis maioribus, oleo violarum.

AVERTENTIBVS.

Venae saphenae sectio fiet primò, uti praedictum est.

Hirudines sincipiti aliisque partibus capitis per ambitum admovebimus. Hæ-

Hæmorrhoides aperiantur.

Menses ut fluant, procuretur.

REPELLENTIBVS.

Irrigatio capitis fiet cum rosaceo, succo polygonij, aceto; quæ sincipiti cum linteolo apponentur, frequentiusque mutabuntur.

Fomentatio capitis fiet cum decocto florum stæchados, camomillæ, violarum, rosarum, foliis lactucæ, capitibus papaueris albi; aceto addito.

ROBORANTIBVS *cerebrum, intemperientemque emendantibus.*

Diamargaritum frigidum, electuarium de gemmis diarhodum abbatis.

Diatrion sandali, manus Christi.

Conserua rosarum, buglossæ, nymphææ, adianthi, boraginis, violarum.

Epithema pro hepate ex aqua intubi, rosarum, acetosæ, seminibus portulacæ, camphora, spica nardi.

Epithema pro corde ex aqua buglossæ, rosarum, nymphææ, aceto, trochiscis de camphora, diamargarito frigido.

Balneum ex aqua in qua decoquantur flores camomillæ, incliloti, violarum, folia lactucæ, salicis, nymphææ, maluæ, buglossæ, quo caput quoque irrigabitur quamdiu balneo insidebit.

Vnguentum pro spinali medulla, atque pectore ex oleo nymphææ, amygdalarum dulcium, rosarum, violarum, eo post exitum balnei utetur.

Cauteria coronali commissuræ applicentur.

PROVOCANTIBVS *somnum.*

Diarhodum cum syrupo nymphææ.

Embrocatio capitis ex seminibus papaueris, floribus nymphææ, rosarum, violarum lactucæ.

Vnguentum pro temporibus atque fronte ex oleo violarum, mandragoræ, mulieris lacte.

THEORICA ET EMPIRICA MEDICAMENTA nobilia in MANIA, sæpius cùm summa salute plurimorum egrotorum à Gualtero Bruel experta.

CVRATIO MANIAE.

℞ foliorum maluæ, lactuæ, violarum, florum violarum, boraginis, endiuæ, ana m. j. horde. ʒ j. coquantur in iusculo carniū q. s. ad ℥ j. β. colaturæ addantur hieræ picrę simplicis ʒ j. β. cassiæ recenter extractæ ʒ j. olei violarum ʒ iij. fiat *Clystere* emolliens.

℞ syr. endiuę, acetosi simplicis, violarum, buglossæ ana ʒ j. syrupi fumaræ ʒ β. aquarum endiuę, buglossę, violarum, boraginis ana ʒ iij. fiat *Zuleb*; dentur ʒ iij. in aurora.

℞ radicis buglossæ ʒ j. β. foliorum intubi, cichorei, fumarie, lupulorum ana m. j. β. florum boraginis, buglossæ, violarum ana m. j. seminum melonum, cucumeris, cucurbitæ, ana ʒ ij. β. senæ Alexandrinæ, polypodij quercini ana ʒ j. epithymi ʒ β. rhabbarbari ʒ j. β. glycyrrhizæ rasæ ʒ iij. vuarum passarum enucleatarum ʒ j. tamarindorum ʒ β. coquantur in aqua q. s. ad ℥ j. β. colaturæ adde diasenæ ʒ vj. cassiæ recenter extractæ ʒ j. syr. rosarum solutiui ʒ ij. fiat *Porio*, sumet ʒ iij. in aurora per quinque vel sex dies.

℞ confectionis hamech ʒ ij. β. electuarij de succo rosarum ʒ ij. diacatholici ʒ ij. syrupi violarum ʒ j. aquæ violarum, buglossę ana ʒ j. β. fiat *Haustus*, detur hora quinta manè.

℞ pillularum de lapide lazuli, Armeno, indarum ana ʒ j. cum syrupo de epithymo q. s. formentur *Pillule* septem vel octo, sumantur post primum somnum.

℞ diarhod. abbatis sine moscho ʒ iij. sp. diatrion sandali ʒ j. β. facchari rosacei, syrupi violarum ana ʒ j. β. fiat *Electuarium* molle, aut

℞ sp.



℞ sp. diamargariti frigidi 3 ij. conferuæ violarum, buglossæ ana 3 vj. conferuæ rosarum 3 sem. lohoch de papauere 3 iij. sem. syr. violarum, pomorum ana 3 j. misceantur, fiat *Electuarium* molle: detur duabus vel tribus horis ante prandium & cœnam 3 se.

℞ olei violarum, rosarum ana 3 j. olei amygdalarum dulcium, nenupharini ana 3 se. eo caput à principio mali vngatur, hinc spinalis medulla & pectus post exitum balnei.

℞ aquæ buglossæ, rosarum, nymphææ ana 3 v. aceti 3 se. sp. diatrion sandali, diatrag. frigidi ana 3 ii j. croci 3 se. fiat pro cordis regione *Epithema*, quo cor bis in die refocilletur ante cibum.

℞ foliorum violarum, lactucæ, nymphææ, maluæ ana m. iij. foliorum salicis, vitis, florum camomillæ, meliloti ana m. ij. coquantur in aqua q. s. pro *Balneo*, cui post purgationem æger committetur; sit autem calidum modicè, plurimum equidem confert. Caput etiam eo potest irrigari rasum, vteturq. eo ante cibum, post exitum autem ita lecto committatur vt non sudet.

℞ folia lactucæ, violarum, salicis, florum nenupharini, rosarum ana m. j. se. florum camomillæ p. j. seminum lactucæ 3 se. papaueris albi 3 j. se. capita veruecum numero duo, fiat *Embrocha*, quo quater vel quinies in die vtetur.

℞ Syrupi violarum, paupauerini, diacodij ana 3 sem. aquæ lactucæ, succi ptisanæ ana 3 ij. fiat *Potus* pro somno, detur hora somni.

℞ olei violarum, mandragoræ, ana 3 iij. cum peplo temporibus atque fronti admoveantur.


℞ olei amygdalarum dulcium, camomelini ana 3 j. se. olei violarum 3 ij. fiat *Vnguentum* pro capite; quo post principium vbi materia resoluenda est, vti poterimus. In eundem quoque finem catuli aut pulli per medium dissecentur, aut pulmo arietis adhuc calens capiti accommodetur; roborant enim hæc cerebrum, vaporésque relictos resoluunt suo temperato calore, & humectant

H

## APPENDIX

ad prædicta pro curatione MANIAE seu  
furoris inserviens.

Omniū primò alius subducatur clysterio: Demum vena secatur cum cauiela prædicta. Humores hinc peccantes naturæ obediētes reddantur, necnon purgentur. Interea quoque temporis humores aueriemus iis quæ hæmorrhoides aut menses prouocant; id quod etiam fieri potest sectione ipsius saphenæ. Demum ea quæ cerebrum necnon corroborare possunt offerantur & quæ materiam reliquam dissipare possunt. Quæ omnia nunc, anteaquæ dictis medicamentis felicissimo cum successu consequi poterimus, modò vniuersalia particularibus debita ratione adhib. anitur. Cauterio quoque actuali aut potenciali locus erit, dum prædictis non cedit remediis; anteriori autem parti capitis apponemus, ubi commissura est coronalis cum sagittali. Imprimemus autem ita aliè, donec ossis denudationem consecui fuerimus, de quo porriunculam etiam auferemus, sicque apertum quasi per mensem seruabimus, hoc enim medicamento ma um tandem superare solemus. In eo autem differt cura manie à melancho ia, quòd in mania debeat esse maior intentio remittendi acrimoniam humoris, quod humectantibus, modicèque sit refrigerantibus.



## Methodus pro Cognitione

## PHRENITIDIS INSERVIENTIS.

**P**HRENITIS vera, est cerebri aut membranarum eius inflammatio febrem acutam, delirium mentis, quæ alienationem inducens. Infantiæ genus admodum horrendum periculosumque, cum in ea parte generetur morbus in qua princeps animæ facultas residet. Cum autem magna ex parte phrenitis vera è non vera oriatur, ideo de hac etiam hic tractabimus. Est itaque  
phrenitis

phrenitis non vera, mentis alienatio, cum inquietudine sine cerebri apostemate. Sequitur autem febrem sanguineam aut biliosam. Deliria autem non sunt hic ita notabilia, nec perpetuò affligunt, augentur equidem & minuuntur, prout febris intenditur vel minuitur. Potissimum autem fit hora crisis, quam interdum præuenit, vnaque cum morbo incrementum sumit, & hac quoque ratione vehementior erit hora & die exacerbationis quam quietis, in istis enim febribus contingit vapores aridos ad arcem cerebri ascendere, vnde spiritus animales perturbantur haud leuiter. Sequitur etiam subinde apostemata & abscessus, ex quibus graues febres oriuntur. non itaque morbus, sed morbi alterius est symptoma. Frequentius autem multò quam vera phrenitis accidit, hæc enim rarius.

**PARS AFFECTA**, est cerebri pia aut dura mater, id quod constat ex læsione functionum inde prodeuntium; sæpius autem fit in hac, tuncque minus est perniciofa. Laborat autem semper propria primariaque affectione, & æger continuò molestat, estque phrenitis vera, morbus in compositione, in magnitudine equidem peccat, & in intemperie, calida nimirum.

**SIGNA.** Febris adest continua atque arida, vigilæque fiunt molestæ, & somnus difficilis, vnde plurimum turbantur, è lecto que subito interrupta quiete exiliunt, spiratio fit ex interuallis, seu rara & magna, oculis rubedo, squalidâq. siccitas molitâq. mobilitas accidit; ex altero tamen oculo sæpe etiam fluit lacryma acris, oculorum venę sanguine turgēt, pulsus frequens, celer & magnus est. Adest deliriū mentisque alienatio, ita vt nihil respondeant quod ad prudentiam attinet interrogati, imò propter abolitā memoriā, non sunt memores eorū quæ dicunt aut faciunt, vnde verba nullo ordine sensûque proferunt, & varia imaginantur, modò plorant, modò cantant, aliàs vociferantur, aliàs quoque ferociter in omnem audaciam proclines fiunt, variaque nugantur. Lingua fit quasi aspera, squalida atq. nigra, admodum



fitiunt, floccos & festucas digitis colligunt, manus tremunt, altè spirant; vrina tenuis flammeaque est, aliquando quoq. alba est & tenuis, estq. maioris pernicipis nota.

**CAUSA.** Magna ex parte ex sanguine exuperante originem habet, & hi sæpe cum risu insaniunt, delirant minus, nec ita febricitant. Dum verò à bile adusta & effe-  
rata sit, tunc admodum immaniter insaniunt, & necessum est illos subinde vinculis cohibere; fortissimos enim motus edunt phrenitici, quod contingit propter siccitatem. Maxima comitatur febris quoque.

**PROGNOSTICA.** Acutissimus periculosissimúsque est affectus, breuiq. hominem occidit, nisi succurratur. vniuersum enim phrenitidis genus est exitiale, eò quòd in loco in quo princeps animæ pars residet, generetur. Interim desipientiæ quæ cum risu fiunt, minus periculosa: quæ verò cum studio, periculosiores sunt: omnium autem grauissima censetur, quæ ex adusta bile generatur. Vbi desipientiam somnus sedat, bonum: si non, malum. Continua autem vigilia atque dementia mortiferum.



### *Methodus pro Curatione*

## PHRENITIDIS INTER- VIENS.

*Perficitur autem subsequen-  
tibus remediorum  
generibus.*

### VICTVS RATIONE.

**A** Er temperatus concilietur & luminosus mediocriter, varietasque picturarum absit.

Cibus. ea quæ humectare refrigerareque corpus possunt præscribantur, vt est prisanæ cremor. Moderatus autem admodum debet esse alimentorum vsus; vti  
enim

enim immodica copia malum auget, sic inedia nimia vires plurimum prostermit. Olera fiant è lactuca, malua, intubo. Versus declinationem morbi offerri poterunt pisces saxatiles, squamosique.

Potus sit aqua hordei in principio: cui vtile erit addere aliquid syrupi violacei, nymphææ, rosacci. Subinde quoque decoctum cinnamomi imperabitur.

Motus inordinatus vitandus, pœtiusque quies imperanda. Frictiones tamen partium infernarum fiant eo potissimum tempore quo symptomata magis erunt propitia.

Somnus conciliandus est tum localibus, tum sumptis medicamentis.

Excremēta alui mouēda: detenta enim morbū augent.

Animi perturbationes hīc plurimum incommodant: quare gratissimi amici aduocandi, qui aliās blandē illum conueniant, subinde etiam acerbius obiurgent.

## VACVANTIBVS.

Venæ sectio fiat protinus ab initio, modò vires consent: in mora enim periculū est: vix enim aliud salubrius atque magis præsens remediū est huic malo destinatū: in mitioribus autē morbis prius aluus eluenda arte est: secabimus autem primò venam humeralem: hinc cephalicam aut medianam, si prior non appareat. eādem vbi materia iam fluxa est, etiam in fronte venam secabimus. idque vt rectè fiat, constringemus collū artificiosè aliqua fascia, vt vena attollatur.

Clysteres primò clementiores ex decocto maluarum, betæ violarum, lactucæ hordei, seminum cucumeris, cucurbitæ, cassia fistula, electuario de succo rosarum, diapruno solutiuo, diacatholicone, hiera picra: oleo violarum, melle rosato.

Electuarium Indū, de succo rosarū, electuariū rosatum.

Diaprunum solutiuum. Syrupus rosarum laxatiuus.

Pillulæ aggregatiuæ, aureæ. Trochisci de rhabarbaro.

Cassia recenter extracta. Manna, myrobalani, rhabarbarum in aqua endiuia infundatur.

H iij

Materia biliosa vacuanda erit etiam in principio mali, interim leue præscribatur deiectorium medicamentum, ne humores potius exagitentur quàm purgentur. Clysteres emollientes & alterantes dentur tertio quoque die.

## AVERTENTIBVS.

Venæ sectio instituatur, vt prædictum.

Clysteres leues fiant primò, hinc validiores.

Purgantia prædicta medicamēta: auertēdi enim causa maximè etiā proderūt, ne scilicet absoluator eresypelas.

Cucurbitulæ cum scarificatione spinæ, occipitio, humeris, natibúsque admouendæ erunt, si vena cubiti secta non fuerit ob aliquam causam: sine scarificatione autem applicentur, si vena secta fuerit.

Sanguisugas fronti temporibúsque admouere poterimus, cum morbus ad statum tendit.

Vincula, ligaturæque, necnon frictiones extremarum partium dolorificæ, non parum conferunt ad humorum à capite auersionem, cum motum humorum fiant atque reuellant.

Lotiones pedum manuumque fiant ex decocto lactucæ, violarum, hordei, capitum papaueris: quo decocto cerebrum etiam humectandū mediante spongia erit.

## REPELLENTIBVS.

Oxyrhodum ex aqua rosacea, aceto, oleo rosato: hæc panno excepta sincipiti, collo, capitique admouebuntur frigida, sæpiúsque repetantur: hinc tempore oleum camomelinum admiscebimus.

Aqua rosacea, plantaginis, acetum, oleum rosatum.

Embrocatio fiat ex decocto seminis papaueris albi, hyoscyami, florum nymphææ, violarum, rosarum, succo plantaginis, lactucæ addito: petitiæ laneæ iis infundantur, sincipitique admoueantur, colloque circumponantur: vapores enim humoresque in crassant: ineptioresque ad motum reddunt, cum eorum virtute, meatus corporis per quos humores ad cerebri arcem repunt, contrahantur.

Succus



Succus lactucæ, rosarum, plantaginis, nymphææ, cucurbitæ.

Odoramentum ex aqua plantaginis, rosarum, semperuiui, acetosæ, camphora, floribus rosarum, nymphææ; pane aliquantulum torrefacto.

Vnguentum populeonis non ita pridem factum.

Mox ab initio hisce uti licebit medicamentis absque ullis resoluentibus, quæ versus incrementum, statum atque declinationem permiscemus secundum plus & minus, prout ratio scilicet dictabit. uti autem in augmento repellentia debent superare resoluentia; sic in declinatione resoluentia debent superare repellentia; in statu autem par sit pondus utriusque, unde serio vitandus est continuus horum usus; materias enim incrasant, resoluque prohibent. unde ex continuo eorum usu lethargia accersiri potest; quare versus statum omnino à repellentibus abstinemus, cum tunc maxime expediat apertionem meatuum, humorumque discussionem procurare.

*CORROBORANTIBVS, resoluentibusque morbi reliquias.*

Diamargaritum frigidum, castoreum.

Syr. granatorum, rosarum, cum aqua rosarum, buglossæ, plantaginis: detur postquam alimentum sumpserit; sic enim ad caput eorum vis melius transfertur.

Conserua rosarum, violarum, florum nymphææ, buglossæ.

Irrigatio fiet capitis ex violis, rosis, floribus nymphææ, lactuca, papauere, camomilla, meliloto, althæa.

Balneum aquæ dulcis tepidum conuenit.

Pulmo arietis, aut eiusdem hepar, aut catulus, capo, gallina, glurive, aliave huiusmodi animalia exenterata, per medium spinæ secabuntur, sicque adhuc calentia capiti admovebuntur magno cum cerebri commodo.

H iij

turnior, qui prouocandus omnino erit, tum sumptis  
tum admotis medicamentis.

Excrementa alui arte, si non reddantur natura, prouo-  
canda sunt, aluum enim necessum est habeat humi-  
dam.

Amicorum admittatur præsentia, ignotorum verò, qui-  
quibusque iratus est, ingressus prohibeatur.

#### PRAEPARANTIBVS.

Syrupus violarum, fumarix, nenupharinus.

Acetosus simplex.

Syrupus buglossæ, boraginis.

Syrupus de cichoreo cum rhabarbaro.

Aquæ violarum, lupulorum, buglossæ, nymphææ, ci-  
chorei, endiuix, acetosæ.

#### VACVANTIBVS.

Venæ sectio fiat si ex abundantia feruentis sanguinis  
insania excitetur, & quidem copiose tunc educatur.  
Primò autem saphenæ sectio fiet, sequenti autem die  
secabitur mediana humeraria. Postea secabimus e-  
tiam venam in fronte, si malum non leuetur. Ne-  
quaquam autem vena secabitur, si malum hoc à  
cholera fiat adusta absque sanguinis plenitudine,  
cùm sanguis sit frenum cholerae.

Syrupus de multiplici infusione rosarum.

Confectio hamech, diacatholicum.

Diasena Nicolai, hiera logodii.

Hiera picra, hiera diacolocynthidos.

Pillulæ Inde, de lapide Armeno.

Potus ex violis, cichoreo, fumarix, intubo, buglossa,  
chamedri, floribus nymphææ, seminibus frigidis ma-  
ioribus, fumarix, glycyrriza, vuis passis, epithymo,  
manna, casia, polypodio, sena, myrobalanis citrinis.

Clystere ex foliis violarum, lactucæ, althææ, maluarum,  
seminibus frigidis maioribus, oleo violarum.

#### AVERTENTIBVS.

Venæ saphenæ sectio fiet primò, vti prædictum est.

Hirudines sincipiti aliisque partibus capitis per am-  
bitum admovebimus. Hæ-

Hæmorrhoides aperiantur.  
Menses ut fluant, procuretur.

REPELLENTIBVS.

Irrigatio capitis fiet cum rosaceo, succo polygonij, aceto; quæ sincipiti cum linteolo apponentur, frequentiusque mutabuntur.

Fomentatio capitis fiet cum decocto florum stæchados, camomillæ, violarum, rosarum, foliis lactucæ, capitibus papaueris albi; aceto addito.

ROBORANTIBVS *cerebrum, intemperiemque emendantibus.*

Diamargaritum frigium, electuarium de gemmis diarhodum abbatis.

Diatrion sandali, manus Christi.

Conserua rosarum, buglossæ, nymphææ, adianthi, boraginis, violarum.

Epithema pro hepate ex aqua intubi, rosarum, acetosæ, seminibus portulacæ, camphora, spica nardi.

Epithema pro corde ex aqua buglossæ, rosarum, nymphææ, aceto, trochiscis de camphora, diamargarito frigido.

Balneum ex aqua in qua decoquantur flores camomillæ, meliloti, violarum, folia lactucæ, salicis, nymphææ, maluæ, buglossæ, quo caput quoque irrigabitur quamdiu balneo insidebit.

Vnguentum pro spinali medulla atque pectore ex oleo nymphææ, amygdalarum dulcium, rosarum, violarum, eo post exitum balnei utetur.

Cauteria coronali commissuræ applicentur.

PROVOCANTIBVS *somnum.*

Diarhodum cum syrupo nymphææ.

Embrocatio capitis ex seminibus papaueris, floribus nymphææ, rosarum, violarum lactuca.

Vnguentum pro temporibus atque fronte ex oleo violarum, mandragoræ, mulieris lacte.



**THEORICA ET EMPIRICA MEDICAMENTA nobilia in MANIA, sæpius cùm summa salute plurimorum agrotorum à Gualtero Bruel experta.**

**CVRATIO MANIAE.**

℞ foliorum maluæ, lactuæ, violarum, florum violarum, boraginis, endiuæ, ana m. j. horde ʒ j. coquantur in iusculo carniū q. s. ad ℥ j. β. colaturæ addantur hieræ picrę simplicis ʒ ij. β. cassiæ recenter extractæ ʒ j. olei violarum ʒ iiij. fiat *Clystere* emolliens.

℞ syr. endiuę, acetosi simplicis, violarum, buglossæ ana ʒ j. syrupi fumaræ ʒ β. aquarum endiuę, buglossę, violarum, boraginis ana ʒ iiij. fiat *Iuleb*; dentur ʒ iiij. in aurora.

℞ radicis buglossæ ʒ j. β. foliorum intubi, cichorei, fumarie, lupulorum ana m. j. β. florum boraginis, buglossæ, violarum ana m. j. seminum melonum, cucumeris, cucurbitæ, ana ʒ ij. β. senæ Alexandrinæ, polypodij quercini ana ʒ j. epithymi ʒ β. rhabbari ʒ j. β. glycyrrhizæ rasæ ʒ iiij. vuarum passarum enucleatarum ʒ j. tamarindorum ʒ β. coquantur in aqua q. s. ad ℥ j. β. colaturæ adde diasenæ ʒ vj. cassiæ recenter extractæ ʒ j. syr. rosarum solutiui ʒ ij. fiat *Potio*, sumet ʒ iiij. in aurora per quinque vel sex dies.

℞ confectionis hamech ʒ ij. β. electuarij de succo rosarum ʒ ij. diacatholici ʒ iiij. syrupi violarum ʒ j. aquæ violarum, buglossę ana ʒ j. β. fiat *Haustus*, detur hora quinta manè.

℞ pillularum de lapide lazuli, Armeno, indarum ana ʒ j. cum syrupo de epithymo q. s. formentur *Pillule* septem vel octo, sumantur post primum somnum.

℞ diarhod. abbatis sine moscho ʒ iiij. sp. diarrion sandali ʒ j. β. sacchari rosacei, syrupi violarum ana ʒ j. β. fiat *Electuarium* molle, aut

℞ sp.

℞ sp. diamargariti frigidi 3 ij. conseruæ violarum, buglossæ ana 3 vj. conseruæ rosarum 3 sem. lohoch de papauere 3 iij. sem. syr. violarum, pomorum ana 3 j. misceantur, fiat *Electuarium* molle: detur duabus vel tribus horis ante prandium & cœnam & se.

℞ olei violarum, rosarum ana 3 j. olei amygdalarum dulcium, nenupharini ana 3 se. eo caput à principio mali vngatur, hinc spinalis medulla & pectus post exitum balnei.

℞ aquæ buglossæ, rosarum, nymphææ ana 3 v. aceti 3 se. sp. diatrion sandali, diatrag. frigidi ana 3 ii j. croci 3 se. fiat pro cordis regione *Epithema*, quo cor bis in die refocilletur ante cibum.

℞ foliorum violarum, lactucæ, nymphææ, maluæ ana m. iij. foliorum salicis, vitis, florum camomillæ, meliloti ana m. ij. coquantur in aqua q. s. pro *Balneo*, cui post purgationem æger committetur; sit autem calidum modicè, plurimum equidem confert. Caput etiam eo potest irrigari rasum, vteturq. eo ante cibum, post exitum autem ita lecto committatur vt non sudet.

℞ folia lactucæ, violarum, salicis, florum nenupharini, rosarum ana m. j. se. florum camomillæ p. j. seminum lactucæ 3 se. papaueris albi 3 j. se. capita veruecum numero duo, fiat *Embrocha*, quo quater vel quinies in die vtetur.

℞ Syrupi violarum, paupauerini, diacodij ana 3 sem. aquæ lactucæ, succi ptisanæ ana 3 ij. fiat *Potus* pro somno, detur hora somni.

℞ olei violarum, mandragoræ, ana 3 iij. cum peplo temporibus atque fronti admoveantur.


℞ olei amygdalarum dulcium, camomelini ana 3 j. se. olei violarum 3 ij. fiat *Vnguentum* pro capite; quo post principium vbi materia resoluenda est, vti poterimus. In eundem quoque finem catuli aut pulli per medium dissecentur, aut pulmo arietis adhuc calens capiti accommodetur; roborant enim hæc cerebrum, vaporesque relictos resoluunt suo temperato calore, & humectant

H

## APPENDIX

ad prædicta pro curatione MANIAE seu  
furoris inserviens.

Oranium primò alvus subducatur clysterio: Demum vena secatur cum cautela prædicta. Humores hinc peccantes naturæ obediētes reddantur, necnon purgentur. Interea quoque temporis humores auertemus iis quæ hæmorrhoides aut menses prouocant; id quod etiam fieri potest sectione ipsius saphenæ. Demum ea quæ cerebrum necnon corroborare possunt offerantur & quæ materiam reliquam dissipare possunt. Quæ omnia nunc, anteaquæ dictis medicamentis felicissimo cum successu consequi poterimus, modò vniuersalia particularibus debita ratione adhibeantur. Cauterio quoque actuali aut potenciali locus erit, dum prædictis non cedit remediis; anteriori autem parti capitis apponemus, ubi commissura est coronalis cum sagittali. Imprimemus autem ita altè, donec ossis denudationem consecuti fuerimus, de quo portiunculam etiam auferemus, sicque apertum quasi per mensem seruabimus, hoc enim medicamento ma ium tandem superare solemus. In eo autem differt cura mania à melancho ia, quòd in mania debeat esse maior intentio remittendi acrimoniam humoris, quod humectantibus, modicèque sit refrigerantibus.



## Methodus pro Cognitione

## PHRENITIDIS INSERVIENTIS.

**P**HRENITIS vera, est cerebri aut membranarum eius inflammatio febrem acutam, delirium mentis-que alienationem inducens. Infantiæ genus admodum horrendum periculosumque, cum in ea parte generetur morbus in qua princeps animæ facultas residet. Cum autem magna ex parte phrenitis vera è non vera oriatur, ideo de hac etiam hinc tractabimus. Est itaque  
phrenitis



phrenitis non vera, mentis alienatio, cum inquietudine sine cerebri apostemate. Sequitur autem febrem sanguineam aut biliosam. Deliria autem non sunt hinc ita notabilia, nec perpetuò affligunt, augentur equidem & minuuntur, prout febris intenditur vel minuitur. Potissimum autem fit hora crisis, quam interdum præuenit, vnaque cum morbo incrementum sumit, & hac quoque ratione vehementior erit hora & die exacerbationis quam quietis, in istis enim febribus contingit vapores aridos ad arcem cerebri ascendere, vnde spiritus animales perturbantur haud leuiter. Sequitur etiam subinde apostemata & abscessus, ex quibus graues febres oriuntur. non itaque morbus, sed morbi alterius est symptoma. Frequentius autem multò quam vera phrenitis accidit, hæc enim rarius.

**PARS AFFECTA**, est cerebri pia aut dura mater, id quod constat ex læsione functionum inde prodeuntium; sæpius autem fit in hac, tuncque minus est perniciofa. Laborat autem semper propria primariaque affectione, & æger continuò molestat, estque phrenitis vera, morbus in compositione, in magnitudine equidem peccat, & in intemperie, calida nimirum.


**SIGNA**. Febris adest continua atque arida, vigiliæque fiunt molestæ, & somnus difficilis, vnde plurimum turbantur, è lecto que subito interrupta quiete exiliunt, spiratio fit ex interuallis, seu rara & magna, oculis rubedo, squalidâq. siccitas molitâq. mobilitas accidit; ex altero tamen oculo sæpe etiam fluit lacryma acris, oculorum venę sanguine turgēt, pulsus frequens, celer & magnus est. Adest deliriū mentisque alienatio, ita vt nihil respondeant quod ad prudentiam attinet interrogati, imò propter abolitā memoriā, non sunt memores eorū quæ dicunt aut faciunt, vnde verba nullo ordine sensûque proferunt, & varia imaginantur, modò plorant, modò cantant, aliàs vociferantur, aliàs quoque ferociter in omnem audaciam proclines fiunt, variaque nugantur. Lingua fit quasi aspera, squallida atq. nigra, admodum



ficiunt, floccos & festucas digitis colligunt, manus tremunt, altè spirant; vrina tenuis flammeaque est, aliquando quoq. alba est & tenuis, estq. maioris pernicipis nota.

**CAUSA.** Magna ex parte ex sanguine exuperante originem habet, & hi sæpe cum risu insaniunt, delirant minus, nec ita febricitant. Dum verò à bile adusta & effe-  
rata fit, tunc admodum immaniter insaniunt, & necessum est illos subinde vinculis cohibere; fortissimos enim motus edunt phrenitici, quod contingit propter siccitatem. Maxima comitatur febris quoque.

**PROGNOSTICA.** Acutissimus periculosissimúsque est affectus, breuiq. hominem occidit, nisi succurratur. vniuersum enim phrenitidis genus est exitiale, eò quòd in loco in quo princeps animæ pars residet, generetur. Interim desipientiæ quæ cum risu fiunt, minus periculosa: quæ verò cum studio, periculosiores sunt: omnium autem grauissima censetur, quæ ex adusta bile generatur. Vbi desipientiam somnus sedat, bonum: si non, malum. Continua autem vigilia atque dementia mortiferum.



### *Methodus pro Curatione*

## PHRENITIDIS INSER- VIENS.

*Perficitur autem subsequen-  
tibus remedium  
generibus.*

### VICTVS RATIONE.

**A** Er temperatus concilietur & luminosus mediocriter, varietasque picturarum absit.

**Cibus.** ea quæ humectare refrigerareque corpus possunt præscribantur, vt est prisanae cremor. Moderatus autem admodum debet esse alimentorum vsus; vti enim

enim immodica copia malum auget, sic inedia nimia vires plurimum prostermit. Olera fiant è lactuca, malua, intubo. Versus declinationem morbi offerri poterunt pisces saxatiles, squamosique.

Potus sit aqua hordei in principio: cui vtile erit addere aliquid syrupi violacei, nymphææ, rosacci. Subinde quoque decoctum cinnamomi imperabitur.

Motus inordinatus vitandus, pœtiùsque quies imperanda. Frictiones tamen partium infernarum fiant eo potissimum tempore quo symptomata magis erunt propitia.

Somnus conciliandus est tum localibus, tum sumptis medicamentis.

Excremēta alui mouēda: detenta enim morbū augent.

Animi perturbationes hīc plurimum incommodant: quare gratissimi amici aduocandi, qui aliàs blandè illum conueniant, subinde etiam acerbiùs obiurgent.

## VACVANTIBVS.

Venæ sectio fiat protinus ab initio, modò vires consent: in mora enim periculū est: vix enim aliud salubrius atque magis præsens remediū est huic malo destinatū: in mitioribus autē morbis priùs alius eluenda arte est: secabimus autem primò venam humeralem: hinc cephalicam aut medianam, si prior non appareat. tādē vbi materia iam fluxa est, etiam in fronte venam secabimus: idque vt rectè fiat, constringemus collū artificiosè aliqua fascia, vt vena attollatur.

Clysteres primò clementiores ex decocto maluarum, betæ violarum, lactucæ hordei, seminum cucumeris, cucurbitæ, cassia fistula, electuario de succo rosarum, diapruno solutiuo, diacatholicone, hiera picra: oleo violarum, melle rosate.

Electuarium Indū, de succo rosarū, electuariū rosatum.

Diaprunum solutiuum. Syrupus rosarum laxatiuus.

Pillulæ aggregatiuæ, aureæ. Trochisci de rhabarbaro.

Cassia recēter extracta. Manna, myrobalani, rhabarbarum in aqua endiuie infundatur.

H iij



**Succus lactuæ, rosarum, plantaginis, nymphææ, cucurbitæ.**

**Odoramentum ex aqua plantaginis, rosarum, semperuiui, acetosæ, camphora, floribus rosarum, nymphææ; pane aliquo torrefacto.**

**Vnguentum populeonis non ita pridem factum.**

Mox ab initio hisce uti licebit medicamentis absque ullis resoluentibus, quæ versus incrementum, statum atque declinationem permiscemus secundum plus & minus, prout ratio scilicet dictabit. uti autem in augmento repellentia debent superare resoluentia; sic in declinatione resoluentia debent superare repellentia; in statu autem par sit pondus utriusque, unde serio vitandus est continuus horum usus; materias enim inctassant, resoluique prohibent. unde ex continuo eorum usu lethargia accersiri potest; quare versus statum omnino à repellentibus abstinemus, cum tunc maxime expediat apertionem meatuum, humorumque discussionem procurare.

*CORROBORANTIBUS, resoluentibusque morbi reliquias.*

**Diamargaritum frigidum, castoreum.**

**Syr. granatorum, rosarum, cum aqua rosarum, buglossæ, plantaginis; detur postquam alimentum sumperit; sic enim ad caput eorum vis melius transfertur.**

**Conserua rosarum, violarum, florum nymphææ, buglossæ.**

**Irrigatio fiet capitis ex violis, rosis, floribus nymphææ, lactuca, papauere, camomilla, meliloto, althæa.**

**Balneum aquæ dulcis tepidum conuenit.**

**Pulmo arietis, aut eiusdem hepar, aut catulus, capo, gallina, elur, uſve, aliave huiusmodi animalia exenterata, per medium spinæ secabuntur, sicque adhuc calentia capiti admouebuntur magno cum cerebri commodo.**

H. iiii

Sanguifugæ fronti temporibusque admoueantur.

Vt felicius autem localia medicamenta hîc præscripta capiti accommodari possint, meliusque excrementa exhalare valeant, radendum caput phreneticorum erit remissionis tempore, & aliquandiu post cibum sumptum.

CORRIGENTIBVS *accidentia.*

Philonium Romanum, philonium Mesuæ, cum aqua lactuæ aut syr. papaveris, potenter somnum inducit.

Syr. violatus, papaverinus, cum aqua lactuæ.

Iuscula in quibus semina frigida maiora aut caput vnum papaveris albi coquantur aut folia lactuæ.

Succus violarum, papaveris.

Vnguentum populeonis, rosaceum, ex oleo violarum, nenupharis, papaveris, mandragoræ, feminibus hyoscyami, croco, opio, aceto.

Lotio fiat capitis, faciei, manuum atque pedum, in aqua in qua decocta sint folia lactuæ, violarum, flores rosarum, nymphææ, semina papaveris albi, cucumeris, cucurbitæ, melonum.

Odoramentum fiat cum spongia prædicto decocto imbuta.

Fomentatio pubis perineique fiet cum decoctione parietariæ, radicum asari, petroselini in vino.

Cataplasma quoque fiet ex parietaria cocta cum vini parte aliqua, addito oleo scorpionum, pubi perineoque admouebimus.

Vnguentum ex oleo fiat scorpionum, vnguentoque Agrippæ, iis pubis regio illinetur.

Syr. violarum.

Decoctum hordei.

Aqua communis, cui syr. de succo ribes, aut syrupum de succo citri addemus.

Pro-

Prouocantibus somnum plurimum hîc egemus, eò quòd continuis quasi vigiliis æger conficiatur. Ne autem calor qui superest debilis, extinguatur, calida admiscebimus opiatis; periculum enim est ne lethargus accersatur ex immodico eorum usu. Contingit quoque urinam frequenter supprimi in hoc malo. huicque malo medebimur sequenti ordine locatis. Postremo autem loco positis, sitim immodicam mitigabimus.

**THEORICA ET EMPIRICA MEDICAMENTA nobilia in PHRENITIDE, sæpius cum summa salute plurimorum agrotorum à Gualtero Bruel experta.**

**CVRATIO PHRENITIDIS.**

℞ quatuor seminum frigidorum minorum, seminis papaueris albi ana ʒ iiij. coquantur in aqua q.s. Vnciis tribus huius decocti adde syr. de papauere ʒ j. β. acetî boni parum; fiat *Serapium*; detur manè & tempore somni.

℞ foliorum lactucæ, maluarum, violarum, betæ, boraginis ana m. j. hordei, capitum papaueris sine semine ana ʒ j. seminum cucumeris, cucurbitæ ana ʒ β. fiat decoctio in aqua q.s. ad lb j. colaturæ addantur olei violacei ʒ iiij. cassiæ recenter extractæ, diacatho. ana ʒ j. salis ʒ j. fiat *Clystere*.

℞ syrupi granatorum, violarum, acetosi simplicis ana ʒ ij. sumat ʒ ij. cum decocto hordei, violarum, prunorum, glycyrrhizæ, seminum lactucæ, cucurbitæ; quib. quoque aquæ rosacæ aut buglossæ nonnihil permisceri poterit in eundem finem, necnon syrupus papauerum, ut somnum conciliemus.

℞ cassiæ recenter extractæ ʒ j. syr. rosarum solutiui ʒ



turnior, qui prouocandus omnino erit, tum sumptis-  
tum admotis medicamentis.

Excrementa alui arte, si non reddantur natura, prouo-  
canda sunt, aluum enim necessum est habeat humi-  
dam.

Amicorum admittatur præsentia, ignotorum verò, qui-  
quibusque iratus est, ingressus prohibeatur,

#### PRÆPARANTIBVS.

Syrupus violarum, fumariz, nenupharinus.

Acetosus simplex.

Syrupus buglossæ, boraginis.

Syrupus de cichoreo cum rhabarbaro.

Aquæ violarum, lupulorum, buglossæ, nymphææ, ci-  
chorei, endiuiz, acetosæ.

#### VACVANTIBVS.

Venæ sectio fiat si ex abundantia feruentis sanguinis  
infantia excitetur, & quidem copiose tunc educatur.  
Primò autem saphenæ sectio fiet, sequenti autem die  
secabitur mediana humeraria. Postea secabimus e-  
tiam venam in fronte, si malum non leuetur. Ne-  
quaquam autem vena secabitur, si malum hoc à  
cholera fiat adusta absque sanguinis plenitudine,  
cùm sanguis sit frenum cholerae.

Syrupus de multiplici infusione rosarum.

Confectio hamech, diacatholicum.

Diasena Nicolai, hiera logodii.

Hiera picra, hiera diacolocynthidos.

Pillulæ Inde, de lapide Armeno.

Potus ex violis, cichoreo, fumariz, intubo, buglossæ,  
chamedri, floribus nymphææ, seminibus frigidis ma-  
ioribus, fumariz, glycyrriza, vuis passis, epithymo,  
manna, cassia, polypodio, sena, myrobalanis citrinis.

Clystere ex foliis violarum, lactucæ, althææ, maluarum,  
seminibus frigidis maioribus, oleo violarum.

#### AVERTENTIBVS.

Venæ saphenæ sectio fiet primò, uti prædictum est.

Hirudines sincipiti aliisque partibus capitis per am-  
bitum admocebimus. Hæ-

Hæmorrhoides aperiantur.

Menses ut fluant, procuretur.

REPELLENTIBVS.

Irrigatio capitis fiet cum rosaceo, succo polygonij, aceto; quæ sincipiti cum linteolo apponentur, frequentiusque mutabuntur.

Fomentatio capitis fiet cum decocto florum stæchados, camomillæ, violarum, rosarum, foliis lactucæ, capitibus papaueris albi; aceto addito.

ROBORANTIBVS *cerebrum, intemperientemque emendantibus.*

Diamargaritum frigium, electuarium de gemmis diarhodum abbatis.

Diatrion sandali, manus Christi.

Conserua rosarum, buglossæ, nymphææ, adianthi, boraginis, violarum.

Epithema pro hepate ex aqua intubi, rosarum, acetosæ, seminibus portulacæ, camphora, spica nardi.

Epithema pro corde ex aqua buglossæ, rosarum, nymphææ, aceto, trochiscis de camphora, diamargarito frigido.

Balneum ex aqua in qua decoquantur flores camomillæ, meliloti, violarum, folia lactucæ, salicis, nymphææ, maluæ, buglossæ, quo caput quoque irrigabitur quamdiu balneo insidebit.

Vnguentum pro spinali medulla, atque pectore ex oleo nymphææ, amygdalarum dulcium, rosarum, violarum, eo post exitum balnei utetur.

Cauteria coronali commissuræ applicentur.

PROVOCANTIBVS *somnum.*

Diarhodum cum syrupo nymphææ.

Embrocatio capitis ex seminibus papaueris, floribus nymphææ, rosarum, violarum lactucæ.

Vnguentum pro temporibus atque fronte ex oleo violarum, mandragoræ, mulieris lacte.

**THEORICA ET EMPIRICA MEDICAMENTA nobilia in MANIA, sæpius cum summa salute plurimorum egrotorum à Gualtero Bruel experta.**

**CVRATIO MANIAE.**

℞ foliorum maluæ, lactuæ, violarum, florum violarum, boraginis, endiuæ, ana m. j. horde. ʒ j. coquantur in iusculo carniū q. s. ad ℥ j. β. colaturæ addantur hieræ picrę simplicis ʒ ij. β. cassiæ recenter extractæ ʒ j. olei violarum ʒ iiij. fiat *Clystere* emolliens.

℞ syr. endiuę, acetosi simplicis, violarum, buglossæ ana ʒ j. syrupi fumar. æ ʒ β. aquarum endiuę, buglossę, violarum, boraginis ana ʒ iiij. fiat *Iuleb*; dentur ʒ iiij. in aurora.

℞ radicis buglossæ ʒ j. β. foliorum intubi, cichorei, fumarie, lupulorum ana m. j. β. florum boraginis, buglossæ, violarum ana m. j. seminum melonum, cucumeris, cucurbitæ, ana ʒ ij. β. senæ Alexandrinæ, polypodij quercini ana ʒ j. epithymi ʒ β. rhabarbari ʒ j. β. glycyrrhizæ rasæ ʒ iiij. vuarum passarum enucleatarum ʒ j. tamarindorum ʒ β. coquantur in aqua q. s. ad ℥ j. β. colaturæ adde diasenæ ʒ vj. cassiæ recenter extractæ ʒ j. syr. rosarum solutiui ʒ ij. fiat *Potio*, sumet ʒ iiij. in aurora per quinque vel sex dies.

℞ confectionis hamech ʒ ij. β. electuarij de succo rosarum ʒ ij. diacatholici ʒ iiij. syrupi violarum ʒ j. aquæ violarum, buglossę ana ʒ j. β. fiat *Haustus*, detur hora quinta manè.

℞ pillularum de lapide lazuli, Armeno, indarum ana ʒ j. cum syrupo de epithymo q. s. formentur *Pillule* septem vel octo, sumantur post primum somnum.

℞ diarhod. abbatis sine moscho ʒ iiij. sp. diatrion sandali ʒ j. β. sacchari rosacei, syrupi violarum ana ʒ j. β. fiat *Electuarium* molle, aut

℞ sp.



℞ sp. diamargariti frigidi 3 ij. conseruæ violarum, buglossæ ana 3 vj. conseruæ rosarum 3 sem. lohoch de papauere 3 iiij. sem. syr. violarum, pomorum ana 3 j. misceantur, fiat *Electuarium* molle: detur duabus vel tribus horis ante prandium & cœnam & se.

℞ olei violarum, rosarum ana & j. olei amygdalarum dulcium, nenupharini ana & se. eo caput à principio mali vngatur, hinc spinalis medulla & pectus post exitum balnei.

℞ aquæ buglossæ, rosarum, nymphææ ana & v. aceti & se. sp. diatrion sandali, diatrag. frigidi ana 3 ii j. croci 3 se. fiat pro cordis regione *Epithema*, quo cor bis in die refocilletur ante cibum.

℞ foliorum violarum, lactucæ, nymphææ, maluæ ana m. ij. foliorum salicis, vitis, florum camomillæ, meliloti ana m. ij. coquantur in aqua q. s. pro *Balneo*, cui post purgationem æger committetur; sit autem calidum modicè, plurimum equidem confert. Caput etiam eo potest irrigari rasum, vteturq. eo ante cibum, post exitum autem ita lecto committatur vt non sudet.

℞ folia lactucæ, violarum, salicis, florum nenupharini, rosarum ana m. j. se. florum camomillæ p. j. seminum lactucæ & se. papaueris albi 3 j. se. capita veruecum numero duo, fiat *Embrocha*, quo quater vel quinies in die vtetur.

℞ Syrupi violarum, paupauerini, diacodij ana & sem. aquæ lactucæ, succi ptisanæ ana & ij. fiat *Potus* pro somno, detur hora somni.

℞ olei violarum, mandragoræ, ana 3 iiij. cum peplo temporibus atque fronti admoveantur.

℞ olei amygdalarum dulcium, camomelini ana 3 j. se. olei violarum & ij. fiat *Vnguentum* pro capite; quo post principium vbi materia resoluenda est, vti poterimus. In eundem quoque finem catuli aut pulli per medium dissecentur, aut pulmo arietis adhuc calens capiti accommodetur; roborant enim hæc cerebrum, vaporesque relictos resoluunt suo temperato calore, & humectant

H

## APPENDIX

ad prædicta pro curatione MANIAE seu  
furoris inferuens.

*Omniū primò alius subducatur clysterio: Demum vena secatur cum cautela prædicta. Humores hinc peccantes naturæ obediētes reddantur, necnon purgentur. Interea quoque temporis humores auertemus iis quæ hæmorrhoides aut menses prouocant; id quod etiam fieri potest sectione ipsius saphenæ. Demum ea quæ cerebrum necnon corroborare possunt offerantur & quæ materiam reliquam dissipare possunt. Quæ omnia nunc, anteaquæ dictis medicamentis felicissimo cum successu consequi poterimus, modò vniuersalia particularibus debita ratione adhib. antur. Cauterio quoque actuali aut potenciali locus erit, dum prædictis non cedit remediis; anteriori autem parti capitis apponemus, ubi commissura est coronalis cum sagittali. Imprimemus autem ita altè, donec ossis denudationem consecuti fuerimus, de quo portiunculam etiam auferemus, sicque apertum quasi per mensem seruabimus, hoc enim medicamento ma um tandem superare solemus. In eo autem differt cura mania à melancho ia, quòd in mania debeat esse maior intentio remittendi acrimoniam humoris, quod humectantibus, modicèque sit refrigerantibus.*



## Methodus pro Cognitione

PHRENITIDIS IN-  
SERVIENS.

**P**HRENITIS vera, est cerebri aut membranarum eius inflammatio febrem acutam, delirium mentis-que alienationem inducens. Infantiæ genus admodum horrendum periculosumque, cum in ea parte genere- tur morbus in qua princeps animæ facultas residet. Cum autem magna ex parte phrenitis vera è non vera oriatur, ideo de hac etiam hic tractabimus. Est itaque  
phrenitis

phrenitis non vera, mentis alienatio, cum inquietudine sine cerebri apostemate. Sequitur autem febrem sanguineam aut biliosam. Deliria autem non sunt hic ita notabilia, nec perpetuò affligunt, augentur equidem & minuuntur, prout febris intenditur vel minuitur. Potissimum autem fit hora crisis, quam interdum præuenit, vnaque cum morbo incrementum sumit, & hac quoque ratione vehementior erit hora & die exacerbationis quam quietis, in istis enim febribus contingit vapores aridos ad arcem cerebri ascendere, vnde spiritus animales perturbantur haud leuiter. Sequitur etiam subinde apostemata & abscessus, ex quibus graues febres oriuntur. non itaque morbus, sed morbi alterius est symptoma. Frequentius autem multò quam vera phrenitis accidit, hæc enim rarius.

**PARS AFFECTA**, est cerebri pia aut dura mater, id quod constat ex læsione functionum inde prodeuntium; sæpius autem fit in hac, tuncque minus est perniciofa. Laborat autem semper propria primariaque affectione, & æger continuò molestat, estque phrenitis vera, morbus in compositione, in magnitudine equidem peccat, & in intemperie, calida nimirum.

**SIGNA**. Febris adest continua atque arida, vigiliæque fiunt molestæ, & somnus difficilis, vnde plurimum turbantur, e lecto que subito interrupta quiete exiliunt, spiratio fit ex interuallis, seu rara & magna, oculis rubedo, squalidâq. siccitas molitâq. mobilitas accidit; ex altero tamen oculo sæpe etiam fluit lacryma acris, oculorum venæ sanguine turgēt, pulsus frequens, celer & magnus est. Adest deliriū mentisque alienatio, ita vt nihil respondeant quod ad prudentiam attinet interrogati, imò propter abolitā memoriā, non sunt memores eorū quæ dicunt aut faciunt, vnde verba nullo ordine sensûque proferunt, & varia imaginatur, modò plorant, modò cantant, aliàs vociferantur, aliàs quoque ferociter in omnem audaciam proclines fiunt, variaque nugantur. Lingua fit quasi aspera, squalida atq. nigra, admodum



fitiunt, floccos & festucas digitis colligunt, manus tremunt, altè spirant; vrina tenuis flammaeque est, aliquando quoque alba est & tenuis, estque maioris pernicietis nota.

**CAUSA.** Magna ex parte ex sanguine exuperante originem habet, & hi saepe cum risu insaniunt, delirant minus, nec ita febricitant. Dum verò à bile adusta & effe-  
rata fit, tunc admodum immaniter insaniunt, & necessum est illos subinde vinculis cohibere; fortissimos enim motus edunt phrenitici, quod contingit propter siccitatem. Maxima comitatur febris quoque.

**PROGNOSTICA.** Acutissimus periculosissimisque est affectus, breuique hominem occidit, nisi succurratur. vniuersum enim phrenitidis genus est exitiale, eò quòd in loco in quo princeps animae pars residet, generetur. Interim desipientiae quae cum risu fiunt, minus periculosa: quae verò cum studio, periculosiores sunt: omnium autem grauissima censetur, quae ex adusta bile generatur. Vbi desipientiam somnus sedat, bonum: si non, malum. Continua autem vigilia atque dementia mortiferum.



### *Methodus pro Curatione*

## PHRENITIDIS INSER- VIENS.

*Perficitur autem subsequentibus remediorum generibus.*

### VICTVS RATIONE.

**A** Er temperatus concilietur & luminosus mediocriter, variaeque picturarum absit.

**Cibus.** ea quae humectare refrigerareque corpus possunt praescribantur, ut est prisanæ cremor. Moderatus autem admodum debet esse alimentorum usus; uti enim

enim immodica copia malum auget, sic inedia nimia vires plurimum prostermit. Olera fiant è lactuca, malua, intubo. Versus declinationem morbi offerri poterunt pisces saxatiles, squamosique.

Potus sit aqua hordei in principio: cui vtile erit addere aliquid syrupi violacei, nymphææ, rosacci. Subinde quoque decoctum cinnamomi imperabitur.

Motus inordinatus vitandus, pbtiusque quies imperanda. Frictiones tamen partium infernarum fiant eo potissimum tempore quo symptomata magis erunt propitia.

Somnus conciliandus est tum localibus, tum sumptis medicamentis.

Excreméta alui mouéda: detenta enim morbū augent.

Animi perturbationes hinc plurimum incommodant: quare gratissimi amici aduocandi, qui aliàs blandè illum conueniant, subinde etiam acerbius obiurgent.

## VACVANTIBVS.

Venæ sectio fiat protinus ab initio, modò vires consent: in mora enim periculū est: vix enim aliud salubrius atque magis præsens remediū est huic malo destinatū: in mitioribus autē morbis prius aluus eluenda arte est: secabimus autem primò venam humeralem: hinc cephalicam aut medianam, si prior non appareat. eadē vbi materia iam fluxa est, etiam in fronte venam secabimus. idque vt rectè fiat, constringemus collū artificiosè aliqua fascia, vt vena attollatur.

Clysteres primò clementiores ex decocto maluarum, betæ violarum, lactucæ hordei, seminum cucumeris, cucurbitæ, cassia fistula, electuario de succo rosarum, diapruno solutiuo, diacatholicone, hiera picra: oleo violarum, melle rosato.

Electuarium Indū, de succo rosarū, electuariū rosatum.

Diaprunum solutiuum. Syrupus rosarum laxatiuus.

Pillulæ aggregatiuæ, aureæ. Trochisci de rhabarbaro.

Cassia recenter extracta. Manna, myrobalani, rhabarbarum in aqua endiuia infundatur.

H iij

Succus lactuæ, rosarum, plantaginis, nymphææ, cucurbitæ.

Odoramentum ex aqua plantaginis, rosarum, semperuiui, acetosæ, camphora, floribus rosarum, nymphææ; pane aliquantulum torrefacto.

Vnguentum populeonis non ita pridem factum.

Mox ab initio hisce uti licebit medicamentis absque ullis resoluventibus, quæ versus incrementum, statum atque declinationem permiscemus secundum plus & minus, prout ratio scilicet dictabit. uti autem in augmento repellentia debent superare resoluventia; sic in declinatione resoluventia debent superare repellentia; in statu autem par sit pondus utriusque, unde serio vitandus est continuus horum usus; materias enim incrassant, resoluque prohibent. unde ex continuo eorum usu lethargia accersiri potest; quare versus statum omnino à repellentibus abstinemus, cum tunc maxime expediat apertionem meatuum, humorumque discussionem procurare.

*CORROBORANTIBVS, resoluventibusque morbi reliquias.*

Diamargaritum frigidum, castoreum.

Syr. granatorum, rosarum, cum aqua rosarum, buglossæ, plantaginis: detur postquam alimentum sumperit; sic enim ad caput eorum vis melius transfertur.

Conserua rosarum, violarum, florum nymphææ, buglossæ.

Irrigatio fiet capitis ex violis, rosis, floribus nymphææ, lactuca, papauere, camomilla, meliloto, althæa.

Balneum aquæ dulcis tepidum conuenit.

Pulmo arietis, aut eiusdem hepar, aut catulus, capo, gallina, elurive, aliave huiusmodi animalia exenterata, per medium spinæ secabuntur, sicque adhuc calientia capiti admouebuntur magno cum cerebri commodo.

H *iiij*



Prouocantibus somnum plurimum hîc egemus, eò quòd continuis quasi vigiliis æger conficiatur. Ne autem calor qui superest debilis, extinguatur, calida admiscebimus opiatîs; periculum enim est ne lethargus accersatur ex immodico eorum usu. Contingit quoque urinam frequenter supprimi in hoc malo. huicque malo medebimur sequenti ordine locatis. Postremo autem loco positîs, sitim immodicam mitigabimus.

**THEORICA ET EMPIRICA MEDICAMENTA nobilia in PHRENITIDE, sæpius cum summa salute plurimorum egrotorum à Gualtero Bruel experta.**

**CVRATIO PHRENITIDIS.**

℞ quatuor seminum frigidorum minorum, seminis papaueris albi ana ʒ iiij. coquantur in aqua q.s. Vnicuius tribus huius decocti adde syr. de papauere ʒ j. β. acetî boni parum; fiat *Serapium*; detur manè & tempore somni.

℞ foliorum lactuæ, maluarum, violarum, betæ, boraginîs ana m.j. hordei, capitum papaueris sine semine ana ʒ j. seminum cucumeris, cucurbitæ ana ʒ β. fiat decoctio in aqua q.s. ad lb j. colaturæ addantur olei violacei ʒ iiij. cassiæ recenter extractæ, diacatho. ana ʒ j. salis ʒ j. fiat *Clystere*.

℞ syrupi granatorum, violarum, acetosi simplicis ana ʒ ij. sumat ʒ ij. cum decocto hordei, violarum, prunorum, glycyrrhiæ, seminum lactuæ, cucurbitæ; quib. quoque aquæ rosaceæ aut buglossæ nonnihil permisceri poterit in eundem finem, necnon syrupus papauerum, vt somnum conciliemus.

℞ cassiæ recenter extractæ ʒ j. syr. rosarum solutiui ʒ

℞. aquarum buglossæ, boraginis, violarum ana ʒ j. fiat *Haustus*: detur sequenti die in aurora.

℞. rad. graminis ʒ j. florum cordialium ana p. j. foliorum acetosæ, endiuæ ana m. j. ʒ. violarum m. j. seminum cucurbitæ, melonum ana ʒ j. ʒ. vuarum passarum ʒ j. polypodij quercini ʒ ʒ. rhabarbari electi ʒ ij. tamarindorum ʒ iij. coquantur in aqua q. s. ad lb j. colature adde syr. de multiplici infusione rosarum ʒ iij. fiat *Potio*.

℞. electuarii de succo rosarum ʒ ij. diacatho. ʒ ij. syrupi violarum, de multiplici infusione rosarum ana ʒ ʒ. decocti hordei ʒ iij. fiat *Haustus*.

℞. hieræ pictæ ʒ j. diagrid gr. v j. salis gemmæ ʒ ʒ. mellis per coctionem concreti; fiat *Suppositorium*.

℞. conferuæ rosarum, violarum ana ʒ v. conferuæ buglossæ, nymphææ, diarragacanthi frigidi ana ʒ ʒ. diamar-gariti frigidi ʒ j. seminis acetosæ, porulacæ ana ʒ j. syr. violarum q. s. ad *Electuarij* mollis consistentiam; aliquoties in die accipiat diagma.

℞. aquæ buglossæ, rosarum, violarum ana ʒ v. diarrion sandali ʒ j ʒ. aceti & croci parum; fiat *Epithema*; quo calente cor irrigetur.

℞. florum violarum m. ʒ. rosarum m. j. ʒ. foliorum lactucæ m. ij. ʒ. seminis papaueris albi, lactucæ ana ʒ iij. coquantur in sufficiente quantitate aquæ ad tertias, sub finem parum adde aceti, fiat *Embroca*; quo calente parum coronalis commissura irrigetur tonsis capillis.

℞. olei rosacei ʒ j. aquæ rosacæ ʒ iij. aceti ʒ ʒ. misceantur, fronti que panno lineo illis imbuto applicetur.

℞. syr. violarum, nenupharini ana ʒ j. ʒ. papauerini ʒ j. decocti violarum, capitum papaueris albi vncias novem; fiat *Uleus*: detur tempore somni, eundem vt conciliet. In eundem finem gallinæ iusculum paratur cum foliis lactucæ, capite vno vel altero papaueris albi. Aut fiat decoctum ex rosis, violis, foliis absinthii, capite vno papa-

papaveris, opii gr. j. sumanturque huius decocti ℥. iij. cum iusculo caponis. Item,

℞ hordei mundati m. iij. seminum cucumeris ℥. iij. papaveris 3 j. ss. foliorum lactucę m. ij. coquantur in aqua q. s. ad tertię partis consumptionem. In eundem finem lotio fiat faciei atque pedum ex decocto capitem papaveris albi, foliorum violarum, nenupharis, hordei excorticati, radic. mandragorę. Odoramentum quoque fiat ex dicto decocto.

℞ olei rosacei ℥. iij. aceti 3 j. opii gr. ij. fiat *Mixtura*, quę fronti temporibusque applicetur modicę calens. Item inungatur cum capite lactis. quod bullitione extractum fuerit, ipsum caput rasum, aut sequenti vnguento.

℞ vnguenti rosacei, populeonis ana 3 j. olei nenupharini, mandragorę ana 3 ss. aceti 3 j. fronti applicetur & temporibus. Si somnus his non concilietur, ad prædictis opii gr. iij. vel iij. croci gr. v. omnia diligentissime commisceantur; fiat *Vnguentum* pro anteriori parte capitis temporibusque.

℞ foliorum lactucę m. ij. florum rosarum m. j. seminum papaveris albi 3 j. ss. coquantur in aqua q. s. ad mollitudinem, addendo farine tritici 3 vj. olei violarum q. s. fiat *Cataplasma* pro fronte.

℞ olei violacei 3 j. nymphę 3 ss. camomillę, papaverum ana 3 iij. aceti guttas aliquot, cerę q. s. fiat *Vnguentum*, quo præstat vti loco prædicti vnguenti, eò quod admodum sit forte, repellit hoc, somnūque conciliat.

℞ betonicę, fœniculi, maluę ana m. j. ss. florum camomillę, meliloti, sambuci ana m. j. seminum lini, fœniculi, fœnugręci ana 3 ss. coquantur in aqua q. s. ad tertię partis consumptionem, fiat pro capite *Fotus*; versus declinationem enim mali reliquias resoluit. In eundem finem catuli vnius mensis per medium dorsum secti, aut pulli columbini viui, pulmonē que calentes arietis aut pecoris, commissurę coronali applicentur



actu calentes donec refrigescant; postquam refrixerint, ponantur in decocto calente camomillæ, rosarum; & iterum applicentur vti prius, idque multis vicibus repetatur.

R<sup>x</sup> oxymellis squillitici, syr. de duabus rad. ana ʒ ij. gummi prunorum ʒ ij. decocti fructuum alkekengi, rad. petroselinæ, saxifragiæ lb j. fiat Potus ad prouocandum urinam. eoque in fine augmenti potius vti poterimus quam in principio, cum obsint calefactionia.

## APPENDIX

### ad prædicta pro curatione PHRENITIDIS inseruiens.

Cum vix quicquam in hoc malo medicamentis præstare liceat, si apostema absoluitur; omnium primò, ne inuadantur sumat, sanguinem, ut prædictum est, mittemus, si nihil obstiterit; cum nullum eo sit magis præsens remedium. Primò tamen alius subducatur clysterio leniente. Eodem quoque tempore humores, sanguinemque ad caput ruentem, repellentibus medicamentis arcebitur; cucurbitulas verò cum scarificatione si aliquam ob causam venæ sectio prætermissa fuerit (aliàs fiet sine scarificatione) admouebimus partibus capiti subiectis, vicinisque, ut humoris impetus ad caput sistat. Demum ut sanguinis feruor nonnihil temperetur (facile enim in bilem hic solet mutari) serapium conueniens, quod somnum etiam allicere eadem opera possit, propinetur. Deinde purgantibus medicamentis humores acres e corpore educemus. Postea frictionibus partiumque extremarum ligaturis, necnon lotionibus, eosdem quoque humores à capite auertemus. Cerebrum deinde roborabimus. Quæ omnia nunc anteaque dictis medicamentis felicissimo cum successu consequi poterimus, si vniuersalia particularibus debita ratione adhibeantur. Sitim interim quoque sedare debemus, cum plurimùm molesta hic esse soleat: in quem finem detur ʒ j. succi ribes cum decocto conuenienti. Somnum quoque aptis medicamentis conciliabimus: urinamque, si necessum est, prouocabimus.

*mus. Semper quoque hîc omnibus medicamentis quæ intrò sumuntur ea admiscebimus : quæ ut morbum , sic etiam partem affectam respiciant.*



*Methodus pro Cognitione*

CATARRACTÆ SEV SUFFUSIONIS INSERVIENS.

**S**UFFUSIO est vbi visio paulatim hebescit, propter humorem lentum & glaciei modo concretum, quî iuxta foramen pupillæ, vel inter crystallinum humorem & rhagoidem tunicam obhæret, prohibens transitum specierum rerum obiectarum, eaque ratione visum impediens. Contingit autem cum humorem eò deferri per opticum neruum è cerebro, sæpè ita lentè ut animaduerti non possit in initio. Aliquando etiam repente paucissimisque fit diebus; eò autem humore circa pupillam obhærente, externæ rerum species impediuntur, ne crystallino humori præcipuo videndi instrumento communicari possint, diciturque hoc malum in principio imaginatio, in augmento nebula, eò quod nubes videatur tandem apparere.

**PARS AFFECTA** est oculus ipse, qui circa pupillam potissimum afficitur. Proprio autem vitio id aliquando contingit, tunc neque simul incipit, neque eodem modo vterque afficitur; subinde enim alterum tantum occupat oculum. Præterea continuo hîc suffusionis symptomata percipiuntur. Si verò propter consensum oris ventriculi fiat, tunc visa vtrique oculo simul & similiter apparent, tunc neque obscuritas, neque concretus observabitur humor: tunc autem potissimum hoc accidit, cum ventriculi concoctio bona non fuerit. Rursus à stomacho provenire indicat alleviatio post vomitum: id quod sæpè fit tempore crisis, cum

tunc natura sæpe id quod noxium est, oculumque perturbat, hac ratione expellat, dum stomachi vitium in causa fuerit: huiusmodi autem symptomata perpetuò non apparent; si enim concoctio stomachi bona fuerit, nulla symptomata tunc oculum molestabunt, à stomacho enim dum prouenit, intenditur, remittitur, vel omninò intermittitur, prout stomachus bene vel malè concoquit, neque vnquam in pupilla tenebrosi quicquam obseruatur per plures etiam menses. Est autem morbus in compositione seu numero, cum aliquid de toto genere præternaturam succrescat.

**SIGNA.** In mali huius exordio, solummodò quidam spiritus atque fumi, aliàs etiam muscæ vel culices, necnon caliginosa quædam corpuscula, subinde etiam lucentia, oculis obuersari videntur. Incerto autem videntur motu huc atque illuc agi. Aliis verò aranearum telæ, aliàs verò lanarum filamenta oculis obici videntur. nonnunquam circuli circa lucernas apparent, aliaque huiusmodi simulachra non consueta oculis offunduntur: visus autem paulatim hebescit, prout ipse vapor tenuis, humorque incrassescit & congelatur, tuncque quasi nubeculæ videntur oculis obuersari. Omnium postremò, ex maiori congelatione in panniculum vertitur, tuncque pupilla turbida esse incipit & tenebrosa, temporeque color ipsius maris in oculo apparet, & eousque progreditur tandem malum, donec æger amplius non videat, cum scilicet totum pupillæ foramen occludit, lumen interim animaduertit adhuc. Si autem minima eius humoris quantitas pupillæ obiciatur, ita vt circumstantes partes puræ sint, foraminulentum videtur corpus obiectum esse. Tandem malo progrediente, pupilla vix lumen transmittit, & ad albedinem mutatur; hinc aliquibus cæruleus fit oculi color, aliis verò glaucescit. Hoc vitium alterum sæpe occupat oculum, & postquam semel radices egit, continuò immoratur.

**CAUSA** Frigidi crassique humores in opticum neruum incidentes, vel inter humorem crystallinum  
rhagio.



rhagoidémve tunicam concrecentes, hoc malum efficiunt dum pupillæ foramen obstruunt; unde externarum rerum simulachra quæ ad videndi facultatem importari debent, ratione obstructionis impediuntur, ne crystallino humori, qui præcipuum est instrumentum vilus, communicari possint.

**PROGNOSTICA.** Inter leuiores suffusiones ea deterior est, quæ grauioribus morbis, ex magnisque capitis doloribus orta est: poteritque in principio hoc malum curari; verum si diu constiterit, suffusioque glaucescat, oculus visu priuabitur. ferè autem, quæ sine splendore est suffusio, & quæ ad candorem vergit, curam non recipit. Rursus si luida, nigra, vel multum flaua est suffusio, neque medicina, neque acu curari poterit; sic nec ea quæ nihil concrecentis materie intuentibus exhibet, sed oculi videntur clari atque sereni, & tamen nihilominus nihil vident, diciturque gutta serena, tunc nihil quoque in suffusione medicamentis proficiemus, quæ pupillæ figuram commutauit. Si humor panniculi consistentiam fuerit consecutus, non nisi acu per corneam transmissa curari poterit, necessumque est ut humor concretionem firmitudinem consecutus sit; nisi enim acui subiici possit, anceps esse solet cura: in quintum autem usque annum acui inidoneum esse solet concretum; vetustatem autem si sapiat, curam non admittit. Si autem id quod accrescit, perfrictum diducitur, neque sic manet, sed iterum rediens iungitur, coloremque exhibet obscure album, curam admittere videtur.



*Methodus pro curatione*

## SVFFVSIONIS INSER- VIENS.

*Perficitur autem subsequenter remedium generibus.*

### VICTVS RATIONE.

**A** Er sit calidus atque siccus.  
Cibus. Conueniunt carnes gallinarum, caponum, pullorum, auicularum montanarum. Consultò abstinat ab iis quæ corpus nimium humectare possunt. Inter olera; fœniculum, betonica, saluia, serpyllum, maiorana pulegiumque conueniunt. Potus sit decoctum cinnamomi, aqua mulsa: vinum verò inhibendum est. Exercitium sit moderatum, infernarumque partium frictiones frequenter instituantur. Somnus sit breuior consueti tempore. Excrementa alui quotidie respondeant. Animi perturbationes, vt mœstitia, alii que huiusmodi immodici affectus animi vitentur, gaudiumque amplectatur.

### PRÆPARANTIBVS.

Oxymel simplex.  
Mel rosatum.  
Syrupi stœchados.  
Syr. de hyssopo.  
Aqua fœniculi, betonicæ, euphrasiæ, hyssopi, maioranæ.

### VACVANTIBVS.

Venæ sectio fiat cephalicæ eiusdem lateris in mali principio, modò plethoricum sit corpus; alioqui admittenda non erit, cum hinc cerebrum magis refrigerari

gerari contingat, eaque ratione maior excrementorum copia generari possit.

Pillulae.

Aureae, cocciae.

De agarico.

Lucis maiores.

Affiaieret, mastichinae.

Sine quibus esse nolo.

Hierapicra.

Agaricus trochiscatus.

Sæpius autem purgandus quoque hic est æger ab aquosa materia quæ hoc malum fouere solet.

#### AVERTENTIBVS.

Vena sectio in fronte, missioque fiat sanguinis e naribus.

Clystere ex radicibus fœniculi, floribus stœchados, camomillæ, meliloti, centaureæ minoris, betonicæ, seminibus anisi, fœniculi, colocynthide, diacatholicone, hiera Galeni, hiera diacolocynthidos, oleo camomillæ, liliorum,

Sapo aut sanguisugæ post aures applicentur, aut eorundem loco cauterium fiat.

Frictiones atque frotus ex aqua calente partium extremarum, earundemque ligaturæ dolorificæ.

Apophlegmatismi.

Masticatoria e cubebis, semine fœniculi, mastiche, pyrethro.

Cucurbitulae cum scarificatione occipitio sunt affigendæ.

Sternutatoria medicamenta.

Seto ceruici affigetur magno cum commodo.

Cauterium ex cantharidibus, fermento, stercore columbino post aures, aut in commissura coronali potius fiet quam in occipitio, eo quod maior sit consensus cum oculis; per plures autem menses fluere permittatur humor.



CONFORTANTIBVS, discutientibúsque  
reliquias.

Collyrium ex aqua euphragiæ, chelidoniæ, fœniculi,  
in quibus aliquid mellis, pompholygis, sagapeni dis-  
soluatur.

Melli conserua fellis permisceatur pro pueris; pluri-  
mum enim iuuat cum fel multum subtiliet.

Aqua mellis destillata.

Fel caprinum, porcinum, fœniculi succo dissoluatur.

Sagapenum in aqua mellis resoluatur destillata, aut a-  
qua rosacea, per aliquot eo menses maximo cum  
commodo vretur.

Lotio capitis ex decocto foliorum betonicæ, maioranæ,  
absinthij, fœniculi, florum stœchados in lixiuio.

Mithridatum, heriaca, diamargaritum calidum.

Diagalanga, diarhodum abbatis, diamuscum dulce,  
conserua buglossæ.

Decoctum guaiaci cum rebus capitalibus; aut eius loco  
decoctum fœniculi, euphragiæ, betonicæ, caryophyl-  
locum, cinnamomi, cubebarum, maceris.

Aqua mellis oculis instilletur.

Collyrium è melle, succoque fœniculi atque felle fiat.

Vrina infantis facultate sua exiccatoria curat humidi-  
tates malum fouentes.

Lotio capitis ex decocto maioranæ, rutæ, stœchados,  
fœniculi, betonicæ, euphragiæ, absinthij.

Unguentum ex felle perdicis, succo fœniculi, melle.

Punctio cum acu non fiet antequam materia suffusio-  
nis mediocriter concreuerit.

~~~~~

THEORICA ET EMPIRICA MEDICA-
menta nobilia in SVFFVSIONE, sæpius cum sum-
ma salute plurimorum agrotorum a Gualtero Bruel
experta.

CVRATIO

CVRATIO SVFFVSIONIS.

℞ florum camomillæ, meliloti ana m. ij. betonicæ, euphrasæ, centaurei minoris, fœniculi ana m. j. se. seminum anisi, fœnibuli ana 3 iiij. agarici 3 j. se. colocynthidos 3 j. coquantur in sufficienti quantitate aquæ ad lb j. se. colaturæ addantur benedictæ laxatiuæ 3 vj. olei rutacei, liliorum an 3 j. se. salis communis 3 j. fiat *Enema*: semel in septimana ante prandium iniiciatur.

℞ syr. de hyssopo 3 se. syrupi stœchados, oxymellis simplicis, squillitici ana 3 j. aquarum euphrasæ, fœniculi, betonicæ ana 3 iiij. misceantur, fiat *Iuleb.* dentur vnciæ quatuor in aurora per quatuor aut quinque dies.

℞ pillul. lucis, cochiarum aurearum ana 3 j. agarici trochiscati 3 se. syrupi stœchados quantum satis; fiant *Pillulæ* septem vel octo numero: sumantur post noctis dimidium cum pulpa pomi.

℞ hieræ diacolocynthidos 3 ij. se. agarici trochiscati 3 j. nucis muscatæ grana vj. succi centaurei minoris quantum satis; fiant *Pillulæ*: dentur bis vel ter in mense.

℞ theriacæ magnæ, aureæ Alexandrinæ ana 3 j. nucis muscatæ, cinnamomi, caryophyllorum ana 3 sem. seminum fœniculi, euphrasæ ana 3 j. se. conferuæ anthos 3 j. se. syrupi stœchados quantum satis; fiat *Electuarium* molle. sumat 3 j. ter in septimana, quatuor horis ante prandium.

℞ florum camomillæ m. ij. se. foliorum maluæ, althææ ana m. sem. seminum fœnugræci, lini ana 3 se. mediocriter contendantur & coquantur in aqua q. l. fiat *Fomentatio* oculi antequam collyria instillentur cum spongia liquori immersa non nihil que expressa. Aut,

℞ florum camomillæ, meliloti, fœniculi, betonicæ ana m. j. seminum fœnugræci 3 j. coquantur in aqua & vino quantum satis; fiat *Forus* pro oculo.

℞ decoctionis chelidonis, betonicæ, rosarum, tormentillæ 3 ij. succi fœniculi, euphrasæ ana 3 iiij. myrrhæ 3 j. mellis despumati q. s. fiat *Collyrium*.

℞ pulueris capitis hirundinum 3 se. fellis lucij 3 ij.

I ij

pōpholygis ꝥ j. se myrrha ꝥ sc. aquæ decoctionis tormentille, fan cul ꝥ j. mellis destillati q. s. fiat *Collyrium*.
Palpebris autē & non oculo imponentur collyria acia.

Rx aquæ mellis destillatæ vncias aliquot, is sacchari candi aliquid immisceatur & myrrha; huius liquoris gutta vna aut altera oculo infilletur; fiat *Collyrium præstans*.

Rx terebinthinæ ꝥ ij. sulfuris viui ꝥ j. se. mellis rosati ꝥ vj. salis communis ꝥ iiij. succi sceniculi, vinæ pueri ana ꝥ j. distillantur pro *Collyrio*. Si dolet oculus à collyrio, oui albo conquassato, aut lacte mulieris, aut aqua rosata mitigetur.

Rx aquarum sceniculi, euphrasie ana ꝥ iiij. vitrioli albi ꝥ ij. al. e. ꝥ j. fiat *Collyrium*.

Rx centaurei minoris, maioranæ, betonice, absinthij ana m. ij. sceniculi, maioranæ, ana m. sc. florum flæchados m. j. nuces muscatas numero ij. coquantur in æqua portione aquæ & vini fiat *Lotura* pro capite.

APPENDIX

ad prædicta pro SVFFUSIONIS
curatione.

Clysterio via paretur naturæ ad expulsionem superfluitatum; hinc vena proximo die secetur m. dō corpus sit pleth. ricum. Demum naturæ obediens reddatur materia mali postea purgante medicamento expellatur, quod iteratis debet fieri vicibus. Hinc cauterium fiat ex fermenti ꝥ iiij. cantharid. alis capitibusque abscissis numero vj. fiat cauterium quod coronali commissuræ applicetur aut post aures. Apponantur demum ficus cum melle, fluereque permittantur vesiciæ apertæ. Plurimum autē post aures appositum cauterium iuuabit aut eius loco s. tonem cernici affigemus. Hinc extremorum ligaturis sternutatoriis medicamentis, errhinis, apophlegmasmis frict. oni us cly. eribus, acribus suppositoris materia auertetur. Postea quæ caput visumque roborare possunt reliquiæque dissoluere præscribantur. A mitioribus autem incipiemus medicamentis; sic enim melius assuescet admittere

admittere præstantiora. addentur autem ea quæ oculi ardorem remittere possunt. si aliquis excitatus sit. Dum autem per ventriculi consensum sit suffusio in eo collecta v. cumentur. Si autem ita malum increuerit ut nubeculæ iam oculis obuersari videantur tunc purgantia v. ntriculum, necnon caput imperanda sunt. Demum optimè digerentia discutientiâque medicamenta oculo accommodabimus, quod collyriis commodè fieri poterit. Consultum quoque erit tunc temporis cauterium in occipitio excitare, ne humores ad oculum vi digerentium ruant maiori impetu, v. de etiam inflammatio concurrere possit. Suffusio per consensum ventriculi facta sæpe curatur vomitu; cauendum autem ne fiat capite pleno existente, ne materia ruat ad nervos opticos. Pillulæ quoque m. stichinæ plurimùm hîc valent si frequenter offerantur. Si verò absoluta fuerit Suffusio, humor qui pupillæ obiicitur, remoueri debet acu ad paruum oculi angulum, debetque humor medio cris esse consistentiæ dum hæc fient cum liquitus acumi ut remoueatur, vix admittet. Tenax verò si nimium fuerit, tunicam potius lacerabit quàm abducet; adde quod dolorem præterea maximum causabit.



Methodus pro cognitione

OPHTHALMIÆ INSERVIENS.

OPHTHALMIA seu lippitudo est inflammatio tunice vel membranæ agnatæ seu coniunctivæ oculi, ex oculorum angulis in totam membranam effusa. A pericraneo autem originem habet frequenter hoc malum, à quo venæ in oculum mittuntur per frontem & tempora.

PARS AFFECTA, est oculus, & præsertim ipsius tu-

I iiij

nica agnata, quod manifestissime patet ex ipsa videndi functione læsa, & ex læsione manifesta ipsius oculi, necnon ipsius tunicæ agnatæ.


SIGNA. Concurrit oculi tumor, dolor grauans, atq; rubor. Sæpe autem ita in tumorem attollitur, vt tunica, necnon partes quæ in viciniis sunt, admodum tendantur, imò aliquando etiam ipse oculus vsque ad malas intumescit. Lacrymæ etiam fœcundæ ex oculo decidunt à vehementi dolore accersitæ; tanta enim aliquando pūctio concurrit oculi, vt acu aliòve corpore pūgenti stimulari videatur. Principium autem morbi indicant huiusmodi renues humores. Hinc sordes subsequuntur, quæ in maioribus oculorum angulis inhærescunt, eruntque incrementi testes. Paulatim autem sordes ita incrassescunt, vt oculos quasi gluten oblinant, statumque mali adesse significant. In hoc malo quoque arteriæ circumfixæ validè pulsant. Venæ quoque exiles quæ in albo oculi antea latebant, iam tumidæ & conspicuæ fiunt, rubescitque quod album esse solebat. Atque prædicta signa prout intensa sunt & magna, ita etiam affectus magnus est, & prout sunt mitia, ita etiam affectus levis est.

CAUSA. A tribus potissimum causis excitari solet hoc malum. Primò quidem à plenitudine, magnæve sanguinis copia originem frequenter habet, vnde contingit membranam agnatam humoribus impleri atque distendi. Tunc fit pulsatio temporum multa, dolor magnus circa oculum versatur. Venæ videntur latæ, facies tunicæque agnata fit rubra, palpebrarumque sæpe clausio. Lacryma fluit non multum erodens neque acris. Adde quod ætas, victus ratio, temperamentum, anni tempus, regio calida & humida præcessit. cuncta quoque circa oculum rubea sunt, non solum agnata tunica, sed etiam ipsa facies. Si à sanguine pituitoso fiat, hæc non ita intenduntur. Vti autem frequenter fit à sanguine, sic etiam sæpe numero à bile fit acris atque tenui e temporum angulorumque venis in oculorum venas latenter irruente: tuncque lacrymæ admodum feruidæ erodentesque effluunt,

vt

ut partes vicinæ etiam vri videantur ; nonnunquam etiam exulcerantur. Excrementa tunc circa oculorum angulos coaceruantur sicca atque aspera. Huius humoris testes erunt ætas, tempus anni, temperamentum biliosum, victus ratio præcessit acres humores generans. Fit etiam subinde, rarius tamen, à flatuoso spiritu ventositatibusque ; tuncque admodum tunica agnata extenditur, ita quidem ut sæpe rumpi videatur, unde plurimum quoque dolet. Tunc non currunt, neque suboriuntur lacrymæ nisi subinde parvæ ; non tanta percipitur grauitas oculi neque feruor, erosiove, etiam si subinde rubor appareat.

PROGNOSTICA. Ophthalmia frequenter perducit ad exitum vixæ, cum cornea tunica sæpè dirumpatur per corrosionem aut putrefactionem si diu duret malum, materiæque erodens continuo ad oculum fluat. Ophthalmia quæ venit à velaminibus intrinsecis, & quæ à cerebro est orta, deterior est illa quæ venit à panniculo cooperiente craneum. Quanto magis lacrymæ currunt & in se habent mordacitatem & acuitatem, tanto citius reducitur ophthalmia ad statum. Periculum autem est exulcerationis ipsius pupillæ cum salia fluit lacryma multumque calida. Si ophthalmia laborantibus continuo diuque doleat oculus, periculum cæcitatis affert. Ophthalmia laborans si alui profluvio corripiatur, bonum est. A tumore magno, sicco, parumque dolente nullum periculum impendet. A tumore autem magno, sicco, multumque dolente, periculum est ne oculus exulceretur.



Methodus pro curatione

**OPHTHALMIÆ INSER-
VIENS.**

*Perficitur autem subsequētibz remēdiorum ge-
neribz.*

VICTVS RATIONE.

A Er sit frigidus, siccus & obscurus.
Cibus nonnihil refrigerans, parūmq; sit alens, e-
xiguāque primis diebus quantitas offeratur.
Potus sit aqua hordei,
Motus vitandus, quiesque imperanda.
Somnus paulò sit tempore consueto longior, humo-
rum enim agitationem dolorēmq; sedat.
Excrementa alui respondeant indies arte, aut natura,
Perturbationes animi fugiendæ.

PRAEPARANTIBVS.

Syrupus rosatus, de rosis siccis.
Violarum, granatorum.
Oxalidis, nymphaeæ,
Acetosus simplex.
Aqua oxalidis, endiuiae, plantaginis, rosarum, viola-
rum.

VACVANTIBVS.

Syr. ex multiplici infusione rosarum,
Diaprunum simplex, diacatholicum.
Electuarium de succo rosarum.
Pillulae aureae, aggregatae, lucis,
Hiera picra, hiera diacolocynthidos.
Tamarindi, myrobalani, rhabarbarum, manna, cassia,
Diaphœnicum.
Pillulae coctae, alephanginae, ex hiera picra, de agarico,
foetidae.

Vena

Venæ sectio fiat omnium primò ipsius cephalicæ eiusdem lateris, si magna plenitudo adsit, magnusque sit affectus, sanguinisque satis magna educatur quantitas; nam venæ sectio magna ex parte malum ipsum eradicabit; si bilis tamen aliis humoribus plus abundet, non tantum sanguinis detrahemus atque si à dominio sanguinis fiat, sed alterantibus vacuantibusque medicamentis compensabimus.

A fortioribus abstinebimus etiam hîc medicamentis; periculum enim est ne humores exagitati medicamento valido in oculum confluant maiori copia. Prioribus autem utemur dum multum fuerit sanguis biliosus, sequentibus verò, si potius aquosus, aut nimium fuerit phlegmaticus.

AVERTENTIBVS.

Venæ frontis sectio fiat.

Clystere, suppositorium.

Frictio, ligatio, lotio pedum, spatularum, brachiorum, coxæ, crurum.

Cucurbitulæ cum scarificatione scapulis, collo, summitati brachiorum initioque ceruicis affigendæ.

Hirudines etiam venis frontis applicari poterunt, aut post aures, si venæ sectio omiſſa ob aliquam causam fuit.

Cauterium in coronali capitis parte (prius rasis capillis) applicetur.

Gargarismus, masticatorium.

Paracenthesis fiet apprehensa cute ceruicis ipsis digitis, acusque filum crassum habens traducetur, atque instar fontanelli per dies quadraginta effluere sinemus capitis excrementa, trahendo aliquando huc atque illuc setam immiſſam, vel comprimemus ceruicis cutem cum forcipe habente duo foramina, & cum stilo ignito cutis perforetur, hinc acus accipiatur, cui imponatur funis ex serico satis crassus, vt nō corrūpatur citò, moueaturque quotidie bis aut ter, serueturque apertum, vt prædictum fuit.

REPELLENTIBVS *modicè viâsque per
quas materia ruit, contrahentibus.*

Fomentatio fiat ex aqua tepida sæpius in die, in qua coquantur rosæ, violæ, flores nymphææ, folia & radices plantaginis, semina papaveris albi, myrtilorum, radices mandragoræ; hinc versùs augmentum addemus prædictis folia maluæ, camomillæ, meliloti.

Circa statum, addemus fœnugræci semina.

Instilletur oculis aqua rosacea.

Collyrium ex tragacantho, pompholyge, gummi Arabico, mastiche, bolo Armena, corallo rubro, quibus parum opii addere possumus, si dolor istis medicamentis non superetur, efficacia enim magna fluxum humorum sistit.

Liquor oui lacte mulieris permixtus oculis apponatur, aut idem liquor cum decocto papaveris albi, aut aqua rosacea, mulierisque lacte commixtus.

Aqua rosacea, solani, plantaginis, in quibus papaveris semina decoquantur, quibus tandem etiam liquor albuminis oui conquassati permiscebitur.

Trochisci albi Rasis cum aqua rosacea dissoluantur, si dolor magnus adsit.

Cataplasma ex capitibus papaverum, rosis, balauftis, solano, plantagine, corticibus granatorum, bolo Armena, sanguine draconis; fronti temporibusque adaptetur cum oui vitello.

Emplastrum ex farina fabacea, semine lini, fœnugræci, aceto, albuto, albumine oui, fronti applicetur.

Si per venas & arterias fluat humor extra cranium existentes, oculis imponantur non multum stiptica; periculum enim ex fortioribus impendet, ne materia intrò pellatur ad oculorum nervorumque concavitate, sicque cataractam cæcitatemque inducant perpetuam; quod magis quoque metuendum erit si per venas fluat materia in craneo hærentes, cum sic quoque validius congelent materiam circa nervos opticos.

In

In ambitu autem potius oculi, aut temporibus frontis que accommodabuntur ea quæ multum adstringere possunt non supra partem affectam. ter autem aut etiam quater in die renouentur, aut etiam sæpius, si dolor multum vrgeat. Stupefacientium autem medicamentorum non erit hic usus, nisi dolor admodum magnus sit; visum enim offendent. versus autem morbi incrementum, resoluentia repellentibus permiscenda erunt, eoque magis eorum quantitas augebitur, quò magis ad declinationem ipsum malum tendit.

CORROBORANTIBVS, resoluentibusque reliquis.

Diatragacanthum frigidum, diamargaritum frigidum, decoctum radicum Cinæ.

Fœniculi aqua in qua aloës portio aliqua sit eliquata, præstans est. Lac mulieris, aut aqua rosacea in qua sarcocolla sit dissoluta. Collyrium ex aqua euphrasie, fœniculi, rosarum, pompholyge, aloë.

Fomentatio ex decocto florum meliloti, seminum fœnugræci aliquoties loti, medicamentum præstans est.

Fœnugræcum lauetur bis aut ter aqua calente, hinc ad mellis spissitudinem coquatur.

Ouum usque ad duritiem coctum quasi, oculo adhuc calens apponatur.

THEORICA ET EMPIRICA MEDICAMENTA nobilia in OPHTHALMIA, sæpius cum summa salute plurimorum agrotorum à Gualtero Bruel experta.

CVRATIO OPHTHALMIAE.

R. radicum fœniculi ꝯ ij. hordei mundati m. ij. foliorum maluæ, mercurialis, violarum ana m. j. ss. florum ca-

momilla, meliloti ana m. j. seminum cucumeris, melonum ana \mathfrak{z} ? coquantur in aqua q. s. ad lb j. β . colatur & adde electuarij de succo rosarum \mathfrak{z} v. olei violarum \mathfrak{z} iiij. fiat *Clystere*.

R \mathfrak{x} oxymellis simplicis, syrupi de stœchade ana \mathfrak{z} j. β . mellis rosati colati \mathfrak{z} β . aquarum fœniculi, roris marini, maioranæ ana \mathfrak{z} iiij. fiat *Iuleb*.

R \mathfrak{x} cassiæ recentè extractæ \mathfrak{z} j. electuarij de succo rosarum \mathfrak{z} j. β . syrupi ex multiplici infusione rosarum \mathfrak{z} j. aquarum lactucæ, violarum ana \mathfrak{z} j. β . fiat *Hau-*
stus.

R \mathfrak{x} pillularum sine quibus esse nolo, cochiarum ana \mathfrak{z} j. pillularum lucis \mathfrak{z} j. β . rhabarbari electissimi \mathfrak{z} β . diagridij gr. iiij. syrupi stœchados q. s. fiant *Pillulæ*: dentur post primum somnum.

R \mathfrak{x} massæ pillularum de hiera cum agarico \mathfrak{z} β . pillularum lucis \mathfrak{z} ij. diagridii gr. ij. syrupi stœchados & aquæ euphrasiæ q. s. fiant *Pillulæ* vj. vel septem.

R \mathfrak{x} diamargariti frigidi \mathfrak{z} β . diatragacanthi frigidi \mathfrak{z} v. syrupi de rosis siccis, violarum ana \mathfrak{z} j. fiat *Mix-*
tura.

R \mathfrak{x} aquæ rosacæ \mathfrak{z} iiij. mucilaginis fœnugræci \mathfrak{z} β . albuminis oui conquassati \mathfrak{z} j. β . lactis mulieris \mathfrak{z} j. misceantur, oculoque circumponantur. In principio malum multum convenit; dolorem equidem remittit, & humoris impetum sistit.

R \mathfrak{x} aquæ rosacæ, decocti papaveris albi ana \mathfrak{z} ij. albuminis oui in aquam dissoluti \mathfrak{z} j. camphoræ, croci ana gr. iiij. opii si dolor plurimum vigeat gr. j. misceantur & in oculum instillantur; hinc decocto meliloti oculus foueatur.

R \mathfrak{x} pulpæ pomi dulcis & maturi sub cineribus cocti \mathfrak{z} iiij. camphoræ \mathfrak{z} j. β . croci \mathfrak{z} β . aquæ rosacæ, lactis mulieris ana q. s. fiat *Catapl.* s ma in dolore acerbissimo oculi.

R \mathfrak{x} mastichis, olibani ana q. s. cum albumine oui dissoluantur temporibusque applicentur, mirè valet ad-

uer-

uersus humores fluentes ad oculos & dentes.

℞ lactis mulieris ℥ ij. v. tella ouorum tria, farinæ seminis lini ℥ β. olei rosacei ℥ j. simul permisceantur & apponantur in principio mali; modicè repellit & mirifice dolorem mitigat Emplastrum. E farina quoque hordei, thure, olibano emplastrum fieri poterit, quod optimè prohibet descensum lacrymarum ad oculum.

℞ thuris, balaustiorum, sanguinis draconis, boli Armenæ ana ℥ j. albuminis oui q. s. ad incorporandum prædicta, tempore vsus dissoluantur in aceti quantitate sufficienti, in quo decocta sint rosæ, mastix, olibanum, sandala rubea; fiat *Emplastrum* fronti temporibusque applicandum.

℞ boli Armenæ, mastichis, sanguinis draconis farina hordeaceæ ana ℥ j. β. rosarum rubrarum m. j. albumen vnius aut alterius oui, olei rosacei ℥ j. β. aceti parum fiat *Cataplasma*, quod fronti temporibusque applicabitur, modò per externas capitis partes humores in oculum deriuentur, id quod magna ex parte accidit.

℞ mastichis, thuris, myrrhæ ana 3 j. β. boli Armenæ, farinæ fabaceæ ana ℥ β. croci 3 j. cum albumine oui, oleo rosato & aceti auxillo, fiat *Frontale*, lana telæve linea excipiantur a panno molliori iisdem imbuto, fronti accommodentur.

℞ radicum mandragoræ 3 ij. foliorum violarum, rubi, salicis ana m. j. rosarum p. j. papaueris albi 3 β. seminum psyllii, cidonicorum ana 3 j. coquantur in aqua q. s. ad tertie partis consumptionem, fiat *Fotus* ab initio mali dum adhuc fluunt humores. Addes autem prædictis versus augmentum folia menthae, althææ, flores camomillæ, meliloti, semina lini, foeniculi, sarcocollam, auctis semper posterioribus, prout morbus versus statum declinationemve procedit.

℞ tutiæ præparatæ tenuissimè & puluerizatæ, ita vt per sindonem facile traici possit ℥ ss. camphoræ gr. xij. hæc simul in sindone conclusa munda, in aquæ rosæ

farum vini que albi ꝓ iij. madescant, fiat *Collyrium*: guttæ duæ vel tres in oculum instillantur.

℞ farine hordei ꝓ ij. croci ꝓ ij. aquæ rosarum & vitelliorum q. s. fiat *Emplastrum*, oculo placidè superponatur; plurimum enim in oculorum inflammatione, rubore, doloreque eorundem iuuat.

℞ lactis mulieris calentis, decocti papaueris albi, albuminis oui conquassati ana ꝓ β. in principio mali humorum fluxum inhibet, dolorem lenit, somnūque accersit.

℞ collyrii albi ꝓ β. mucilaginis psyllii ꝓ iij. lactis mulieris recentis ꝓ iij. misceantur exquisitissimè lapide pictoris, addendo albuminis oui conquassati ꝓ j. fiat *Collyrium*.

℞ aquæ rosaceæ ꝓ iij. euphragiæ ꝓ j. mucilaginis scænuagræci ꝓ ij. β. camphoræ ꝓ j. albuminis oui aliquid, opii gr. j. terantur optimè lapide pictoris, fiat *collyrium*, ante tertium autem diem nullum collyrium oculis instillabitur.

℞ albuminis oui in aquam soluti ꝓ j. β. lactis mulieris ꝓ iij. succi camomillæ, aquæ rosarum ana ꝓ j. opii gr. j. si doloris vehementia vrgeat, oculo instilletur, demum tela linea molliuscula iisdem imbuta oculo superligeretur, aliquotiesque renouetur.

℞ florum meliloti m. iij. scænuagræci crassiusculè contusi ꝓ iij. coquantur in aqua c. ad tertias, fiat oculi fomentatio, liquore tepente epius in die cum spongia, plurimum sine offensione ascutit.

℞ collyrii Rasis ꝓ j. β. dissoluatur in lacte muliebri, sicque oculis instilletur. andemque coquantur semina scænuagræci in aqua communi bene lota prius, vt arenule abscedant: colatur: hac lauetur oculus, aut spongia foueatur si ab humis acrimonia exulceratio aut adsit, aut impendeat.

℞ seminum scænuagræci contusorum ꝓ ij. florum meliloti m. ij. coquantur in aqua q. s. ad mollitudinem, fiat *Fomentatio oculorum* cum spongia, aut panno lineo duplici-

plicato aliquoties in die oculus fouebitur, admodum feliciter discutit. In eundem finem ouum coquatur duriusculè, oculòque calidum superponatur; præterquam enim quòd concoquit & digerit, ruboris quoque reliquias potenter tollit.

R^x medullæ panis albⁱ ʒ j. madesiat in aqua rosacea, hisce adde pomorum dulcium ʒ ij. lactis mulieris q. s. fiat *Emplastrum pro oculo*.

APPENDIX

ad prædicta pro OPHTHALMIAE curatione inferuiens.

Omniū primò aluum subducere conuenit clysterio conuenienti. Hinc venæ sectio secūda die instituetur prout prædictum est. Demum quæ repellere possunt materiam ad oculum fluentem, fronti admonebuntur, necnon in oculum iniiciuntur durante mali principio, quibus ea addemus quæ dolorem lenire possunt. Interim quoque humores crassos flatulentosque naturæ obediētes reddemus. hocque cū consecuti fuerimus, purgante medicamento e corpore propellemus eosdem, qui si fuerint acres multum, ita ut oculi erosionem minentur, abique ullo præparante medicamento præmissis: statim vacuabimus. Demum ventosis, frictionibus, lotionibus, clysteribus materiam ad oculos ruentem auertemus. Hinc resoluentia repellentibus permiscebimus quinto magna ex parte die, tunc equidem morbus ad incrementum plerumque peruenit: aqua autem rosacea sordes antea abluantur, hinc paulatim ad digerentia transibimus: quæ omnia nunc anteaquæ dictis medicamentis facile consequi poterimus, modò uniuersalia particularibus debita ratione adhibeantur. Prædictis verò si malum non vincatur, funiculus ex serico filo multiplicatus in posteriori capitis parte in initio cervicis ex opposito oculorum ita traiciatur ut hinc inde traduci possit: id fiat apprehensa digitis cute cum carne. Ophthalmia si fiat cum dolore capitis, oportet omnium primò dolorem edare, eò quòd dolor humorem excitet sicque causam mali auget: quo sedato inflammatio sedanda est ingeniis prædictis. Inflammatio si à percussione

facta sit, aqua rosacea cum albumine oui concutiat, inter reliqua enim maximè conuenit statim à principio. Si parua sit inflammatio, sufficit ad remouendum malum aqua rosacea, aqua albuminis ouorum, lac muliebre. psyllij mucilago: instilletur oculis, & lineus pannus iisdem liquoribus imbutus, oculo superponatur. Sæpius autem in die renouanda erunt remedia, quater nimirum vel quinies. augmento instante aliquid sarcocollæ, quod tam digerentem quàm repollentem vim habet, in lacte mulieris dissoluemus.



Methodus pro cognitione

**GRAVITATIS AUDI-
TVS INSERVIENS.**

GRAVITER audientes dicuntur, qui exiguas voces penitus non audiunt, magnæque vix percipiunt. Vbi autem auditus ita offensus fuerit, ut neq; magnas, neque exiguas voces percipiant, surdos nihilque audientes dicimus. Sola itaque magnitudine distant grauis auditus atque surditas.

PARS AFFECTA. Ex functione læsa aures ipsas hinc affici constat. Contingit autem aures hinc oblati per se, dum primum audiendi instrumentum afficitur; per accidens verò, cum cerebrum unde facultas efflorescit, aut neruus per quem eadem defertur facultas, obleditur. Si propter cerebri læsionem fiat, tunc præter læsionem ipsius cerebri etiam alij sensus afficiuntur. Est autem symptoma pertinens ad actionem læsam facultatis audiendi, cum sit diminuta aut ablata. sequitur autem symptoma aut morbum in unitatis solutione, aut morbum in compositione.

SIGNA. Ex ægri ipsius querimoniis malum hoc innotescit.

CAUSA.

CAVSA. Frequentissimè intemperies cerebri aut organi auditorij frigida in causa est. Fit quoque frequenter à crassis frigidisque humoribus qui ad aures protunduntur, iisque impinguntur; omnium enim maxime huiusmodi humores ipsos sensus sensuumque functiones consopire solent: id autem potissimum indicabit capitis partiumque affectarum gravitas, alij quoque sensus impediti fuerunt. biliosus quoque sanguis sursum ascendens aliquando auditus meatum obstruit dum eius magna copia in primum audiendi organum illabitur, quod sæpe fit tempore crisis in febribus acutis. A sordibus quoque aurium anfractibus conclusis, à scirrho, callo, carnosoque tuberculo, ab ulcere, ab apostemate, à rebúsque extrinsecus incidentibus gravitas auditus quoque excitatur. Contingit quoque è subditis visceribus, & sæpe quidem à stomacho calidos copiososque vapores in caput aurisque euolare, vnde audiendi sensus bene se habens, male tamen atque perturbare homo audit, multique sunt qui ob hanc solam graviter audiunt, potissimumque hoc illis evenit, cum viscera eorum impuris excrementis grauantur, acciditque hominem sic eodem modo male audire, vti contingit male illum videre in ea suffusionis specie, quæ ventriculi vitio oritur; tunc per interpolationem malum infestare solet. Dolorem autem magnum sæpe excitant huiusmodi spiritus flatulenti, dum copia membranas valide distenduat, propterea quod exitus illis non pateat; cuius signa sunt, sonitus distentióque aurium, idque absque ardore gravitateque.

PROGNOSTICA. Multum semper suspectus est gravis auditus, & potissimum paulatim increscens eò quòd temporis progressu perfectam surditatem inducat. Quæcumque ab origine, aut etiam postea absolutæ fuerint surditates, nullo remedio curantur. Quæ verò absoluta non est, diuturna tamen si fuerit, aut curationem non admittit, aut sanè quàm egrè curatur. Quæ ve-

Nymphææ.

Intubi.

Aqua acetosæ, buglossæ, cichorei.

Dum à crassis frigidisque humoribus, priori loco positus, cum verò à calidis sit, subsequenter utemur medicamentis: sic quoque purgantia conuenientia eligenda medicamenta erunt.

VACVANTIBVS.

Venæ humerariæ sectio fiat eiusdem lateris.

Electuarium de rosarum multiplici infusione.

Pillulæ aureæ, assaieret.

Diaphœnicum.

Rhabbarum, cassia recenter extracta.

Aqua intubi, nymphææ.

Pillulæ coctiæ, de agarico, Arabic.

Diacatholicum.

Indum maius.

Hiera Galeni.

Agaricus trochiscatus.

Frequentius reiteranda sunt purgantia in hoc malo medicamenta, dum à crassis humoribus sit auditus gravitas, ob humorum frigidorum pertinaciam.

REVELLENTIBVS.

Venæ sectio.

Apoplegmatisata è pyrethro, mastiche, pipere, linteolo tenui concludantur, masticienturque aliquamdiu in dies.

Errhina è sinapi, pyrethro, succo sampsuchi, cum vino albo.

Gargarismus ex decocto florum stœchados, sinapi, origani, calaminthæ, oxymelle squillitico addito.

Sternutamentum cientia è zinzibere, pyretro, elleboro albo.

CONFORTANTIBVS, obstructionem tollentibus, intemperiemque relictam emendantibus.

Diamuscum dulce.

Theriaca.

K ij

Conserua anthos, stœchados.

Decoctum ligni guaiaci.

Mel in quo parum ellebori albi aut castorei maceratum sit, eius gutta vna aut altera in aurem instilletur.

Rutæ succus cum melle mixtus.

Decoctum stœchados, origani, maioranæ, absinthij menthastri, cuius decocti vapor infundibulo traducetur in aurem.

Fomentatio auris ex aceti vapore plurimum sæpe profuit.

Oleum petrolei, amygdalorum amarorum, raphaninum, nardinum, succus cepæ; horum gutta vna tepida in aurem immittatur manè & vespèri.

Oleum baccarum lauri, in quo aristolochiæ aliquid sit dissolutum.

Balneum naturale.

Electuarium diatrion sandalorum.

Conserua rosarum, buglossæ.

Oleum nymphææ, rosarum, violarum, amygdalorum amarorum.

Albumen oui cum lacte mulieris; horum gutta vna aut altera in aurem instilletur.

A crassis humoribus si fiat hoc malum, prioribus: posterioribus verò vtemur modò à calidis fiat. Quantitas autem eorum quæ auri instillantur, sit gutta vna aut altera.

THEORICA ET EMPIRICA MEDICAMENTA nobilia in GRAVITATE AUDITVS
sæpius cum summa salute plurimorum agrotorum à
Gualtero Bruele experta.

CVRATIO GRAVITATIS AUDITVS.

℞ syr. stœchados ℥ iij. oxymellis squillitici ℥ j. aquarum betonicæ, hyssopi, maioranæ, ana ℥ iij. fiat *Tuleb.* dentur ℥ iij. in aurora per sex vel septem dies.

℞ dia-

R̄ diaturbith cum rhabarbaro, electuarij Indi maioris ana 3 iij. se. syr. stœchados 3 j. aquarum betonicæ 3 iij. fiat *Hauftus*.

R̄ pillularum affaieret, sine quibus esse nolo, ana 3 j. cochiarum 3 j. se. syr. stœchados q. s. fiant *Pillulæ*: dentur post primum somnum.

R̄ pillularū cochiarū, sine quibus esse nolo, ana 3 j. se. trochiscorū alhandal gr. vj. cū syr. de stœchade, fiant *Pillule* septem.

R̄ mithridati optimi 3 j. theriacæ magnæ 3 j. detur sequenti die in aurora post vsū pillularū.

R̄ rad. pyrethri, staphisagriæ, seminum sinapi ana 3 j. sem. succi sampsucchi 3 iij. fiat *Errhinum*.

R̄ rad. pyrethri, piperi, sinapi ana 3 iij. mastichis 3 vj. fiat *Apophleg*.

R̄ rad. ellebori albi gr. xij. zinziberis, pyrethri ana 3 j. se. puluerisata cōmisceātur: fiat *Sternutatorium* medicamentū, naribūsq̄ue nonnihil attrahatur.

R̄ foliorum calaminthæ, origani, sampsuchi, florum stœchados ana m. j. pyrethri, sinapi ana 3 j. se. coquantur in aqua q. s. ad tertias: addantur colaturæ oxymellis squillitici 3 ij. se. fiat *Gargarismus*.

R̄ carnis cidoniorum 3 vj. cinnamomi optimi 3 j. seminum anisi, foeniculi, coriandri præparati ana 3 ij. electuarij anacardini 3 ij. sem. syr. stœchados q. s. fiat *Electuarium* molle: sub finem pastus vtetur.

R̄ olei amygdalorum amarorum, laurini, de castoreo ana 3 ij. rosati 3 j. ellebori albi gr. vnum aut alterum, aceti vini 3 sem. feruefiant simul in patella ferrea ad consumptionem aceti, gutta infundatur in aurem, cum lana obstruantur foramina, vel sic,

R̄ olei nardini, amygdalorum amarorum ana 3 j. succi cepæ 3 j. se. castorei 3 j. guttatim in aurem instilletur. Aut,

R̄ olei amygdalorum, camomillæ, rosacei ana 3 sem. panis porcini 3 j. sem. foco aliquamdiu ferueant, huius colaturæ gutta vna aut altera in aurem instilletur. Illi quod relictum est post colaturam, adde farinæ lini, fenugræci ana 3 j. olei amygdalorum amarorum, butyri

K iij

recentis ana q.s. fiat *Cataplasma* ; auri supraponatur.

℞ cepe numero iij. coquantur sub feruentibus cineribus, terantur in mortario addendo croci 3 sem. butyri. recentis quantum satis, fiat *Cataplasma*.

℞ foliorum lauri, origani, hyssopi, maioranæ, ana m. j. se. absinthij m. ij. mentastri m. se. florum stœchados m. j. se. coquantur in aqua q.s. ad tertias: sub finem aliquid acetii addatur, fiat *Fomentatio* auris cum spongia, & vapor mediante fistula ad auditorij instrumentum diducatur.

℞ rad. raphani 3 iij. ellebori albi gr. ij. castorei, pyrethri ana 3 se. modicè ebulliant in vino generoso, huius gutta vna aut altera mittatur in aurem cum ligneo stylo in frigida causa. In calida autem causa instilletur succus mali granati in quo aliquid olei rosati & acetii, aut succi lactuæ dissolutum sit. Confert quoque oleum rosaceum solum in quo acetii nonnihil ebullitione consumptum sit, si instilletur parum eius tepidum in aurem. Medicamento immisso, quiescat per horam vnā aut alteram super aurem sanam, vt ad interiora virtus medicamenti traducatur, postea per totidem horas supra ægram quiescat, vt excrementa elabantur melius. Hinc post sex vel septem horas in loco lucido à sordibus inibi collectis vel mundetur auris. Albumen oui conquassatū, cui lactis mulieris nonnihil permisceatur, instilletur in calida causa, aut aqua quæ emanat à vite abscessa tempore conuenienti.

APPENDIX

ad prædicta pro curatione GRAVITATIS
AUDITVS inferuiens.

Omniū primò humores crudos nature obediētes reddemus concoquentibus medicamentis, deinde pillulis alijsve conuenientibus medicamentis eosdem e corpore deturbabimus, idque bis in septimana moliemur. Hinc materiam auribus impactam euocabimus errhinis, sternutatoriis medicamentis, gargarismatibus: hoc facto consultum erit ad pillulas rursus confugere, cerebrūque ab humoribus redundantibus purgare. Tandem quæ reliquias absumeres

sumere, cerebrumque roborare possunt, offerantur. Quae omnia nunc anteaque dictis medicamentis felicissimo cum successu coniequi poterimus, modo uniuersalia particularibus debita ratione adhibeantur. Illud autem hic quoque addendum est, ut olea calentia magna cautione auri imponantur, ne dolor inflammatioque excitetur. Consultum itaque erit paruum eorum quantitatem commiscere cum oleo amygdalorum amarorum. Si ulcus adsit saniosum, ea quae mundare possunt partem affectam iniiciantur, in quem finem ex melle & succo cucumeris agrestis, aut felle aliquo mitiori, veluti agnino, medicamentum arte paretur hinc consolidatio ulceris instituatur cum iis quae exiccandi vim habent, in quem finem tutia, ferri scoria, pompholyx, cerusa in vino decoqui poterunt, colaturae gutta in aurem iniiciatur, gutta aceti addi etiam poterit. Quemadmodum autem omnibus ulceribus olea quasi inimica sunt, paucis exceptis, sic maxime aurium ulceribus nocent. Quare vitandae sunt iniectiones ex oleo, modo ulcus adesse aliquibus indiciis intelligamus. A mitioribus autem hic quoque procedere debemus medicamentis, paulatimque fortiora admittemus. Potius quoque externis utemur medicamentis, cum minus ab his periculi quam ab iniectionis impendeat, a quibus si aeger leuetur, mutandum non erit medicamentum, eo quod frequentius ob sint quam prosint medicamenta nisi magna cum cautela adhibeantur. Parua quoque semper esse debet quantitas eorum quae in aurem instillantur, alioqui ad neruum ruent auditorium & ad os petrosum, sicque maiorem excitabunt audiendi gravitatem.

K. iij



Methodus pro cognitione

**HÆMORRHAGIÆ, SEV
PROFLUVII SANGVINIS E
naribus inferuiens.**

HÆMORRHAGIA hîc significat profluuium sanguinis e naribus potissimum, siue mediatè veniar a naribus per venas ex palati sedibus eò deriuatas, per quas quidem maiori ex parte natura superuacaneum sanguinem expellere solet in multis, siue a venis magis distantibus quæ sunt in capite. In genere verò significat quodcumque sanguinis profluuium siue e naribus, se de, vteròve id fiat, siue ex alia aliqua corporis parte profundatur. E naribus autem tanto subinde impetu profunditur sanguis, vt homo exanimetur ob magnam copiam sanguinis effusi, sicque semper nocius est, vti si moderatè fluat in principio alicuius apostematis, pleuritidis, anginæ, febrium ardentium, morbillorum, varicellarum, sæpè cum naturæ commodo fit. Aliquando tantummodo destillando effluit e naribus, nonnumquam quoque quasi medio modo se habet. Contingit quoque hunc fluxum aliquando criticum esse aliorum morborum, aliquando non est.

PARS AFFECTA. Nares hîc afficiuntur non semper quidem per essentiam, sed etiam per consensum alterius subinde partis. Venæ autem quibus hic sanguis e naribus profunditur, ex palato ipsoque ore in nares excurrunt, & subinde ex ipso capite. Est autem hæmorrhagia, symptoma pertinens ad excretionem immodicam seu actionem læsam facultatis retentricis aut expultricis, sequiturque morbum instrumentalem, resectionem nimirum orificiorum quibus venæ terminantur, vel

vel earumdem venarum diuisionem vel erosionem.

SIGNA. Si sanguinis copia nimia profundatur, sequitur pallidus tandemque liuidus corporis color, extrema frigescunt, hinc sequitur syncope, quam mors aliquando etiam excipit.

CAUSA. Sanguinis profluuium è naribus sæpe fit ab ipsa facultate seu natura, dum id quod molestum est, hac via è corpore exturbat. Hocque sæpe fit in morbis acutis, cum materiei noxiæ magna quãtitas est, cumq; ad musti cõclusi similitudinem quasi ebullit. Fit quoq; sanguinis profluuium ob venas malè affectas quib. continetur, effluereque è venis sanguinem contingit, primò quia venæ nimium referantur. Et referari quidem ora venarum contingit sæpe à sanguinis magna copia, quæ aliquando tanta est, vt ipsis venis contineri non possit; sic enim impetu quodam ad oscula vasorum ruens, ea tandem referat, subinde etiam distumpit. Sæpe quoque vasa referari contingit nulla sanguinis concurrente copia; sed quia acri aliqua qualitate sanguis perfusus est, aut alio modo vitiat, sicque vasorum ora diu irritando, aperit. Aliàs venæ quoque sanguinem fundunt, propterea quòd venæ ipsæ à ruptura, vel vulnere, vel contusione diuisæ sint. Tertiò sanguinem fundunt venæ, quia sunt erosæ, exulceratæque à pernicioso aliquo humore intus latente, aut à medicamento valido extrinsecus admoto, tuncque ea quæ crustam inducere possunt, vsui erunt. Ultimò sanguinem profundere contingit venas, propterea quòd sanguis nimium attenuatus est aut exercitio, aut aliam aliquam ob causam, venarumque tunicæ rariores sunt effectæ; sic enim contingit venas sanguinem quoque fundere per viam transcolationis. Hic quæ sanguinem venasque incrassare possunt, serosumque humorem purgare, conueniunt.

PROGNOSTICA. Si sanguinis profluuium è naribus longo tempore perseverauerit, timendū erit aut

animi deliquium, aut hepatis imbecillitas ac refrigeratio, necnon cachexia atque hydrops. Sanguinis narium fluxus cum extremarum partium frigiditate, mortalis est. Sanguinis narium fluxus cum alleviatione patientis, bonus est. Fluxus sanguinis narium quarto die in febribus acutis contingens suspicione haud vacat. Sanguinis narium profluvium si fiat post capitis dolores tempore crisis in febribus, laudabile est, & modò non fuerit immoderatum, remedia nulla postulat. In fluxu sanguinis, desipientia & spasmus, malum est; spasmus enim ex inanitione, mortale est. In mensium suppressionibus si erumpat sanguis per nares, ad tempus ut fluat permittendus, sic equidem per superiora reiecit natura impedita, quæ ad pulmones iecurve erant ruitura, & quæ per vterum excerni debebant. Omnis sanguinis fluxus superfluous à quacunque parte sit, debilitat hepatis, unde cachexia, animi deliquium, hydrops atque mors frequenter irruit.



Methodus pro curatione

HÆMORRHAGIÆ IN-
SERVIENS.

*Perficitur autem subsequenti-
bus remediis.*

VICTVS RATIONE.

A Er ad frigidum declinet.
Cibus boni succi atque concoctu facilis offeratur, ut sunt carnes pullorum assæ, aut elixatæ. Sint autem actu frigida dum offeruntur alimenta. Inter fructus conveniunt mala cidonia, pyra. Inter olera, intubus uterque, lactuca.

Potus.

Potus. Vinum rubrum crassum bibat; album verò atq; tenue deuitet. Poterit quoque loco vini aqua vti, in qua parum cinnamomi sit decoctum.

Motum corporis exercitiâque omnia vitet, parum quoque loquatur. Curandum quoq; vt partes capiti subiectæ, alius capite situentur; ita vt caput deorsum spectet, cum sic in contrariam sui motus partem impellatur.

Animi pathemata, & potissimum iram fugiat.

PRÆPARANTIBVS.

Syrupus myrtilorum, nymphææ.

Rosarum, granatorum.

De succo acetosæ, cidoniorum,

Papauerinus.

Aqua oxalidis, plantaginis, portulacæ.

Præsentia calorem, acrimoniam, mordacitatēque sanguinis remittunt, aliqualitèrque sanguinem refrigerant, & ad motum ineptiorem hac ratione reddunt.

AVERTENTIBVS.

Venæ sectio fiat basilicæ aut cephalicæ eiusdem lateris, si æger adhuc non sit resolutus, & per interualla repetatur, ter vel quater scilicet in die, & potissimum vbi copia sanguinis aut eiusdem acrimonia huius mali causa est; tunc enim nullum aliud remedium huic quasi par reperitur, efficacissimè enim in contrarium reuocat sanguinem, neque antea instituetur quàm moderata sanguinis quantitas effluerit.

Ligaturæ dolorificæ extremarum partium fiant.

Cucurbitulæ statim post vincula scapulis, ceruici, hypochondriis applicentur, etiam cum scarificatione.

Frictiones brachiorum manuumque validæ fiant deorsum.

Sanguisugæ applicabuntur post aures, aut sedi, si hæmorrhoides fluere consueuerint, & suppressæ sint.

Fotus & immersiones in aqua calida partium extremarum fiant.

Timor subitaneus incussus ex iniectione aquæ frigidae, præsentaneum aliquando est remedium; ad interiora enim corporis reuocatur sanguis vnà cum spiritibus atque calore à circumferentia.

In istis instrumentis præcipua curationis spes consistit, quare ab istis auspicari cogimur sæpius ipsam curam.

VACVANTIBVS.

Syr. de multiplici infusione rosarum.

Rhabarbari infusio. Decoctum ex rhabarbaro, myrobalanis citrinis.

Manna.

Potus ex decocto epithymi, polypodij, senæ, myrobalan. Indorum, florum violarum, nymphææ, seminum plantaginis, melonum, cidoniorum, syr. de epithymo, fumaria addita.

Agaricus.

Sena, myrobalani kebuli.

Venæ sectio, vt prædictum est.

Si fluxus sanguinis narium det inducias, modoque vitiosus existat, hisce purgantibus vtemur medicamentis post sistentium & auertentium vsum. Alioqui erit quasi omnium primò in opus deducenda hæc intentio, cum vt plurimum ab acri mordacique sanguine fiat hic fluxus. Deligemus autem medicamenta priori loco posita, si plurimum biliosus fuerit sanguis; sequentibus autem, si nimium sit aquosus, aut melancholicus.

SISTENTIBVS *sanguinem fluentem.*

Trochisci de terra sigillata, potati cum aqua plantaginis, aut temporibus cum succo plantaginis, & oui candido illiti.

Trochisci de succino, de spodio.

Conserua rosarum, violarum, nymphææ, cidoniorum addi.

addito bolo Armeno, corallo, cornu cerui vsto, seminibus plantaginis.

Syr. nymphææ, rosarum siccarum, cidoniorum, de papauere, linonum, oxalidis, granatorum, myrtulorum.

Aquæ iam dictorum.

Potus ex aqua plantaginis, portulacæ, bursæ pastoris, caudæ equinæ, bolo Armeno, terra sigillata.

Decoctum ex lactuca, malicorio, balauistiis, gallis.

Achanasia recens, myclera, phylonium Romanum cum succo plantaginis, tum somnum accersunt, tum fluxum sedant.

Opium, papauer, camphora, semen semperuiui, lactucæ ingrossant & congelant sanguinem.

Equiseti radix contundatur, naribusque indatur, aut succus porri, vrticæ, basilici, plantaginis, caudæ equinæ, bursæ pastoris, millefolij, sanguinaræ, aut acetum generosum calens spongia excipiatur naribusque indatur, aut aceti accerrimi vapor, qui ex iniectione eiusdem aceti in lapidem molarem candentem excitatur, naribus excipiatur.

Irrigationes vel perfusiones fiant faciei atque frontis cum aqua frigidissima, aut rosacea, quæ testiculis etiam applicari potest cum commodo. Aut frontis irrigatio fiat cum aceto spongiaque.

Spongia acerrimo aceto bene irroretur, piceque liquida vndique oblinatur, comburaturque in terreo vasculo donec in puluerem transeat, qui per se inflatur naribus, aut liquidis medicamentis permiscetur.

Nasalia vel anacollemata fiant ex aloë, thure, bolo Armeno, stercore asinino vsto, testis ouorum, reliisque pannorum vstis, méthæ sicca, gypso, caseo veteri, bolo Armeno, sanguine draconis, succo polygonij, plantaginis, candido oui. Ex iis licimia vel penicilli fiant, naribusque indantur cum pilis leporinis.

Escharotica fiant ex chalcantho, tartaro, chalcitide, calce viua, quibus adstringentia aliqua addemus, melius enim eschara hærebit.

Vnguentum ex oleo rosaceo, violaceo, nymphææ, cera-
to sandalino, aceto.

Cataplasma fiat ex bolo Armeno, cauda equina, bursa
pastoris, portulaca, terra sigillata, semperuiuo, hæma-
tite, aqua rosacea, aceto, ouique candido, pro tempo-
ribus atque fronte.

Colli lateribus, nec non fronti & temporibus, venis-
que sanguinem profundentibus etiam distantioribus,
apponemus præsentia medicamenta, & hoc quidem
postquam sanguinis impetum auerterimus; non autem
à principio hæmorrhagiæ; periculum enim esset ne in
caput, asperam arteriam, pulmones, aut ventriculum
ruat sanguis; sicque suffocetur æger, aut conuellatur.
Horum autem aliqua sanguinem narium sistunt, virtu-
te adstrictoria qua prædita sunt, qua sanguinem con-
densant, ineptioremque ad fluendum reddunt. Alia id
efficiunt sua frigiditate, ut est lactuca, papauer, opium.
Alia id præstant, eo quod venarum hiantium ora glu-
tinare possunt, ut est thus, albumen oui, gummi Arabi-
cum, aliaque similia. Nonnulla verò occulta propieta-
te sanguinem sistunt, ut est succus porri, menthæ. Alia
verò id perficiunt crustam operculi vice inducendo,
cauterisandoque; ut est arsenicum, calx viua, vitriolum.
Hisce quinque medicamentorum generibus sanguinis
narium fluxus immòdicus moderari poterit. Illa autem
medicamenta quæ astringunt & refrigerant, per os su-
mi possunt, vel naribus immitti, aut collo, fronti, vertici
capitis, testibus, lumbis, linamentis iis immerfis,
leuiterque expressis, admo-
ri poterunt.

THEO-

THEORICA ET EMPIRICA MEDICAMENTA nobilia in HÆMORRHAGIA, sæpius cum summa salute plurimorum egrotorum à Gualtero Bruel experta.

CURATIO HÆMORRHAGIÆ.

℞ syrupi violati, nymphææ, myrtini, cidoniorum, papaverini ana ℥ j. aquarum plantaginis, bursæ pastoris ana ℥ iiij. oxalidis, rosarum ana ℥ ij. β. misceantur, fiat *Iuleb.* dentur vnciæ quatuor per tres dies mane & vesperti.

℞ radicum & foliorum plantaginis m. j. f. rosarum rubrarum, bursæ pastoris ana m. j. seminum lactucæ, porulacæ, plantaginis ana 3 ij. coquantur in aqua chalybeata ad tertiæ partis consumptionem, addendo colaturæ syrupi nymphææ, cidoniorum, papaverini ana ℥ j. dentur ℥ iiij. cum 3 β. trochiscorum de terra sigillata; fiat *Potio.*

℞ radicum plantaginis ℥ ij. myrobalanorum Indorum 3 iiij. agarici albi & levis 3 ij. β. epithymi, fumariz ana m. j. polypodii quercini, senæ Alexandrinæ ana 3 iiij. rhabarbari electissimi 3 ij. sebesten, tamarindorum ana 3 ij. β. coquantur in aqua q. s. ad tertiæ partis consumptionem; colaturæ addantur syrupi rosarum laxativi ℥ iiij. fiat *Potio.*

℞ aquæ frigide ℥ iiij. aceti ℥ ij. sacchari, aquæ rosaceæ ana ℥ j. fiat *Hauftus* pro duabus vicibus.

℞ confervæ nymphææ, rosarum ana ℥ j. trochiscorum de spodio, de terra sigillata, de succino ana 3 ij. β. boli Armeni, seminum plantaginis ana 3 j. sacchari rosacei ℥ j. β. syrupi papaverini, nymphææ ana q. s. fiat *Mixtura.*

℞ lapidis hæmatitis, coralli rubei, gummi Arabici assati ana 3 j. rosarum rubrarum 3 β. rhabarbari modicè

affati \mathfrak{z} j. diatragacanthi frigidi ad pondus omnium, fiat *Pulus* tenuis, dosis \mathfrak{z} ij. cum syrupi cidoniorum \mathfrak{z} j. aquarum plantaginis \mathfrak{z} iij.

\mathcal{R} athanasie Nicolai \mathfrak{z} β . sacchari rosacei, conseruæ rosarum ana \mathfrak{z} j. fiat *Mixtura*.

\mathcal{R} aquæ rosarum, portulacæ, plantaginis, acetosæ, intubi ana \mathfrak{z} iij. seminum portulacæ, acetosæ, intubi ana \mathfrak{z} j. trochiscorum de caphura, sandalorum citrinorum ana \mathfrak{z} ij. aceti parum, fiat *Epithema* pro hepatis regione, admodum enim impetum sanguinis e naribus sistunt frigida medicamenta hepati cautè admota, modò ab hepate sanguis ad nares mittatur. Idem de liene iudicium esto.

\mathcal{R} radicum & foliorum plantaginis, bursæ pastoris, polygonii ana m. iij. coquantur in aqua q. s. ad lb. iij. adde colaturæ aceti optimi lb. j. \mathfrak{s} . fiat *Fomentatio* cum spongia, pro pedibus, manuúmque volis, & hepatis regione. Pannii verò intincti applicentur venis iugularibus temporibus atque fronti.

\mathcal{R} trochiscorum de carabe \mathfrak{z} j. radicum equiseti \mathfrak{z} ij. \mathfrak{s} . boli Armeni, sanguinis draconis ana \mathfrak{z} \mathfrak{s} . thuris \mathfrak{z} j. \mathfrak{s} . aloës \mathfrak{z} ij. \mathfrak{s} . albumine oui incorporentur, penicilli que fiant e tenuissimis pilis leporinis, prædictis intinge, naribusque indatur. eius vsus erit post sectionem venæ, cucurbitularum vsum, partiúmque extremarum ligaturas; periculum enim est alioqui ne ad asperam arteriam, in stomachúmve aut ad interna capitis ruat sanguis.

\mathcal{R} aloës \mathfrak{z} ij. thuris \mathfrak{z} iij. camphoræ gr. v. opii (in magna necessitate) gr. ij. cum albumine oui incorporentur, naribusque modo iam dicto indantur. Vcl cinis testæ ouorum in nares insuffletur.

\mathcal{R} caudæ equinæ m. ij. bursæ pastoris, plantaginis ana m. j. addatur contusis boli Armeni \mathfrak{z} j. \mathfrak{s} . aquæ rosacæ & aceti nonnihil, linteolòque excepta fronti applicentur & temporibus.

\mathcal{R} cinetis testæ ouorum \mathfrak{z} iij. florum balaustiorum, mali-

malicorij, boli Armeni, gallarum ana ʒ se. seminis papaveris albi ʒ ij. cum aceto & albumine oui incorporentur, fiat *Cataplasma*, fronti, temporibus, venisque iugularibus accommodetur.

℞ lapidis hæmatitis, boli Armeni, terræ sigillatæ ana ʒ j. se. succi caudæ equinæ, portulacæ, polygonij, semperuiui ana ʒ se. albumina ouorū duo, aquæ rosacæ & acetī parum; fronti, temporibus atque testiculis applicetur.

℞ olei rosacei, cidoniorum, succi cidoniorum ana ʒ j. boli Armeni, balauſtiorum ana ʒ se. gallarum ʒ j. ceræ & acetī parum, fiat *Vnguentum* pro venis iugularibus, fronte, temporibusque, coquantur autem olea & succi, ad succorum consumptionem placidissimo igne, alioqui coire non possunt in formam vnguenti, propter succorum aquositatem, quæ oleis commisceri nequit.

APPENDIX

ad prædicta pro curatione HAEMORRHAGIAE inserviens.

Omniū primò venæ sectio fiat in magna sanguinis abundantia. Si autem plus sanguinis per nares affluerit quàm ut venâ cubiti secari possit, eius loco cucurbitulas magnas hypochondriis affigemus, necnon scapulis atque cervici, ligaturæque instituentur, necnon frictions artuum. Lotionibus quoque pedum cum aqua calente sanguinē fluentem ad alias corporis partes auertemus. Demū acres humores sanguini permixtos naturæ obediētes reddemus, quos tandem purgante medicamento e corpore propellemus. Hinc sanguinem fluentem sistemus partes aegras corroborabimus, à quibus sanguinem fluere omnium primò augurari licet. Naribus autem, fronti, iecori, necnon lieni talia admouebimus medicamenta. Hic autem neque narcoticis, neque escharoticis medicamentis utemur, nisi summa necessitate coacti fuerimus, tunc enim athanasiae ʒ ij se. imperabimus; aut ex vitriolo, gypso, mastiche puluerem faciemus, & in nares insufflabimus, aut penicillis excipiemus. In omni quasi sanguinis e naribus profluvio

medicamenta placide refrigerantia hepati accommodabimus, plurimum enim profunt. Optimum autem est epithema iecori si fiat ex seminibus intubi oxalidis, sandalis, aqua rosacea, cichorei, aut cerato sandalino aliquid addetur olei nymphaeae fiatque linimentum molle.



Methodus pro cognitione

C A T A R R H I I N S E R - V I E N S .

DESTILLATIO communiter sumpta, est defluxus humorum seu excrementorum è capite cerebro in subiectas corporis partes. Cerebrum quidem cum natura sua frigida & humida sit natura, multoque eget ob molis magnitudinem alimento, plurima excrementa procreat. Id quoque promouebit leuis eius intemperies frigida atque humida: propter situm quoque vapores eò facile ascendunt, hi-que condensati, à cerebro propter substantiae eius raritatem, facile suscipiuntur. Prout autem excrementa huiusmodi superflua in hanc aut in illam corporis partem propelluntur, sic appellationem suam hoc mutat malum. Contingit enim huiusmodi excrementa in interioribus cerebri receptaculis aliquando, & frequenter quidem (quamdiu in quantitate non multum peccant) in anterioribus ventriculis cerebri quiescere, omniumque promptissime per palatum expurgantur tunc. Aliàs verò contingit ea diffundi per cerebri loca diuersa, cum nimirum immodicè exuperant; tuncq; partim per nares, partim per palatum, aliquando etiam per aures, aliàs etiam per oculos excluduntur. Sæpe quoque prolabuntur in interiores corporis sedes, ut in pectus, pulmonem; vnde peripneu-

pneumonia, asthma. Aliàs in asperam arteriam faucés-
que ruunt, vnde raucitas. Subinde in ventriculum de-
uoluuntur, tuncque assumpta alimenta corrumpuntur,
appetitus concoctioque subuertitur. Aliquando etiam
lyenteriam excitant, vti dum in intestina prolabuntur,
vnde fit alui profluuium. Nonnunquam huiusmodi ex-
crementa colliguntur extra caluariam sub capitis cute,
idque sæpe in vertice percipitur capitis, vbi extrema-
tes venarum, faciem temporaque perreptantes, desi-
nunt. Frequenter enim, dum excrementorum inutili
copia onerantur hæc vascula, in hæc loca se exonerant
per plures etiam dies; vnde in externas corporis partes
subiectas paulatim viam sibi sua tenuitate parant, quæ
sensim tamen crassescit calore partis à qua excipitur; vn-
de sæpe procedit dolor lateris, lumborum, brachiorum,
spatularum, oculorum, dentium, humerorum, adenum,
coxendicis, crurum, diuersorumque articulorum. Potis-
simùm autem hic agimus de ea fluxionis specie quæ in
pulmones fit.

PARS AFFECTA. magna ex parte est cerebrum, id
quod ex actionibus legis patet; item per ea quæ excer-
nuntur per os, per nares, per palatum, tuncque magis est
continuum malum, neque per sentitur alicuius alterius
partis subiectæ offensa à qua foueri posset. Dum verò
ab aliis fit corporis partibus, ex propriis signis intellige-
tur, est autem symptoma pertinens ad excretionem im-
modicam.


SIGNA. In pulmones si feratur capitis excremen-
tum, spirandi difficultatem magnamque tussim excitat.
Titillatio quoque frequenter in gutture sentitur, por-
tioque aliqua ipsius humoris illapsi sputo reiicitur, tem-
porèque concurrit corporis lassitudo, capitis grauitas,
calor atque sitis. Urina intensi sæpe est coloris. Si in a-
speram arteriam faucésve ruat, tussiculam raucitatẽ-
que affert; loca denique iam dicta exasperat.

CAUSA. Aliquando est intemperies cerebri calida,
quæ humores in cerebro dissoluit atque extenuat, plu-

resque vapores à subiectis partibus attrahit quàm concoquere aut per halitum expellere possit. Hanc autem intemperiem cerebri adesse significabunt ætas, regio, anni tempus, temperatura calida, nasus faciesque rubicunda, partes capitis calidæ, temporum arteriæ multum pulsantes, acris tenuisq̃ue humor qui subinde per os aliàs etiam per nares excernitur, febris sæpe comitatur, cibi concurrit fastidium. Multò autem frequentius causa catarrhi est magna cerebri imbecillitas, necnon intemperies cerebri frigida atque humida, tuncque contingit alimentum ad cerebrum transmissum non probe digeri, atque hinc superfluitates aggregari quamplurimas; unde magnus in cerebro fit excrementorum proventus. Huius constitutionis signa sunt ætas, anni tempus, victus ratio, temperaturaque frigida, pituitosorum crassorumque humorum per nares excretio, eorumdemque multitudo, ad somnum inclinatio, distentio, necnon grauitas capitis & frontis, faciei pallor, grauans obstructio in viis narium. Victus ratio humidior aque intemperata fuit. Idem fit ab omnibus vaporibus copiosis qui caput immodicè replere possunt. Vapores enim condensati in subiectas partes tandem protruduntur. malum hoc quoque auget crapula, nimiaque repletio, & præsertim à potentibus vinis orta. A somno immodico. Item ob debilitatem virtutis digestiue, necnon expulsiue ipsius cerebri oritur, siue hoc à principio generationis, siue ex aliqua longa cerebri ægritudine contractum sit; sic equidem contingit alimentum adductum, crudum quasi relinqui, & in corpore ob debilitatem virtutis expulsiue subsistere.

PROGNOSTICA. Si ex capite in nares distillet humor, leue est malum; si in fauces, peius; si vero in pulmones, pessimum est: exulcerationis enim pulmonum periculum est, unde tabes, corporisq̃ue consumptio. Cunctæ quoque destillationes breues si neglectæ fuerint, longæ tandem sunt. A periculo omnino non sunt tuti sæpius catarrhum incurrentes: variis enim obnoxij
sunt

sunt ægritudinibus, minatur equidem apoplexiam, pleuritidem, cæcitatem, dentium dolorem, phthisim, paralyfim; surditatem, anginam, mortem subitanam, apostema pulmonum, iecoris, vesicæ, renum, oculorum, stomachi dolorem atque debilitatem, schiaticam, podagram, diarrhœam, colicam. Magis catarrho obnoxij sunt, frigidum imbecillumque habentes cerebrum. Catarrhus quoque cum capitis continuo dolore, est difficilis curæ. Autumnale autem tempus maximè est destillationibus obnoxium propter cæli mutationes frequentes.



Methodus pro curatione

C A T A R R H I I N S E R -
V I E N S.

*Perficitur autem subsequenter remedium
generibus.*

V I C T U S R A T I O N E.

A Er calidus sit modicè: ventosus autem, pluuiosus, Aquilonaris atque Austrinus vitetur. Cibus sit concoctu facilis, bonumque succum generans: ut sunt oua sorbilia, carnes gallinarum, pullo- rum, caponum, vitulinæ. Moderata autem sit cibi quantitas. Sit quoque cœna parcior prandio. Sub finem autem refectionis detur carnis cydoniorum portio aliqua, inhibet enim vaporum ascensum ad caput. Admittuntur inter fructus pruna, vix passæ, amygdala dulcia. Potus sit vinum aquosum, aut aqua malsa, aut aqua in qua cinnamomum atque glycyrrhiza sint decocta.

L iiij

Parum autem bibat, sitimque subinde data opera patiatur.

Somnus sit moderatus, non diurnus. Tegmen capitis admittatur tale, ut neque frigore neque calore caput molestetur, cum, tam frigus quam calor morbum exasperet.

Excrementa alui indies respondeant.

Motus vitetur immodicus.

Animi perturbationes vitentur.

PRAEPARANTIBVS.

Syr. violarum, glycyrrhizæ, ziziphorum, de rosis siccis, papauerinus, nenupharinus.

Decoctum quatuor seminum frigidorum communium, florum cordialium, papaveris albi.

Aqua violarum, cichorei, rosarum.

Decoctum hordei, aqua frigida.

Mel rosaceum, oxymel simplex, compositum, squilliticum.

Syr. de betonica, stœchados, capilli Veneris, de hyssopo, glycyrrhiza, de duabus radicibus, de prasio.

Decoctum radicum glycyrrhizæ, fœniculi, acori, cyperei, cinnamomi, betonica, hyssopi, maioranæ, capillorum Veneris, saluæ, rorismarini, buglossæ, serpylli, florum stœchados, nucis muscatæ, vuarum passerum, ficuum.

Aqua capillorum Veneris, hyssopi, scabiosæ, saluæ, betonicæ, adianthi.

Prioribus, dum à calida, posterioribus verò dum à frigida sit materia ipse catarrhus, utemur.

VACVANTIBVS.

Venæ sectio fiet humerariæ, aut medianæ, si anginae aut pleuritidis, febrisve aut suffocationis periculum impendeat, si vires permiserint, sanguineque abundauerit æger.

Electuarium de succo rosarum, diaprunum scammoniatum, diaphœnicum.

Pillulæ aggregatæ, aureæ, assaieret, mastichinæ, cochinæ, de agarico, de sarcocolla.

Agariæ

Agaricus trochiscatus, cassia, tharbarbarum, polypodium.

Syr. de multiplici infusione rosarum.

Electuarium Indum, diacatholicum.

Clystere validum plurimum proderit in catarrho vehementi, periculumque suffocationis minante, & decocto florum stœchados, maioranæ, saluæ, calaminthæ, origani, maluarum, hordei, hiera picra, melle rosato, oleo violarum.

A validè purgantibus medicamentis hic abstinemus, ne materiam grauantem magis ad fluxum irritemus.

AVERTENTIBVS.

Venæ sectio. Clystere prædictum. Vacuantia medicamenta.

Cucurbitulæ brachii, scapulis, natibusque affixæ.

Sudor excitatus cum decocto salsæ parillæ.

Frictiones extremarum partium, potissimum pedum, non capitis, & eorum continuus motus; trahitur eundem materia ad inferiora.

Ligaturæ dolorificæ.

Sternutamentum ex elleboro, castoreo, pipere, in principio tamen non conuenit, cum ex humorum motu eorum digestio prohibeatur.

Apophlegmatismi ex pyrethro, pipere, hyssopo, mastiche, cortice radicum capparorum, cubebis, vuis passis.

Gargarismus ex maiorana, hyssopo, origano, si tamen materia ad pulmones aut ad pectus ruat, aut si multum materiei sit subtilis, multumque moueatur, à gargarismate abstinemus, iis enim in calibus suspectus est vsus.

Eirhina ex succo ireos, betæ, maioranæ, cyclamine, pyrethro, semine melanthii, in materia frigida, ex succo violarum, aqua hordei, in calida.

L. iiij.

Lotiones crurum, brachiorum.

Narium emunctiones fient sæpe; sic enim tutius humores crassi necnon tenues expurgantur, quàm per sputum.

Cauterium in commissura coronali, aut post aures excitabitur prius raso capite, seruabiturque vlcus diu apertum, in quem finem caulium folia calida, & axungia porcina iuncta superponentur.

Auententia localiaque hæc medicamenta cerebrum purgantia, capiti adhibenda non erunt, priusquam materia bene digesta atque euacuata erit; alioquin enim materiam catarrhalem potius ad motum irritarent.

SISTENTIBVS ipsum catarrhum.

Phylonium Mes. cum decoctione olibani, rob nucum, conserua rosarum antiquarum, saccharum violatum, dianucum.

Diacodium, diapapauer, diatragacanthum frigidum & calidum, pillulæ de cynoglossa, loch de caulibus.

Loch de papauere, bolus Armenus, succus glycyrrhizæ, trochisci bechici, mastix.

Syr. violarum, papauerinus, glycyrrhizæ, iuleb violarum.

Decoctum ex plantagine, portulaca, hordeo, papauere albo, rosis, bolo Armeno, gummi iuniperi, addendo diacodium.

Pillulæ quæ ore retinebuntur ex rosis siccis, semine papaueris, camphora, terra sigillata.

Spica nocturno tempore in ore detinebitur.

Nigella & cuminum torrefiant, linteoloque concludantur: odoramentumque fiat.

Suffumigium cum sola nigella puluerisata, torrefactaque.

Vnguentum ex oleo rosaceo.

Emplastrum pro capite raso ex terra lemnia, rosis, plantagine, bolo Armeno.

Nisi grauiora vrgeant symptomata, præsentibus non utemur quoque medicamentis ante humorum purga-

uo-

tionem, eorundemque auersionem. Verum si materia immodicè ad pulmones fluat, ita ut tussim molestant, aut insomnia diuturna, aut periculum suffocationis, aut excoriationis, ob materiei acrimoniam minetur, statim hisce sistentibus medicamentis utemur non expectando humorum purgationem, eorundemve auersionem: vix enim sperare licet tenuem catarrhum tanta copia tantoque impetu ad pulmones ruentem posse purgantibus medicamentis educi, aut auerti, cum potius inotum humorum augeant purgantia medicamenta, auertentiaque. Eodem quoque tempore venæ sectionem, necnon cucurbitularum applicationes instituenius ipsis spatulis. Grauib. ergo concurrentibus symptomatibus, ea quæ sanguinem incrassare, catarrhumque sistere possunt, potius offeremus, etiamsi sputi educationem remorentur aliquantulum, periculum enim aliàs suffocationis impendebit.

CORROBORANTIBVS caput, & digerentibus reliquias, intemperiemque relictam emendantibus.

Diamuscum dulce & amarum, diambra, theriaca, Mitridatum mediocris ætatis, plirisarcoticum.

Conserua saluæ, betonicæ, rorismarini, acori, cortices citri conditi, nux muscata, cubebæ, nigella Romana.

Radices cyperi, macis, caryophylli, stœchas, gallia moscata, lignum aloës, ladanum.

Globulus odoriferus, ex caryophyllis, gallia moscata, nuce muscata, styrace, calamintha, ladano, cubebis, tragacantha, aqua maioranæ.

Cucupha aut pileolus ex foliis lauri, origani, saluæ, betonicæ, maioranæ, seminibus nigellæ, camomilla, meliloto, stœchade, thure, mastiche, cinnamomo, mace, nuce muscata, caryophyllis, rosis rubris.

Lotio capitis ex decocto rerum prædictarum in vino maluatico.

Suffitus ex caryophyllis, cinnamomo, ligno aloës, ro-

remarino, salvia, foliis lauri, maiorana, mastiche, thure, gallia moscata, moscho.

Sacculus ex sale, milio, furfure, salvia, maiorana.

Vnguentum pro capite raso, ex oleo rutaceo, anethino: & pro pectore, ex oleo liliorum, camomillæ, amygdalorum dulcium, lini, butyro recenti.

Frictiones foris que capitis, fient cum linteolo aspero calente, quod vaporibus thuris, mastichis, styracis, ladanii imbuetur.

Cauterium anteriori capitis parti ex cantharidibus, fermento applicetur, si prædictis non aboleatur malum.

THEORICA ET EMPIRICA MEDICAMENTA nobilia in CATARRHO, sæpius cum summa salute plurimorum agrotorum à Gualtero Bruel experta.

CVRATIO CATARRHI.

℞ betonicæ, maioranæ, salviæ, rutæ ana m. j. β. florum rorismarini, stœchados, centaurei minoris, camomillæ ana m. j. origani, calaminthæ ana m. β. furfuris m. j. coquantur in aqua q. s. ad lb j. β. colaturæ addatur electuarii elefcopi ℥ j. hieræ picræ simp. ℥ j. diaturbith cum rhabarbaro ℥ iij. β. mellis rosati ℥ j. olei rutacei ℥ iij. salis ℥ j. fiat *Clystere*.

℞ mellis rosacei, oxymellis simplicis, syrupi stœchados, glycyrrhizæ ana ℥ j. aquarum rorismarini, betonicæ ana ℥ iij. hyssopi ℥ ij. misceantur, fiat *Ulex*.

℞ pillulæ de agarico ℥ β. cochiarum, fœtidarum ana ℥ j. diagridii gr. iij. syrupi violati q. s. fiant *Pillulæ* septem aut octo numero.

℞ diaturbith cum rhabarbaro ℥ v. electuarii Indi, diacatholiconis ana ℥ j. syrupi stœchados ℥ β. aquæ ma-
iora-

ioranæ, betonice ana ʒ j. β. fiat *Haustus*.

℞ succi brassicæ, betæ ana ʒ j. β. succi cyclaminis ʒ β. piperis albi, nigellæ ana ʒ j. misceantur, naribusque illinantur, cum periculum est ne in asperam arteriam ruat catarrhus.

℞ maioranæ, nigellæ, nucis muscatæ ana ʒ j. β. pyrethri, ellebori albi ana ʒ j. misceantur, fiat *Pulvis* sternutatorius; attrahatur per nares, vel calamo impellatur.

℞ seminum staphisagriæ, sinapi, pyrethri ana ʒ j. s. acori conditi, cubebarum, maceris ana ʒ j. nigellæ Romanæ, vuarum passerarum, mastiches ana ʒ j. β. mellis q. s. fiant *Pastilli* mansiles, lineo panno raro concludantur.

℞ seminum sinapis, piperis ana ʒ ij. radicum pyrethri ʒ j. zinziberis ʒ β. coquantur in aqua q. s. ad tertias; fiat *Gargarismus*: ad os humores auocat fluentes in pulmones.

℞ syrupi de rosis siccis ʒ iiij. rosacei, myrtilorum ana ʒ j. aquæ violarum, plantaginis, hyssopi ana ʒ iiij. fiat *Iuleb*.

℞ rosarum rubrarum m. j. seminum papaueris albi, olibani ana ʒ j. β. coquantur in aqua q. s. ad t̄b j. colaturæ adde syrupi papauerini ʒ iiij. glycyrrhizæ ʒ ij. fiat *Tulapium*.

℞ conseruæ rosarum antiquarum ʒ j. diacodii ʒ β. diatragacanthi frigidi ʒ iiij. syrupi rosarum q. s. fiat *Linctus*.

℞ olibani, mastichis ana ʒ s. carnis cydoniorum ʒ j. β. sumat in ingressu lecti ʒ ij. superbibendo vini haustum.

℞ boli Armeni, terræ sigillatæ, mastiches ana ʒ ij. succi glycyrrhizæ ʒ s. conseruæ rosarum ʒ ij. fiat *Mixtura*.

℞ diacodii ʒ β. syrupi papauerini ʒ j. aquarum betonice ʒ ij. fiat *Haustus*.

℞ diacodii ʒ vj. syrupi papauerini ʒ ij. boli Armeni ʒ

ij. camphoræ 3 j. detineat in ore cochlear vnum aliquoties. aut,

℞ seminum papaueris albi, lactucę ana 3 iij. amyli, diatragacathi frigidi ana 3 j. gummi Arabici, tragacanthi, boli Armeni ana 3 ij. opii 3 j. ꝑ. sacchari rosacei, succi glycyrrhizę ana 3 j. ꝑ. misceantur, fiat *Massa solida* cum succo cydoniorum & aqua infusionis gummi tragacanthi. Huius massę portionem aliquam detineat ore, vt fluxus catarrhalis prohibeatur.

℞ corticum granatorum 3 ꝑ. iaccę nigrę m. ij. radicum ebuli, plantaginis ana m. j. gallarum, thuris, mastiches ana 3 j. rosarum m. j. seminum portulacę 3 ij. coquantur in aqua q. s. ad lb. j. ꝑ. colaturę adde syrupi myrtilorum, diamori, stœchados ana 3 j. fiat *Gargarismus*, humores fluentes in asperam arteriam, sistit.

℞ boli Armeni, sanguinis draconis, thuris ana 3 j. sty-racis, mastiches ana 3 ꝑ. bulliant in lb. ꝑ. aquę mellis, colaturę portio naribus attrahatur.

℞ thuris, olibani ana 3 j. ꝑ. rosarum rubrarum 3 ij. seminis papaueris albi 3 ꝑ. sandaracę, mastichis ana 3 ij. cum vino astringenti; fiant *Pillule* pro suffumigio, quo capitis tegumenta suffumigabuntur.

℞ conseruę, roris marini, betonice, saluię ana 3 vj. ꝑ. diamusci dulcis 3 iij. theriacę veteris 3 ij. diambre 3 j. nucis muscatę 3 j. ꝑ. syrupi stœchados q. s. fiat *Electuarium* molle.

℞ ꝑ. diamusci dulcis, diambre ana 3 ij. ꝑ. sacchari al-bissimi dissoluti in aqua roris marini & betonice q. s. fiat *Electuarium* in tabulis. Radices dracontę assatę plurimum iuuant.

℞ radicum aristolochię rotundę, pyrethri, spice ana 3 ꝑ. ligni aloës, thuris, caryophyllorum ana 3 ij. mastichis 3 j. ꝑ. fiat *Puluis*, cuius portio aliqua carbonibus iniiciatur, vt tegmina capitis vaporibus fumosis imbuantur.

℞ florum betonice, rosarum, stœchados, camomillę,

læ, meliloti ana m. j. thuris, mastichis, nucis muscatæ, macis, caryophyllorum ana 3 j. foliorum lauri, origani ana m. β. fiat *Sacculus* è serico panno, cui prædicta tenuiter comminuta imponantur, coronaliq̃ue commissuræ applicentur. aut,

℞ furfurum, milii ana m. j. salis puluerisati 3 j. β. torrefiant omnia nonnihil in sartagine, fiat *Pileolus*, capitisq̃ue commissuræ accommodetur: cerebrum roborat, humoresq̃ue exsiccat.

℞ nigellæ Romanæ torrefactæ 3 ss. radicum cypri 3 j. ss. florum stœchados, rosarum ana m. ss. nucis muscatæ, caryophyllorum ana 3 iij. fiat *Pulvis*, quo anterior pars capitis aspergatur sub ingressum lecti.

℞ nigellæ torrefactæ 3 j. sinapis torrefacti, thuris ana 3 v. mastichis 3 iij. stercoreis columbini, farinæ hordei ana 3 j. oxymellis squillitici q. s. fiat *Emplastrum* pro committura coronali.

APPENDIX

ad prædicta pro curatione CATARRHI
inseruiens.

Clysterio leni primò sentina corporis eluatur. Deinde humores naturæ obediētes reddantur. Hoc ubi consecuti fuerimus, purgantibus medicamentis humores grauantes e corpore propellimus. Tandem caput purgabimus errhinis, apophlegmatismis, sternutamenta prouocantibus, cauterio actuali aut potenciali, admocebimúsque anteriori parti capitis ubi digitus maximus desinit cū manus radix naso admoetur. Vesiculæ autem ubi excitatæ fuerint, perforabuntur ut humor aqueus effluat, in quem finem folia brassicæ superponemus ipsis vesiculis ruptis. Demum quæ humorum fluxum prohibere possunt, conueniunt, quibus etiam statim à principio locus erit si suffocationis periculum impendeat ex catarrhi vehementia. Prædictis demum medicamentis substitui debent quæ cerebrum roborare, reliquias-

que consumere possunt, quod fiet tam sumptis quàm admodis medicamentis. Quæ omnia nunc anteaque dictis medicamentis facile consequi poterimus, modò uniuersalia particularibus debita ratione accommodentur. Pillulæ autem conuenientes etiam mox à principio in catarrho suffocante imperabuntur; in mora equidem periculum est. Si ad nares, aut ad os labatur aquosa substantia, ferro lateriue candenti acëtum rosaceum, cui puluis rosarum rubearum permisceatur, instilletur, fumumque naribus atque ore excipiat.



Methodus pro cognitione

ANGINÆ INSER- VIENS.

ANGINA, est faucium seu summæ gulæ partium inflammatio, anhelitum atque deglutionem impediens, nullo etiam vitio existente in pectore aut pulmone. Malum istud strangulatu præsentaneum periculum minatur, eò quod summæ gulæ gutturisque partes quasi occludantur, per quas homo spiritum, potum, alimentumque admittit. Subitò autem hoc malum irruere solet; per viam enim defluxus fit magna ex parte.

PARS AFFECTA. In hoc malo afficiuntur sæpe musculi gutturis interni, maximòq; cum periculo tunc laborat æger: hæcque signa concurrunt, dolor vehemens est in gutture, febris etiam aliquando valida concurrit. Spiritus non nisi recta ceruice trahitur, vox etiam læditur. Nullum indicium apparet caloris neque tumoris in ore, neque in faucibus, neque in ceruice: angustia verò magna percipitur in gutture, aperto sæpe ore hiant, aëreque frigido reficiuntur; aliquando etiam linguam exerunt, oculi rubent prominentesque fiunt, re-

refluit per nares potio, varie iactantur. Aliàs verò externi gutturis muscoli afficiuntur, estque omnium lenissima species; tunc dolor tantus non est circa guttur, nec tanta angustia spirandi que difficultas viget. Sæpe visus atque tactus tunc malum deprehendit. Si verò fauces locūve vbi aspera arteria & gulæ partes extremæ cœunt, afficiantur, tunc minus difficulter spirat: præterea calor, tumor, dolor, atque pondus in faucibus magis percipitur, imò etiam visui exposita sunt si lingua depressatur, minori que fit cum periculo quam prima species. Aliàs fit in pluribus partibus simul; & tant interni quam externi muscoli afficiuntur, tuncque omnia magis intenduntur.

SIGNA. Difficultas comitatur spirandi, nullo vitio in pulmone aut pectore existente, dolor concurrit acutus, nec non rubor faciei & colli. ægrè alimentum potionemque transglutire potest æger, in tantum quidem difficulter, ut potus per nares etiam refluat, sæpe febris adest, apertoque hiant ore, frigidum aërem attrahere expetentes. Aliquando etiam vbi validius malum viget, linguam exerunt.

CAUSA. Maiori ex parte fit à sanguine qui per modum defluxus è venis iugularibus in quibus est magna copia, eò deriuatur. Pulsus erit plenus tunc & undosus, transglutiendi spirandi que erit maxima difficultas; rubedo in lingua atque facie excitatur, febris multum molesta concurrit. Sæpe præcessit victus ratio multum sanguinis generans, verò temperatum, calidum, humidumque. Si à bilioso sanguine fiat, febris fit admodum acuta, incendiumque intolerabile, spirandi quoque & transglutiendi concurrit difficultas, angustia tamē minor est, oris adest amaritudo, victus ratio, ætas, temperamentum, regio, aliaque concurrunt quæ bilem generare solent. Si verò à fluxione frigidi humoris fiat, notha angina excitabitur. Multa tunc in ore adest humiditas & viscositas, febris nulla aut saltē admodum erit exigua, dolor multo mitior, tumor est laxior, minusque rubet, ea

quæ pituitosum sanguinem generare possunt, præcelsent. Semper autem à fluxionibus malum istud originem habet, quæ in hoc malo è venis iugularibus atque è capite ipso deriuantur.

PROGNOSTICA. Si in musculis internis inflammatio fiat, tertio vel quarto die iugulat, velocissime enim terminationis est. Desperata quoque, omniumque horrendissima angina est; cum nusquam apparet inflammatio, cum grauissimus est dolor, magnaque febris, cum ore hiat exerta lingua, cum intercepta deglutiendi via est, & potus per nares refluit, cum oculi more eorum qui strangulantur, inuertuntur & quasi prominent, spumosaque salua funditur, cum labra liuescunt, & è lecto exilire laborat, cum denique visus, auditus, intellectusque hebescit, ita vt non intelligat ea quæ penes illum aguntur, talis enim strangulatu atque syncope perit. bene autem sperandum est; cum rubor tumorque foris conspicui fiunt. Prout autem prædicta accidentia minuuntur, ita leuior morbus est; eò enim magis periculosum hoc malum est, quò accidentia anginae fuerint fortiora, vti contrà, quanto fuerint debiliora, tanto minus periculosum. Non sine magno quoque periculo tumores sine manifesta causa, bonisque signis desinunt, præcordiorum dolore concurrente corporisque torpore, viribusque imbecillis; sæpe equidem mors in proximo est: etiamsi rectè æger se habere existimet, suffocatione equidem è medio tollitur, vel saltem in suppurationem transit.

Metho-



Methodus pro curatione

ANGINÆ INSE-
VIENTS.

*Perficitur autem subsequenti-
bus remediis.*

VICTVS RATIONE.

A Er sit temperatus, lucidus, à ventis immunis.
Cibus sit liquidus ac mollis, vt sunt oua sorbilia,
cremor ptisanæ: iuscula è carnibus pullorum, gallina-
rum. In primis autem tribus diebus sit victus tenuissi-
mus. Vitent omnia quæ sanguinem calefacere pos-
sunt; piper nimirum, aliæque aromata.

Potus sit ptisana cum saccharo, aut cum iure pulli. A-
qua mulsa; vinum autem vitent.

Exercitium nullum admittatur, sed quies imperetur; pa-
rum quoque loquatur.

Somnus solito sit breuior, datæque opéra interrump-
tur aliquando ab astantibus; ex plurimo equidem
somnia solet hoc malum exasperari; humorum enim
copia in parte affecta incrementum inde sumit. Ca-
put mediocriter cõtegatur: eius autem frictions hic
nullo modo admittantur in mali principio.

Aluum arte aut natura solutam vt habeat, diligenter
procurandum est.

Animi curæ vitentur, subornenturque quæ gaudium
excitare possunt.

VACVANTIBVS.

Venæ sectio fiet eiusdem latetis statim ab initio mali
in omni angina, cum difficultatem aliquam percipiet
in respiratione & deglutitione, etiam vsque ad synco-
pen, si modò magna fuerit plenitudo, virēsque sint

M

validæ, aliàs partitis id fiet vicibus. Idetiam fiet in muliere vterum gerente, modò vires non sint debiles. Primò autem cephalica aperietur; hinc quæ sub lingua est, vbi humor non ampliùs fluit, secabitur; in principio autem si secetur, inflammatio augebitur, eò quòd ad partem affectam materia trahatur. In magna plethora saphena omnium primò secabitur; dum autem ea quæ sub lingua est vena secatur, lingua ad palatum inclinabitur.

Electuarium elefcopi.

Syrupus ex multiplici infusione rosarum.

Diacatholicum. hiera picra.

Pillulæ aureæ, de agarico.

Cassia, manna, tamarindi.

Statim alui deiectione materia mali educenda erit, præsertim si materia peccans fuerit biliosa: ferè enim turget: ea ratione statim vacuare licebit non expectando digestionem, cum semper periculum hic morbus minetur. Conueniunt autem medicamenta liquida potius quàm pillulæ, cum eas ob transglutiendi difficultatem transmittere non possit. A fortiter autem purgantibus medicamentis hinc consultò abstinebimus in principio mali: humores enim potius exagitabuntur, eaque ratione ad locum affectum vt liberius fluant, occasio dabitur.

AVERTENTIBVS.

Venæ sectio fiet modo prædicto.

Cucurbitulæ inferioribus partibus primo affigentur, hinc superioribus.

Sanguisugæ iisdem etiam locis affigi poterunt cum commodo.

Fotus pedum manuumque ex aqua calida fiet.

Ligaturæ hinc fient extremarum partium dolorificæ.

Frictiones item extremarum partium validæ.

Clystere validum si febre vacet, sectioque venæ facta non fuerit, leuiori interim clysterio primò alui excrementa

menta eluamus, etiam primo die, quantumvis solutam aluum habeat; in qua re plurimum hieræ picræ vsus commendatur.

REPELLENTIBVS.

Gargarismus ex decocto plantaginis, rosarum, malicorij, balaustiorum, lactucæ, lentium, aqua rosacea, succo granatorum acidorum, diamoro, diacodio, syr. de succo acetosæ, granatorum, rosarum.

Syr. de papauere, rob de papauere.

Diacodium, diamorum; syrup. de succo acetosæ, granatorum.

Succus lactucæ, rosarum, plantaginis, granatorum, solani mororum, acetosæ.

Aqua rosarum cum decocto sumach & aceto.

Vnguenta repellentia ex oleo rosato, loco affecto extrinsecus non adhibeantur.

Gargarismate primis diebus uti poterimus, quod tempus principium morbi complectitur, & tam diu ore detinebit donec incaluerit, & quantum fieri poterit, intimas faucium partes ea leuiter colluet: id equidem præstat ne humores ita liberè in locum affectum irruant, viis ipsi angustioribus redditis, partiùmque substantia roborata. Vnguento præsentis repellente non ita liberè uti possumus, ut nec vlllo alio medicamento repellente foris adhibito, nisi in principio ipsius mali: metuendum enim est ne intro materiam mali propellant, circumiacentes tamen partes, & potissimum superiores, eo inungemus.

CORROBORANTIBVS, resoluentibûsque,
ubi humorum impetus iam
desierit.

Gargarismus ex decocto glycyrrhizæ, ficuum, florum camomillæ, meliloti, hyssopi, betonicæ, fœnugræci, datylorum, vuarum passerarum, albo Græco, diamoro, melle rosato, syrupo rosato, oxymelle simplici.

Gargarismus ex aqua in qua mica panis albi cocta atq.

M. ij

expressa fuerit.

Stercus caninum colore candidum, & pulli hirundinum vsti cum melle permisceantur, in fauciumque loca affecta diducantur.

Lupi gutturis potum ebibat.

Filum coctum cum cineribus vt albescat: adhuc calens loco affecto admoueatur.

Vnguentum ex oleo camomelino, amygdalorum dulcium, liliorum, quo anterior pars colli vngetur, & posterior, deinde lana succida tegetur.

Cataplasma ex floribus camomillæ, meliloti, foliis maluæ, radicibus althææ, farina hordei, lini, fœnugræci, stercore canino, nido puluerisque ipsarum hirundinum, oleo liliorum, lini, camomillæ, amygdalorum dulcium.

Emplastrum de meliloto, mucilaginibus.

Prædictorum materia post primum diem minuetur paulatim, prout morbus incrementum sumit, in quorum locum resoluentia aliqua substituemus, quæ exterius quoque potiore locum habent, materiam enim ad externas partes euocare consultum est. Si resoluentibus angina curetur medicamentis: confestim omnia symptomata remittuntur absque vilo alio incommodo relicto, è contrà verò suppuratio si fiat, omnia symptomata incrementum sumunt, febris nimirum, dolor & transglutiendi difficultas.

THEORICA ET EMPIRICA MEDICAMENTA NOBILIA IN ANGINA, sæpius cum summa salute plurimorum aegrotorum à Gualtero Bruele experta.

CVRATIO ANGINÆ.

℞ seminum fœniculi, petroselinī ana 3 v. saluiæ, betonicæ ana m. j. florum camomillæ, meliloti ana m. j. se. aga-

℞ agarici albi & levis ℥ se. pulpæ colocynthidos 3 j. coquantur in aqua q. s. ad ℥ j. colaturæ addatur cassiæ recēter extractę, sacchari rubri ana ℥ j. olei lini, violacei ana ℥ j. se. salis 3 j. fiat *Clystere*. tertio quoq. die repetetur.

℞ cassiæ recēter extractę ℥ se. diaphœniconis 3 iij. aquarum scabiosę ℥ iij. fiat *Haustus*: detur sequenti die post venę sectionem in aurora.

℞ syrupi scabiosę ℥ iij. mellis rosacei ℥ j. se. aquarum scabiosę, caprifolij ana ℥ v. misceantur, fiat *Luleb*. detur tribus vicibus.

℞ diaturbith cum rhabarbaro 3 v. diacatholiconis 3 j. sem. electuarij de succo rosarum 3 sem. syrupi violarum, stœchados ana 3 sem. aquarum betonicę ℥ iij. fiat *Haustus*.

℞ syrupi de multiplici infusione rosarum 3 ij. sp. diaturbith cum rhabarbaro 3 se. aquarum betonicę ℥ iij. fiat *Haustus*.

℞ syrupi violarum 3 ij. diacodij, syrupi glycyrrhizę ana 3 sem. aquarum violarum, scabiosę ana 3 j. fiat *Potus*.

℞ hyssopi, iacę nigrę ana m. j. glycyrrhizę rasę 3 ij. corticum granatorum 3 sem. fiat decoctio in aqua q. s. ad ℥ j. colaturæ addatur aluminis vsti 3 j. sem. mellis rosati 3 j. se. fiat *Gargarismus*.

℞ corticum granatorum 3 se. florum rosarum m. j. sumach, seminum antherę, plantaginis, berberorum ana 3 j. se. aluminis vsti 3 j. balaustiorum 3 j. coquantur in aqua q. s. ad ℥ j. colaturæ addatur syrupi myrtini 3 j. diamori 3 vj. fiat *Gargarismus*: in principio mali in ore detinebitur donec incalescat.

℞ aquę plantaginis, rosarum, caprifolij ana 3 ij. sem. diamori 3 j. syrupi acetosi simplicis, oxymellis simplicis ana 3 se. fiat *Gargarismus*.

℞ decocti antherę, rosarum, balaustiorum, granorum sumach, plantaginis, folani, gallarum ℥ j. aquę rosacę 3 iij. aceti 3 ij. sacchari albissimi 3 ij. fiat *Potus*. Cum eodem quoque liquore gargarismus fiet optimus.

℞ liquoris prædicti 3 viij. in eo infundantur semina

M iij

papaveris contusa aliquandiu, hinc exprimantur; de-
tur in *Potus* liquor. R^x florum balauftiorum 3 ij. semi-
num antheræ, plantaginis, granorum sumach, berbero-
rum ana 3 j. gummi tragacanthi 3 ij. salis ammoniaci,
camphoræ ana 3 j. fiat *Pulvis*; cuius portiuncula insuf-
fletur in guttur. fieri quoque è iam dictis poterunt pil-
lulæ, quarû vna aut altera sub lingua detinebitur. Aqua
quoque rosacea, oxymelle simplici, & aceto, necnon
diamoro poterit fieri *Gargarismus* in principio mali, si-
ue calida siue frigida fuerit causa.

R^x syrupi violati 3 j. se. diamori 3 j. dianucum, loch
de papauere ana 3 sem. sacchari violati 3 iiij. fiat *Loboch*,
quo in principio, glycyrrhizæ radice modicè tusa, uta-
tur. R^x olei liliorum, camomillæ ana 3 se. pinguedi-
nis hirci 3 ij. ceræ parum, fiat *Vnguentum*; eo collum vn-
ctum lana succida contegatur. R^x vnguenti dialthææ
3 j. se. olei camomelini, amygdalorum dulcium ana 3
j. olei violacei, axungia gallinæ ana 3 se. fiat *Vnctio* col-
li frequens, hinc lana succida supraponatur.

R^x florum camomillæ, meliloti ana m. j. foliorû origani,
betonicæ, hyssopi ana m. se. glycyrrhizæ rasæ 3 j. seminû
lini 3 vj. fœnugræci 3 j. coquantur in aqua q. s. ad lb j.
se. colaturæ addatur syrupi rosacei 3 iiij. fiat *Gargarismus*
dissipans & concoquens. R^x olei amygdalorum dul-
cium, butyri recentis ana 3 iiij. ceræ q. s. fiat *Linimentum*.

R^x florum camomillæ, meliloti ana m. se. radicum li-
liorum, althææ ana 3 j. seminum lini, fœnugræci ana 3
vj. coquantur ad mollitudinem, deinde pistentur, ad-
dendo farinæ fabarum, hordei ana 3 vj. butyri, olei li-
liorum ana q. s. fiat *Cataplasma*.

R^x florum camomillæ, meliloti ana m. ij. se. hyssopi m.
j. farinæ fœnugræci, hordeaceæ ana 3 j. lini 3 sem. folio-
rum maluæ m. ij. albi græci 3 j. radicum althææ 3 j. se.
ficuum pinguium numero decem, olei liliorum, camo-
millæ, pinguedinis gallinæ ana q. s. fiat *Cataplasma*, cui
in augmento mali locus erit.

R^x rosarum rubrarum m. j. hordei m. j. sem. glycyrrhi-
zæ 3

℞ ꝑ. iiij. ficuum pinguium numero sex, coquantur in aqua q. s. ad ℥b j. s. colaturę addatur mellis rosacei ꝑ j. s. fiat *Gargarismus*.

℞ aquarum caprifolii, rosarum ana ꝑ iiij. s. diamorij ꝑ j. oxymellis simplicis, mellis rosati ana ꝑ vj. fiat *Gargarismus*.

APPENDIX

ad prædicta pro curatione ANGINAE
infernens.

Prohibere hęc diligenter debemus apostematis augmentum, frequenter enim hominem suffocando occidit si ad complementum perveniat, eaque ratione præstantissima debemus adhibere medicamenta mox à principio. Quamprimum ergo alius subducenda est clysterio leniori, demum verò fortiori. Mox quoque infituetur venę sectio non expectando horam, est equidem magnum in hoc malo remedium. Post venę sectionem, sequenti die humorum copia si adsit, minuitur purgante aliquo leni medicamento, non expectando humorum concoctionem, cum morbus non admittat inducias. Per os autem si medicamentum non admittat, clysterio id fieri debet paulo fortiori. Interim quoque humorum impetum ad partem affectam repellamus assumptis medicamentis potius quàm admotis statim in principio mali. Exterius autem repellentium loco, parti affectę superponetur lana succida oleo camomelino optimè imbuta. Repellentium autem vires eò magis imminuemus, quò plus ad augmentum ipsam properat malum, resoluentięque post tertium diem admitteremus, quę materiam parti affectę impactam dissipare possunt, ut est dianucum diamorum, decoctum glycyrrhizę, ficuum. Semper hęc quoque addemus etiam in principio mali, quę dolorem lenire possunt, cum magnus dolor humorum, attractionem semper faciat. Optimè autem lac dolorem sedat etiam per se solum. Interea quoque temporis ligaturis, cucurbitulis, foribus, frictionibus aliisque huiusmodi instrumentis avertemus humorum motum. Venam quoque sub lingua tunc secare licebit. Demum nature obediens reddatur materia mali, si ratio suadeat. Si autem prædictum

M iiij

Etis ingeniis materiam resolvere non possimus, sed potius in sanem mutari verisimile sit, hic quoque naturam iuvabimus ad puris generationem, quibus tandem addemus pyrethrum, sinapi, ubi suppurata erit materia, rumpendusque est abscessus; qui tandem purgabitur cum gargarismate facto ex hydromelite. Vltimè glutinantibus medicamentis ulcus consolidabitur. Quæ omnia nunc antè, àque dictis medicamentis felicissimo cum successu consequi poterimus: modò uniuersalia particularibus debita ratione accommodentur.



Methodus pro cognitione

T V S S I S I N S E R - V I E N S.

TVSSIS est valida efflatio, qua plurimus spiritus cellerrimè foras erumpens impetu suo explodere nititur excrementa acria pulmones laceffentia, meatusque obstruentia, aliave ratione molestantia. Hic motus fit à natura atque facultate, in quo instrumenta spirituum coacta à causa aliqua violenta, deprauatè moventur. Subinde tussicula mouetur, ita tamen mitis, ut etiamsi homo frequenter tussiat, suppressi tamen potest ne eueniat, vnde etiam sæpe curatur, propter calorem qui in spiritualibus partibus ex spirituum retentione excitatur, qui per angustos quoque meatus permeant vi quadam. Initium autem motionis in tussi à facultate pulmonum potissimum est, à qua pectoris muscoli etiam excitantur, thoracemque validè comprimunt; ea quidem ratione id quod in viis spirituum continetur, melius expellitur, cum sic spiritus feratur foras vehementius, qua vehementia secum rapit excrementa in itinere existentia. Hoc autem symptomate utitur pulmo, uti sternutatione cerebrum; quem motum ut in

in actum producat, dilatatur primò, demum constringitur, concurratque motus diaphragmatis tamquam auxiliator.

PARS AFFECTA. est pulmo, qui aliàs per se, aliàs per consensum alterius partis, pectoris nimirum aut diaphragmatis, aliquando etiam iecoris læditur. Pulmo equidem sentiens prædictarum partium læsionem, hoc motu quoque mouetur, ut id quod noxium est expellat. Pulmones autem hîc affici, euidenter confirmat respiratio læsa. Est autem tussis symptoma pertinens ad actionem læsam facultatis motricis ipsius pulmonis; nam neque pectus in pleuritide, neque iecur læsum tussim moueret; nisi nocumenta eorum pulmoni communicarentur. Aliquando quoque sequitur tussis morbum in via, cum scilicet fit propter obstructionem viarum per quas spiritus mouetur.


SIGNA mali per se sunt manifesta, ita enim valida frequenter est tussis, ut prohibere etiam si velit homo, non possit, contingitque thoracem hîc admodum comprimi. Haud enim aliter id quod noxium est ex iis locis educi potest, propter situm & conformationem earum partium quæ respirationi inserviunt. Sæpe quoque hîc titillatio in intima oris parte percipitur.

CAUSA. sæpe fit ab humore qui à capite in asperam arteriam & pulmones fluit; qui si magna copia, magnoque impetu feratur, maxima concurrit difficultas spirandi, grauitas magna in pectore percipitur, & in dorso, ubi pulmones illi membranis affiguntur. Contra leuia hæc erunt symptomata, cum pauca excrementa eò deriuantur. Si autem recens fuerit destillatio, titillatio ab utraque palati parte percipitur, acrimonia denique humoris fluentis, guttur quasi corradi videtur, tussicula frequens concurrit, qua parum tamen reicitur, estque renue. Sunt autem hi humores subinde nimium tenues fluidique, tuncque illudunt naturam quæ tussim excitat coacta, nam etiam si valide tussiat, parum aut nihil samen expuit. Vnde aliquando nonnulli falluntur

qui ab intemperie sicca potius quàm ab humorum præsentia tunc tussim fieri contendunt, hac ratione, quòd nihil etiam frequenti tussi reiiciat, quasi propterea nulla adesset materia grauans. Hoc autem vti fit cum materia est multum subtilis, sic idem quoque accidit cum materia nimium est viscida & glutinosa, ita vt extundi non possit. Subinde itaque tenuantibus atque inspissantibus medicamentis nos egemus cum materia crassa & viscida later in pectore vel pulmone, aliàs verò opus est incrassantibus. In vtroque quidem casu materia grauans sua crassitie aut tenuitate naturam illudir, vnde magna sæpe virium sequitur imbecillitas; contingit enim vires infirmas laboribus tantis tandem opprimi, cum materiam intus continuò quasi expellere conetur, vt spiritibus via ad cor pateat, nihilque tandem longioribus etiam laboribus proficiat. Subinde etiam misti sunt humores, qui vel à capite eò ruunt, vel detenti sunt iis in locis; id quod in pleuritide, phthisi, pulmonumque inflammatione accidit, tuncque dictorum malorum symptoma existit tussis, id quod ex propriis eorum signis intelligetur. aliàs quoque fit à lumbricis stomachum infestantibus: aliàs quoque ab intemperie subinde frigida, sicca; aliàs etiam calida ipsius aëris excitatur, tuncque adest tussis exigua, parumque aut nihil expuitur. Aliquando quoque sequitur affectum iecoris, ventriculi vel lienis, inflammationem nimirum vel schirrhum prædictarum partium, vnde tussicula oritur arida, in qua nihil reiicitur ex septi transversæ compressione.

PROGNOSTICA. Somnum si auferat tussis, mala censetur. Tussis quoque nimia & diu persequens cum destillatione, mala censetur: quia tandem ducit ad phthisim; aliquando etiam rupturam excitat in pectore, sputumque sanguinis mouet. Tussis cum modico conatu, alleviatione multa & veloci expulsionem, sine labore & fatigatione, sine periculo est; si contraria accendant, cum periculo fit. Tussis item ex ulcere spiritalium partium,

partium, aut ex earundem partium abscessu, periculossissima est. Periculosa quoque est tussis quæ cum antè humida fuit, iam subito sicca si reddatur, pectoris gravitate permanente; pulmonum enim exulcerationem minatur. A pulmonibus veteri obstructione laborantibus, aut etiam corruptis, continua ferè tussis excitatur; nequaquam autem à destillationibus hoc fit; ea equidem subsistente, tussis etiam deficit.



Methodus pro curatione

T V S S I S I N S E R -
V I E N S.

Perficitur autem subsequenter remedium generibus.

V I C T U S R A T I O N E.

A Er sit temperatus, potiùsque ad siccum declinet. Cibus sit facilis digestionis, sitque parva alimentorum potiùsque quantitas. Carnes conveniunt vitulinæ assæ, pullorum, gallinarum, leporinæ, avium montanarum. Ex fructibus conveniunt vuae passæ, dactyli, amygdala, ficus. vitentur acetosa, salsa, acris amaraque. Panis condiatur semine anisi aut fœniculi.

Potus sit ptisana, hydromel.

Exercitium convenit ante cibum mediocriter serium.

Somnus diuturnus atque diurnus noxius.

Alvus arte solvatur, si natura non respondeat.

Iram, timorem, aliasque fugiat animi perturbationes.

P R A E P A R A N T I B U S.

Syrupus de hyssopo, de prasio, de glycyrrhiza, capillorum Veneris.

Syrupus de calamintha, antiquæ conuenit tussi, de stœchade.

Oxymel compositum, squilliticum, syr. acetosus, mel rosatum.

Decoctum ficuum, passularum, glycyrrhizæ, capillorum Veneris, hyssopi, prasi.

Aqua scabiosæ, marrubii, capillorum Veneris, hyssopi, fœniculi.

Syr. violatus, papauerinus, iuiubinus.

Nymphææ, violarum, myrtinus.

Aqua hordei admodum iuuat.

Priori loco positis tenuantibus, incidentibus, tergentibusque scilicet medicamentis vtemur, si à frigido, crasso, viscidoque humore tussis excitetur. Secundo verò loco positis, increffantibus, inspissantibusque scilicet vtemur, dum à tenui calidoque humore prouenit; inspissata enim materia tenuis, facilius reicitur. Per se autem potius offeremus, sumetque paulatim lambendo; ebibiti enim non ita integris viribus ad pulmonem transferuntur.

VAGVANTIBVS.

Diaturbith cum rhabarbaro, hiera diacolocynthidos.

Electuarium Indum maius, diaphœnicum.

Electuarium rosatum, hiera picra.

Pillulæ cocicæ, alephanginæ, aureæ, assaieret, de sarcocola, de agarico, mastichinæ.

Agaricus trochiscatus, manna, cassia.

Decoctum radicum fœniculi, seminum anisi, apii, vrticæ, glycyrrhizæ, hyssopi, prasi, iridis, dactylorum, capillorum Veneris, scabiosæ, enulæ campanæ, passularum, agarici, salis gemmæ, zinziberis, diacatholicon, electuario Indo, melle rosato additis.

Vomitus.

Quamuis Auicenna à purgantibus medicamentis hic abstineat, eò quòd via communis nulla sit qua pulmones expurgemus, tamen purgantia plurimum emolumenti attulerint, eò quod caput purgent, vnde materia

ria

ria fluens originem habet. Denique expurgata infima corporis sentina, caput se exonerabit facilius à superfluis; neque ita replebitur, inferioribus partibus bene constitutis.

AVERTENTIBVS.

Venæ sectio fiet ipsius quidem cephalicę potissimum, si fluxio etiam adsit molesta, siue materia calida fuerit, siue frigida, modò corpus multum sit repletum, ita vt inde pectori pulmonibusque libertas se mouendi adimatur, alioqui frigida redundante materia à venæ sectione abstinebimus.

Clysteres fiant secundum rei exigentiam mediocriter fortes.

Errhina ex melle, succo sampsuchi, betæ, zinzibere.

Cauterium etiam conuenit si multum vrgeat malum, in ceruice autem, aut sincipite, scapulise excitabitur.

PROMOVENTIBVS *sputum.*

Syr. glycyrrhizæ, succus glycyrrhizæ, diatragacanthum.

Lohoch sanum, è pulmone vulpis, lohoch de pino.

Lohoch è pillulis bechicis, diatragacantho, succo glycyrrhizę, syr. violarum, saccharo violato, rosato, rosis siccis, myrrha.

Diapenidium, sine sp. diaireos Nicolai.

Succus glycyrrhizæ, cnula campana, ireos.

Vnguentum pro pectore ex oleo lini, irino, butyro recenti, oleo amygdalorum dulcium, mucilag. lini, fenugræci, croco.

CORROBORANTIBVS, *digerentibus intemperiemque emendantibus.*

Theriaca, mithridatum ex vino albo bis in septimana imperabitur. Diaireos Salomonis, lohoch sanum, de pino.

Diaireos simplex, diamuscum dulce, diatragacanthum calidum, diacalamentum, diapenidium cum speciebus.

Conserua capillorum Veneris, betonicæ, hyssopi, melissæ, loch ad asthma.

Decoctum ligni guaiaci.

Vnguentum pectoris ex oleo anethino, camomelino, amygdalorum dulcium, irino, liliorum, butyro, croco, pinguedine anseris, gallinæ.

Vnguentum ex oleo in quo decoctæ sint radices enulæ campanæ, ireos, hyssopus, semina lini, fœnugræci.

Cucupha ex rosis, caryophyllis, mace, nigella Romana, radice cyperi, cortice citri, labdano, styrace, calaminta.

THEORICA ET EMPIRICA MEDICAMENTA nobilia in TVSSI, sæpius cum summa salute plurimorum agrotorum à Gualtero Bruel experta.

CVRATIO TVSSIS.

℞ radicum enulæ campanæ, angelicæ ana 3 vj. hordei mundati m. ij. præsii, hyssopi, foliorum vrticæ ana m. j. agarici albi & leuis 3 iiij. florum camomillæ, meliloti ana m. j. seminum anisi, fœniculi ana 3 j. coquantur in aqua q. s. ad lb j. β. colaturæ adde diaturbith cum rhabbaro 3 vj. olei lini, rutæ, amygdalorum ana 3 j. fiat *Enema*.

℞ syrupi de hyssopo, glycyrrhizæ ana 3 j. s. syrupi stœchados 3 s. aquarum scabiosæ, hyssopi, marthubii ana 3 iiij. fiat *Iuleb*: dentur 3 iiij. per quatuor dies in auro, singulisque vicibus sumpto serapio, diatragacanthæ moricellum vnum ore decineat.

℞ radicum glycyrrhizæ 3 j. scabiosæ, hyssopi, vngulæ caballinæ, capillorum Veneris ana m. j. vuarum passarum m. ij. pruna Damascena numero x. ficuum pinguum

guium numero vj. dactylorum numero iiij. coquantur in aqua q. s. ad tertię partis consumptionem, colaturæ addantur syrupi glycyrrhizæ 3 iiij. diaireos simplicis 3 ss. fiat *Syrupus* cum sacchari candi 3 iiij.

℞ syrupi iuiubini 3 ij. glycyrrhizę, mellis rosati ana 3 j. sacchari candi 3 vj. aquarum prasii, violarum ana 3 v. fiat *Lulapium*.

℞ radicum enulæ campanæ 3 j. ss. hordei mundati m. ij. prasii, hyssopi, betonicę ana m. j. scabiosæ m. ss. glycyrrhizę rasę 3 j. seminum anisi 3 vj. vuarum passarum enucleatarum m. j. ficuum pinguium numero x. coquantur in aqua q. s. ad lb j. ss. & cum saccharo q. s. fiat *Potio*.

℞ oxymellis squillitici 3 j. ss. syrupi glycyrrhizę 3 j. decoctionis prædictæ 3 iiij. fiat *Haustus*.

℞ radicum fœniculi, petroselini, draguntæ ana 3 j. radicum enulæ campanæ, iridis ana 3 iiij. capillorum Veneris, hyssopi, prasii ana m. j. ss. seminum anisi 3 iiij. passularum mundatarum 3 j. ss. agarici albi & leuis 3 ss. zinziberis 3 j. salis gemmæ 3 ss. senæ Alexandrinę 3 vj. coquantur in sufficienti quantitate aquæ ad lb j. ss. colaturæ addantur syrupi glycyrrhizæ 3 iiij. fiat *Potio*.

℞ diaturbith cum rhabarbaro, electuarii Indi ana 3 iiij. syrupi glycyrrhizę, prasii ana 3 ss. decocti agarici, hyssopi, fœniculi 3 iiij. fiat *Haustus*.

℞ pillularum de agarico, aurearum, cochiarum ana 3 j. rhabarbari electissimi 3 ss. syrupi stœchados q. s. fiant *Pillulæ* octo numero; sumat post medium noctis. Sequenti die detur theriacę magnę 3 j. cum aquę draguntæ 3 iiij.

℞ syrupi de hyssopo, de iuiubis ana 3 ss. adianthi 3 j. lohoch sani, de pino ana 3 v. sacchari violati 3 iiij. misceantur, fiat *Lohoch*.

℞ mellis rosati colati, oxymellis simplicis, glycyrrhizæ ana 3 j. syrupi violarum 3 ss. sacchari candi 3 iiij. diatragachanthi frigidi 3 ij. fiat *Lohoch*.

℞ balauſtiorum, corticum malorum granatorum ana 3 iiij. roſarum m. j. ſs. iuiubarum, ſebeſten ana 3 ſs. coquantur in aqua q. ſ. ad lb j. β. colaturę adde ſyrupi papauerini 3 ij. myrtini 3 β. fiat eorum mixtura pro *Gargarifmate*.

℞ diacodii 3 ij. thuris 3 j. β. miſceantur, detur 3 ſs. cum 3 iiij. decocti hordei, ſyrupi roſati de roſis ſiccis 3 j. fiat *Haufus*.

℞ diatrágacanthi frigidi 3 j. β. pillularum de cynogloſſa 3 β. diacodii 3 iiij. boli Armeni, ſucci glycyrrhizę ana 3 j. β. amyli 3 β. ſyrupi roſati, papauerini ana q. ſ. fiat *maſſa Pillularum*: teneat vnam in ore.

℞ roſarum rubrarum m. ſs. ſandalorum citrinorum, maſtichis, thuris ana 3 ij. β. labdani, ſtyracis ana 3 j. ſs. fiat *Suffitus*; cuius vapore capitis tegmina manẽ & veſperi perfundantur.

℞ ſyrupi papauerini 3 j. ſs. roſarum, myrtilorum ana 3 j. aquę violarum 3 iiij. decoctionis hordei, paſſularum, quatuor ſeminum frigidorum maiorum 3 vj. miſceantur, fiat *Potus* in calida cauſa.

℞ olei violarum 3 j. ſs. amygdalorum dulcium 3 j. olei irini, butyri Maialis ana 3 ſs. croci 3 ſs. cerę q. ſ. fiat *Vnguentum* molle, quo pectus aliquoties in die inungatur. Caput autem abradatur, & inungatur cum oleo roſaceo, camomelino, anethino vnã mixtis.

℞ mithridati optimi, theriacę Andromachiana 3 j. ſs. decocti glycyrrhizę, radicum enulę campanę, capillorum Veneris, hyſſopi 3 iiij. ſyrupi glycyrrhizę 3 j. fiat *Potus*, plurimum in tuſſi inueterata valet.

℞ radicis draguntę conditę 3 ij. radicum ariſtolochię rotundę 3 j. ſeminis lini, croci, thuris, maſtichis ana 3 j. ſs. fiat *Electuarium* cum ſyrupo glycyrrhizę, ſi tuſſi catarrhus coniungatur, maxime proderit.

℞ myrrhę 3 iiij. ſagapeni 3 j. ſs. mellis & aquę vitę q. ſ. fiant *Pillulę*, doſis 3 j.

℞ dia-

℞ diasulfuris Mesuæ ʒ j. 3 j. carbonibus iniiciatur pro *Suffumigio*, quo vterur vt reliquæ absumantur materiæ peccantis.

℞ rosarum siccarum m. j. florum camomillæ m. ij. se. furfuris frixi m. j. fiat *Sacculus* in eundem finem pro capite.

℞ seminum nasturtij torrefactorum ʒ j. fimi columbini 3 j. sem. nucis cupressi 3 v. cum aqua dectionis cupressi & staphisagriæ fiat *Empiastrum* pro capite, cerebrum confortat, superuacaneas absumit quoque eius humiditates.

APPENDIX

ad prædicta pro curatione T V S S I S
inseruiens.

Prouenientis propter materiam quæ meatus obstruit pulmonis, cui fluxus quoque aliqualis coniunctus etiam est qua ratione ab asthma secernitur. Humores in corpore redundantes omnium primò naturæ obdientes reddemus: hoc cum consecuti aequaliter fuerimus, purgante medicamento eos euacuabimus. Deinde materiam ad pulmones ruentem auertemus clysteribus, errhinis, venæ sectione, cauteriis, balneo quod manibus cruribusque accommodabitur. Deinde quæ sistere possunt materiam ad pulmones labentem si id quoque concurrat (neque enim semper necessarium hoc est ut tussis fiat) accidens, è capite de catarrho huc quoque in usum aduocabimus: illi enim malo ea medicamenta potissimum dicata sunt. Postremò quæ materiam pulmonibus conclusam educere possunt, imperentur: quibus addemus ea quoque quæ idem viscus roborare solent. Quæ omnia nunc anteaquæ dictis medicamentis facile consequi poterimus, modò uniuersalia particularibus debita ratione adhibeantur. Tussis autem si fiat propter pleuritidem, aut pulmonum inflammationem, aut empyema, aut rupturam alicuius venæ in pulmone, non poterit probè curari, nisi dicta mala primò curentur, & propterea nisi tussis nimium affligat, illarum partium cura primùm instituantur: id autem quo pacto fieri debeat, suis lo-

N

cis indicatur. Decoctum hordei cum sacchari quantitate multa, plurimum prodest si propter irritationem nimiumque sensum fiat tussis. In quem quoque finem, & ut tussis sedetur, narcotica nonnulla detergentibus medicamentis permiscenda sunt: ut,

R^x succi glycyrrhizæ 3 ij. se. farine amyli 3 j se. croci, myrrhæ ana ʒ i se. opij gr iij. styracis calamitæ 3 ij. syrupi violarum q. s. fiant Pillulæ, detur ʒ i. subingressum lecti. Aut,

R^x diacodij ʒ j. Vbi autem materia maturitati appropinquauerit, satisque attenuata erit plurimum gratificabitur decoctum ex ficibus, unis passis, glycyrrhiza, hyssopo, violis, seminibus cydoniorum radice althææ. Hinc.

R^x olei violacei 3 j. se. amygdalorum dulcium ʒ j. mucilaginum, seminum lini, psyllij ana 3 sem. ceræ q. s. fiat Vnguentum pro pectore.



Methodus pro cognitione

ASTHMATIS INSE- VIENTIS.

ASTHMA est densa seu crebra quædam respiratio citra febrem, qualis currentibus accidit. Difficultatis autem spirandi tres sunt species; dum enim ita placide urget, ut neque sonus neque anhelatio fiat, febreque vacat, Dyspnœa dicitur. Cum verò spirare sine sono & anhelatione non potest, Aithma dicitur; si autem ita urgeat, ut non nisi recta ceruice spiritum ducere possit, & absque febre hoc fiat, Orthopnœa seu recta spiratio vocabitur, in hac specie, si decumbant iaceantque ægri, quasi suffocantur: contingit equidem vias spirituum in pulmonibus existentes, & etiam asperam arteriam, omnesque regiones internas, multo strictiores & angustiores fieri, quàm dum erecto corpore sedent, eo quòd thorax totus supra spinam quasi concidat illis decum-
ben-

bentibus: minus enim ductus illi propaginesque asperæ arteriæ, per quas spiritus fluunt, comprimuntur, si caput, collum, thoracemque subleuent, quàm si iisdem partibus curuatis spiratis spirare velint, cum sic meatus comprimantur manifestè. Differunt autem dictæ species secundum magis & minus solum: omnes enim continentur sub denso seu crebro spiritu, qui ob tenacium & crassorum humorum copiam, pulmonum branchiis infarctam, fit. arctatio enim necesse est fiat ex humore crasso, frigido atque viscoso, qui meatibus pulmonis impactus est, vnde spiritualium membrorum angustia hîc fit. Non agimus hîc de ea quæ propter virium imbecillitatem difficultas spirandi fit: nam licet omnes muscoli thoracis tunc quoque moueantur, id tamen sensim fit: non autem crebra concurrit respiratio, neque dilatatio magna: solètque spiritus potius per nares emitti, & etiam reuocari. Vires autem omnino prostratas esse, satis seriò significabitur, si narium pinnae manifestè contrahi videantur per inspirationem. Neque de ea difficultate spirandi hîc agimus quæ fit propter cordis aut pulmonum calorem magnum, etiam si necessariò calidus hîc frequenter exsuffletur spiritus, spiratioque magna frequens atque celer fiat. Sic quoque in pleuritide & synanche fit quædam densa atque crebra respiratio: quæ omnia aliam ab hoc malo curandi rationem cum requirant, hîc locum non habent, vti nec ea quæ fit ob splenis magnam molem, aut ob aquarum copiam in in ventris capacitate contentam, ab his enim malis contingit maximam fieri respirandi difficultatem, eò quòd septum transuersum comprimatur.

PARS AFFECTA. propagines asperæ arteriæ in pulmonum substantiam disseminatæ hîc afficiuntur: cum enim strictiores in hoc malo sint, citius afficiuntur ab humoribus illapsis, angustæque fiunt, vnde accidit quantitatem inspirati aëris non respondere magnitudini distentionis, etiam si pectus multum dilatetur, vnde crebro celeriterque coguntur respirare laborantes, cum

parua admodum sit quantitas quæ inspiratur, cum spiritus liberè intrare non possint ob angustiam viarum. Contingitque copiam spirituum non esse proportionalem magnitudini distentionis quæ fit à thorace; cum enim thorax plurimum dilatetur, parum tamen externi aëris inspiratur, cuius contrarium accidit cum aspera arteria eiusdemque propagines secundum naturam se habent. Est autem difficultas spirandi de qua hîc agimus; symptoma pertinens ad actionem læsam functionis voluntariæ, respirationis nimirum quæ debilis est aut deprauata. Sequitur autem hoc symptoma morbum in via, obstructionem nimirum angustiamve viarum per quas aër inspiratur.

SIGNA. Magna densaque fit spiratio sine febre, aliquando quidem etiam cum anhelatione atque sono, id quod magis iacentibus quam sedentibus accidit, petus graue est, & angustiam arctationemque in ea percipiunt, frequenter tussunt, purulenti tamen nihil reieciunt; & hoc malum increscit eousque aliquando, ut recta ceruice spirare cogantur, ut à metu suffocationis se saluent; pallor quoque faciei tempore efflorescit, scapulæ interdum etiam dolent, & iam dicta accidentia modo intermittunt, temporeque rursus reuertuntur.

CAUSA. Malum hoc quandoque generat fumus argenti viui, aër cauernarum in quibus metallâ effodiuntur; ab iis enim vaporibus contingit pulmonem nimium exiccare. Victus quoque intemperantia, nec non corporis crassities otio aut natura contracta, anhelosos subinde facit; omnium autem frequentissimè fit à pituita crassa & viscida, quæ in asperæ arteriæ ductibus inuiscata hæret, siue aliunde influat, quo tempore sæpe subito spirandi difficultas oritur, siue ibi generati sint; sæpe enim spirandi instrumenta sui mali principium habent, cum scilicet multæ superfluitates in ipsis generantur; quæ aliquando tempore vi caloris in pituitam vitream aut gypseam permutantur, hinc tempore quoque in grandinem atque calculos degenerant. Subinde quoque

quoque fit propter tuberculum crudum in pulmonibus enatum, qui iuxta asperam arteriam, aut eius propages oritur, easque coarctare potest; & hi quidem tempore sanitatis dum se exercent, difficulter quidem spirant, nihil tamen quasi exspuunt, paulatimque difficultas spirandi increfcit, sine stercore tamen. Aliquando etiam fit propter pectoris angustiam, malamque conformationem.

PROGNOSTICA. Asthma in senibus nunquam curatur, in iuuenibus verò difficulter. Asthma quoque propter dislocationem spondylium, vix aut nunquam curatur, nisi reducantur spondylia. Affectus hic sæpe acutus fit, temporumque interuallis recurrit, ob vehementissimasque accessiones aliquando ægrum strangulat, quod tunc potissimum fit, cum noua aliqua destillatio è capite in pulmones iam antea coarctatos irruit, & potissimum si humidum frigidumque cælum concurrat, aut si ex multis cruditatibus, asthmatis materia multum humectetur & quasi diffundatur, hisce enim concurrentibus in veteri asthma, accessiones multò sunt periculosiores, sic equidem ingeminatur obstructio. Sæuitiam autem mali mitigat cæli serenitas, vitæ sobrietas, corporisque quies. Qui pectus à natura habet strictum, paruümque pulmonem, iugiter fit asthmaticus. Syncope concurrens cum pulsu languido, intermitte, inæquali, inordinato tardoque, pessimum est. Periculoso quoque tremula spiratio est, & eò magis, si scapulæ, necnon omoplatae cum musculis intercostalibus vnà cum inspiratione & expiratione deprimuntur & attolluntur, præsertim viribus existentibus debilibus.

XX

Methodus pro curatione

**ASTHMATIS INSER-
VIENS.**

*Perficitur autem subsequentibus remediorum
generibus.*

VICTVS RATIONE.

A Er fit calidus & siccus.

Cibus. Carnes conueniunt gallinarum, perdicum, pullorum, auicularum montanarum. Vitentur omnia quæ crassum lentumque succum procreant. Inter olera admittantur fœniculum, thymus, hyssopus, calamintha.

Potus sit vinum tenue aut aqua mulsa, in qua aliquid prasilij aut hyssopi incoctum sit.

Exercitium leue, vt ambulatio lenta ante cibum facta ferè vsque ad lassitudinem, frictioque infernarum partium fiat.

Somnus sit moderatus, non diurnus.

Animi perturbationes vitentur.

PRAEPARANTIBVS.

Syrup. capillorum Veneris, de marrhubio, glycyrrhizæ, hyssopi, de duabus rad. violarum, calaminthæ, stœchados.

Mel rosatum.

Oxymel simplex, compositum, squilliticum.

Acetum squilliticum.

Decoctum radicum enulæ campanæ, epithymi, aristolochiæ rotundæ, hordei, seminum lini, fœnugræci, cydoniorum, vrticæ, fœniculi, anisi, capillorum Veneris, hyssopi, prasilij, scabiosæ, betonicæ, vuarum passerum, ficum, dactylorum.

Aqua

Aqua hordei cum saccharo.

Aqua prasilij, hyssopi, betonicæ, hordei, fœniculi, violarum.

Decoctum guaiaci.

Multum calida cum id quod tenue est consumant, crassumque relinquunt, hinc non conueniunt, cum autem morbus ipse longus sit, difficulterque medicamentis expellatur, mutanda subinde remedia sunt: cum enim ab assuetis passio non fiat, tandem natura contemnet eorum continuum usum. His quoque addemus syr. papauerinum, myrtilorum, cidoniorum, bolum Armenum, si catarrhum sistere velimus.

VACVANTIBVS.

Agaricus trochiscatus, diaturbith cum rhabarbaro, diaphœnicum, diacatholicum, electuarium Indum.

Hiera diacolocynthidos, hiera simplex & composita, pillul. de hiera cum agarico.

Pillulæ mastichinæ aggregatiuæ, assaicret, alephanginæ, aromaticæ, eociæ.

Agaricus, cassia.

Colocynthis.

Vomitus excitetur rationibus antedictis, potissimum si facile vomat; magis enim conuenit quam ventris solutio, eò quod pulmonibus sit via magis vicina, magisque à stomacho phlegma euacuet.

Clysteres molles ex decocto pectorali, cassia, hiera picra, diaphœnicone.

Venæ sectio hinc conuenit, si æger sanguine abundet, si hæmorrhoides mensesque suppressæ sint; alioqui vix admittenda.

In hoc malo pillulæ sunt efficaciores, eò quod à distantibus partibus felicius materiam grauantem attrahant. Apurgantibus autem medicamentis abstinemus omnino tempore paroxysmi, periculum enim est, ne tunc materia vi medicamenti agitata in pulmones largius ruat, extra quoque paroxysmum rarius purgantibus vtetur medicamentis, eò quod viscida & crassa est

N iij

materia quæ obstruit; purgantia autem medicamenta ad pulmonem vix pertingunt, diligenter autem præparanda erit materia antequam purgantibus medicamentis educatur.

AVERTENTIBVS.

Nasalia fiant ex nigella Romana, cubebis, nuce muscata, succo sampſuchi, betæ, aqua mulsa, vino.

Masticatoria.

Lotiones pedum in decocto florum camomillæ, meliori, betonicæ, saluïæ, sampſuchi, foliis lauri, rorismarini.

Cautica & vesicatoria medicamenta in commissura coronali tempore necessitatis fiant, si catarrhus malum auget.

Frictiones vinculaque partium infernarum fiant, potissimum si suffocationis periculum impêdeat: tandem cum versus augmentum vergit, fricandum erit ipsum pectus linteo utcumque aspero, ut meatus earum partium referentur, virtusque medicamentorum melius se insinuet in profundum.

Cucurbitulæ humeris affiguntur sine scarificatione tempore suffocationis, & cum difficulter admodum ducitur spiritus, paulum supra renes ubi diaphragmatis pulmonumque portio quiescit. matutino id fiet tempore, pluribusque vicibus.

PROMOVENTIBVS *sputum, thoracem pulmonesque roborantibus.*

Syr. glycyrrhizæ, de iuiubis, hyssopo, prasio.

Diahyssopus, diapenidion, loch sanum, de caulibus, de pino, diaris, diatragacanthum cum oleo anisi.

Conserua enulæ campanæ, ius galli antiqui, cum syr. capillorum Veneris.

Pulmo vulpis exiccatus, syr. glycyrrhizæ exceptus. Eri-cinus siluestris. Millepedæ seu aselli, animalcula sunt quæ sub vasculis aquariis morantur.

Squilla, glycyrrhiza, brassaica, allium, hyssopus, enula campana, aristolochia, rotunda, rad. serpentariæ sub
cine-

cineribus assa, cum syr. glycyrrhizę, loch de pulmone vulpis, de pino.

Vuę passę, ficus sicci, semen lini, iuiubę, scabiosa, glycyrrhiza.

Decoctum ex ficibus, hyssopo, fœnugręco, glycyrrhiza, vuīs passis, melle, croco.

Vnguentum pro toto pectore ex oleo lini, amygdalorum dulcium, anethino, rutaceo, irino, liliorum, camomelino, butyro recenti, pinguedine gallinę, mucilagınę fœnugręci, althęę, croco, rad. iridis.

Vnguentum Agrippę.

Cataplasma ex farina hordeacea, ficibus, iride, melle, resina.

Pręsentibus medicamentis euacuandi sunt humores in meatibus carnęque spongiosa pulmonum conclusi, potius quęm purgantibus aut vomitum concitantibus medicamentis; hęc equidem instrumenta potius locum habebunt cū humores sunt plurimi in toto corpore redundantes, à quibus causa coniuncta incrementum sumere potest. Poros autem pectoris aperire quoque hęc eadem opera laborabimus cum frictionib. molliusculis; hinc inungemus prędictis vnguentis, demum cataplasmata admovebimus.

DIGERENTIBVS *reliquias.*

Theriaca cum vino albo veteri, aurea Alexandrina, diaireos simplex.

Mithridatum, diamuscum dulce & amarum, plirisarcoticum, loch ad asthma, loch ę squilla.

Decoctum ligni guaiaci.

Mellicratum.

Castorei pul.

Suffitus cum sulfure, thure, mastiche, ligno iuniperi, terebinthina.

Vnguentum ex oleo rutaceo, irino, anethino, rad. iridis, enulę campanę, semine lini, adipe gallinę.

THEORICA ET EMPIRICA MEDICAMENTA nobilia in ASTHMA TE, sæpius cum summa salute plurimorum egrotorum à Gualtero Bruel experta.

CVRATIO ASTHMATIS.

℞ radicū aristolochiæ rotundæ, iridis ana ℥ β. centaurei minoris, hyssopi, calaminthæ ana m. j. agarici albi & leuis 3 v. coquantur in sufficienti quantitate aquæ ad tertias; colaturæ addatur sp. hieræ diacolocynthidos 3 j. β. diaturbith cum rhabarbaro 3 v. olei liliorum, camomelini, rutacei ana ℥ j. salis 3 j. fiat *Clystere*.

℞ syrupi glycyrrhizæ, syrupi de prasio ana ℥ β. de hyssopo ℥ j. β. oxymellis squillitici 3 j. aquarum mar-
rhubii, hyssopi, vngulæ caballinæ, scabiosæ ana 3 iiij. fiat
Iuleb: dentur 3 iiij. in aurora, sumatque morsellum v-
num diaireos simplicis singulis vicibus post sumptio-
nem syrupi.

℞ radicū enulæ campanæ, ireos ana 3 ij. hyssopi, vngulæ caballinæ ana m. ij. β. glycyrrhizæ rasæ 3 j. β. se-
minum anisi 3 j. passularum enucleatarum 3 iiij. semi-
num foenugræci 3 j. florum violarum, thymi ana m. j. fi-
cum pinguium numero vj. coquantur in aqua q. s. ad
tertiæ partis consumptionem, hinc cum melle q. s. fiat
Syrupus; cochlear vnum lambendo admittat aliquoties
in die.

℞ oxymellis squillitici 3 j. β. detur cum præsentī de-
cocto.

℞ enulæ campanæ, vngulæ caballinæ, hyssopi, capillo-
rum Veneris, prasi ana m. j. glycyrrhizæ rasæ 3 j. semi-
num anisi 3 ss. fiat arte *Potio*, sumat 3 iiij. in aurora, si
malum inducias dederit, huius decocti, cum 3 j. ss. præ-
dicti syrupi per tres aut quatuor dies. Postea prædictis
dum coquuntur, addemus fenæ Alexandrinæ 3 j. agarici
albi

albi & leuis ξ iij. seminum carthami ξ ss. fiat *Potio* purgatoria pro tribus vicibus.

\mathcal{R} agarici trochiscati, hieræ diacolocynthidos ana \mathfrak{z} j. ss. pillularum alephanginarum \mathfrak{z} j. oxymellis squillitici q. s. fiant *Pillule* octo numero: dentur post primum somnum.

\mathcal{R} pillul. cochiarum \mathfrak{z} j. pillularum de agarico \mathfrak{z} ij. rhabarbari \mathfrak{z} ss. fiant *Pillule* vt prædictum est.

\mathcal{R} diaphœniconis, cassiæ recenter extractæ ana ξ ss. agarici trochiscati \mathfrak{z} ss. sacchari albissimi q. s. fiat *Bolus*.

\mathcal{R} radicum raphani ξ ij. betonicæ ξ j. seminum nasturtii, atriplicis ana \mathfrak{z} ij. coquantur in aqua q. s. ad tertie partis consumptionem. vnciis quinque huius colaturæ addatur ξ j. ss. oxymellis squillitici, succi cepæ domesticæ ξ ss. misceantur, fiat *Vomitorium* medicamentum: detur post sumptum cibum, hinc obambulet aliquandiu. Vomitus quoque instituere poterit cum radice raphani & elleboro albo, vt prædictum fuit in melancholia.

\mathcal{R} conseruæ violarum, radicum enulæ campanæ ana ξ vj. conseruæ florum anthos ξ ss. sp. diaireos Salomonis, diatragacanthi frigidi ana \mathfrak{z} ij. ss. syrupi violacei, capillorum Veneris ana q. s. fiat *Linctus*.

\mathcal{R} syrupi de hyssopo, de prasio ana ξ j. lohoch è scilla, è pulmone vulpis ana ξ ss. radicum enulæ campanæ \mathfrak{z} ij. succi glycyrrhizæ, sacchari Candi ana \mathfrak{z} j. ss. fiat *Lohoch*.

\mathcal{R} syrupi de hyssopo, de marrhubio, violarum ana ξ j. oxymellis simplicis ξ j. ss. sumat cochleare loco lohoch cum haustu prisanæ.

\mathcal{R} syrupi glycyrrhizæ ξ ss. oxymellis simplicis ξ j. ss. lohoch de pulmone vulpis \mathfrak{z} vj. gummi ammoniaci \mathfrak{z} ss. fiat *Linctus*: sæpius vtatur in die.

\mathcal{R} radicis enulæ campanæ conditæ, dragonteæ ana ξ ss. lohoch de pulmone vulpis, lohoch sani ana \mathfrak{z} v. radicum ireos \mathfrak{z} ij. syrupi de hyssopo q. s. misceantur, fiat *Mixtura*, de qua frequenter in die sumat nonnihil.

℞ radicū enulę campanę, gentianę, pulmonis vul-
pis ana 3 ij. diaireos 3 iiij. mellis squillitici q. s. fiat *Ele-*
ctuarium molle: detur 3 j. cum decocto hyssopi, scabio-
sę, capillorum Veneris.

℞ glycyrrhizę rasę 3 ij. ss. hyssopi 3 j. croci 3 j. ra-
dicū vngulę caballinę 3 j. ss. macis 3 ij. fiat *Pulvis* quo
cibaria condientur.

℞ lohoch ē pulmone vulpis 3 j. aureę Alexandrinę,
mithridati optimi ana 3 j. squillę assę 3 ss. conferuę
radicū enulę campanę 3 ss. fiat *Electuarium*: dentur
bis in septimana dragmę duę cum vino in quo calidis
cineribus infundatur scabiosa, vngula caballina per ali-
quot horas.

℞ radicū enulę campanę conditarum 3 ij. radicis
ireos conditę 3 j. succi glycyrrhizę 3 j. ss. succi hyssopi
3 j. piperis, seminis vrticę ana 3 iiij. passularum enu-
cleatarum, amygdalorum amarorum ana 3 ss. syrupi de
hyssopo q. s. fiat *Electuarium* molle.

℞ granorum lauri 3 vj. radicū dragonteę 3 j. boli
Armeni 3 ij. succi glycyrrhizę 3 j. syrupi de hyssopo
q. s. fiat massa *Pillularum*: capiat tres aut quatuor ve-
speri.

℞ thuris, mastichis ana 3 j. ss. sulfuris 3 ij. ss. ligni iu-
niperi 3 ij. styracis 3 j. terebinthinę q. s. fiat massa
pro *Suffumigio*. Tempore vsus pillula vna aut altera
vuis carbonibus immittatur, fumusque per fistulam
conuenientem ore excipiat, & tegmen capitis eo
suffiatur: placidē superfluam cerebri exiccat humidita-
tem.

℞ olei camomelini 3 j. ss. anethini 3 vj. amygdalo-
rum dulcium 3 iiij. sp. diaireos 3 ss. radicū enulę cam-
panę, dragonteę, ana 3 j. cerę & aceti parum, fiat *Un-*
guentum.

℞ olei liliorum alborum, amygdalorum dulcium, lini
ana 3 ss. olei laurini, camomelini ana 3 iiij. butyri recen-
tis, pinguedinis gallinę, anatis, ana 3 iiij. succi hyssopi,
enulę campanę ana 3 ij. radicū dragonteę 3 ss. croci
3 ss.

℞. ceræ q. s. fiat *Unguentum* digestium & emolliens pro pectore.

℞. radicū iridis, enulæ campanæ ana ℥. β. farinæ hordeaceæ, oleaceæ, leminum lini ana ℥. j. sicuum pinguium numero decem, resinæ cerebinthinæ ℥. j. β. mellis despumati q. s. fiat *Cataplasma*.

A P P E N D I X

ad prædicta pro curatione *ASTHMATIS* inseruiens.

Omniū primò aliū subducatur clysterio conuenienti: horum autem hic frequens usus admodum probatur. Deinde dante inducias ipso malo naturæ obediētes reddemus humores peccantes pulmōesque grauantes. Hos postea ē corpore educemus placide purgantibus medicamentis. Hinc auertemus humores ad pectus ruentes errhinis, sternutatoriis medicamentis, apoplegmatismis, cucurbitulis, quarū una magno cum commōdo dorso ē regione cordis applicabitur si materia sit ventosa. Materia quoque frictiōibus auocabitur, necnon balneo calente, in quo criura fouebuntur. Demum quæ materiam in pulmōibus sepultam educere possunt, offeremus, in quorū numero sunt quæ spūtum promouere possunt: quibus addemus ea tandem quæ reliquias dissipare, pulmōesque roborare possunt. Hic autem cauendum, ne ea quæ multum calefacere aut exiccare possunt, offerantur medicamenta, sic equidem difficilius multò humores grauantes educerentur adhuc: cū enim magna ex parte humor huius malī sit crassus atque viscosus, diutiusque in pulmōibus plerumque detineatur, intenso calori si exponeretur, facile quandam quasi duritiem induet. Quare ea quæ placide calefacere humectareque possunt, addemus medicamentis incidentibus, lenientibus abstergentibusque. Hic quoque medicinae multum frigida vitanda, haud secus atque multum calētia medicamenta, nisi periculum suffocationis aut exulcerationis à catarrho impendeat. Et hic quoque ut in reliquis egritudinibus diuturnis, medicamenta aliquando permutabimus, cū ab eo quod consuetum est non fiat passio.



Methodus pro cognitione

**PLEVRITIDIS INSER-
VIENS.**

PLEVRITIS est inflammatio membranæ intrinsecus costas succingentis, quæ pleura dicitur, unde etiam morbus hic nomen sumpsit, à parte videlicet affectæ cui insidet. Hinc patet non quemcumque lateris dolorem, pleuritidem dici; quamvis enim plures laterum dolores sint, hîc tamen de eo agimus laterum dolore qui morbum acutum consequitur propter inflammationem membranæ intrinsecus succingentis costas. Si enim in exterioribus musculis inflammatio consistat, aut si à flatibus dolor ibidem magnus fiat, iam notha erit pleuritis, tunc febre carent, dolorem interim percipiunt in pectoris regione, qui tactu etiam irritatur ex parte, non ita tamen stabilis est, remittiturque aliquando ex applicatione eorum quæ flatus discutere possunt.

PARS AFFECTA, est membrana costas succingens intrinsecus: huius signa sunt præter respirationem impeditam, tussimque concurrentem, dolor punctorius, qui membranas esse affectas significat, & eiusdem doloris positus.

SIGNA. Dolor fit punctorius multum molestus & quidem plus ob dilatationis magnitudinem quam motionis velocitatem; magnitudo equidem dilatationis, tum comprimendo, tum distendendo, tum violenter mouendo pectus dolorem auget. Dolor autem hic aliquando ad hypochondrium, subinde ad claviculam extenditur. Spiratio est frequens propter urgentem necessitatem, atque parua propter dolorem, qui prohibet instrumenta respirationis plurimum attolli; id quod tamen

ne-

necessarium est propter magnam inflammationem, unde duplicare cogitur homo respirationem, ut vel hac ratione in maximo calore refocilletur cor. Febris quoque adest continua, propterea quod inflammatio usque eo vicina est cordi. Pulsus est frequens non nimis magnus, durus, & inæqualis, eaque ratione ad serræ modum asper. Concurrit quoque tussis, primò quidem sicca, quo tempore nihil quasi extunditur; tandem sputa pro diversa natura excrementi variè colorata reijciuntur, & magis fiunt humida, plura quoque reijcere incipit, estque magna ex parte id flauum quod reijcitur, hinc fit rubeum & cruentum, tandem verò ad maturitatem perducto apostemate, fit purulentum. Decubitus in affectâ partem facilior quam in alteram, potius tamen supinè cubat æger, malè enim affecto lateri si incumbat, dolor augetur, eo quod subiecto corpore materia plus distendatur propter pressuram. In latus verò sanum si conuertatur, pleura, vel membrana affecta magis distenditur, eo quod tumor suspendatur, & quasi pondere dependeat. Sub noctem dolor hîc plerumque intenditur. Contingit autem hoc malum quandoque terminari, eo quod materia exudet sensim ad pulmonem, sicque cum tussi expellitur; quod ut frequenter euenit, sic maxime optandum est. Aliàs quoque per cutis poros insensiles quasi euaporat; hocque rarius accidit. Aliàs materia maturatur, in saniemque transit, apertoque abscessu, nisi tunc tussi reijciatur, in quadraginta diebus empiricus aut phthisicus fit æger. Materia autem dum suppurari incipit, dolores febresque intenduntur, difficilius spirat, parum aut nihil tussi reijcit, maior in maxillis rubedo efflorescit, vigiliis, sitique torquetur. Remittuntur autem pure iam confecto, dolor atque febris; magis autem tussit, parum interim reijcitur. Tempore autem eo quo rupto abscessus instat, dolor febrisque increfcit, spiritus difficilius ducitur: vires labuntur, homo inhorrescit. Viribus constantibus hæc si fiant, bonaque sint quæ sputo redduntur, bene sperandum est.

Et quò maior febris atque dolor, necnon spiritus difficultas tunc fuerit, eò eruptio erit celerior, & contra quò mitiora hæc fuerint accidentia, eò tardius fiet. Principium autem morbi adhuc esse dicimus cum parum sputi, idque indigestum est, quòd si subrubeum aut subcitrinum appareat, iam finis instat principii. Hoc idem cum à subrubedine aut subcitrinitate in albedinem aut subliuidum colorem mutatur, maioriq; copia redditur, accidentiaque crescunt, augmentum mali dicimus. Statum verò adesse significat sputum æqualiter album, accidentiumque remissio. Cum autem sputum minuitur vnà cum accidentibus, erit declinatio. Subinde quoque postquam materia digesta est, transmittitur per venas chilis vel ad intestina, sicque per secessum excluditur, aut ad vrinarios meatus inde diducitur, per urinamq; expellitur. Aliàs ad fauces, cerebrum, aures, nervos transmittitur, vnde fiunt apostemata faucium, aurium, phrenitides, paralyfis, nonnunquam labitur ad iuncturas, subinde ad inguina. Dum dolor ad externa potius vergit, grauiusq; non autem pungens fuerit, pleuritis erit notha, contingitq; omnia mala mitiora esse. prætereà compressione externa, dolor ingrauescit, decubitus in sanam partem minus molestus est quàm in ægram. pulsus neque tensus, neque durus; inæqualis tamen atque frequēs est. A febre immunis est. Contingit tamen tam immanes dolores interdum excitari à flatibus vt veram accersant pleuritidem. Dolor in latere quoque excitatur in iecoris inflammatione, verum punctorius non est. perpetuò quoque sicca atque exigua est tussis à iecoris malo orta.

C A V S A est sanguis magna ex parte affluens ex vena caua per venam azimos in tenues costarum venas; estque subinde bonus simpliciter, quod significat sputum rubrum, tempus vernum, adolescentia, victus ratio multum sanguinis generans, temperamentum calidum & humidum, regio temperata. aliàs vero fit à pituitoso sanguine, tuncque morbus magis oritur diuturnus; tunc quo-

quoque spumans, candidumque est quod extunditur sputum: tempus anni hibernum, aeris constitutio regioque frigida. victus ratio pituitosum sanguinem generans. Et venis quoque saepe sanguinem cum immodica sua copia grauat, exprimit nimium frigus, calorve nimius, aquae frigidae liberalior potus, casus, portatio alicuius rei magni ponderis, frigus dum corpori calenti aut sudanti occurrit. Aliquando quoque multum est biliosus dictus sanguis; tuncque excitatur morbus magis acutus. Hemorrhoidum mensiumque suppressio, pleuritidem quoque excitare possunt.

PROGNOSTICA. Senibus, mulieribusque vtero gerentibus, iisque qui iam bis terve eo malo laborauerunt, pernitiola est pleuritis. Solet autem nocturno tempore magis molestare quam diurno. Quicumque laterali morbo laborantes in quatuordecim diebus non purgantur, ij ad suppurationem vertuntur. In pleuritide in qua nihil expuitur, aut in qua aliquid sputo reiectum est, nunc autem omnino desit, superstitie dolore pectoris atque grauitate, maximum periculum est; crudissimus enim morbus est, ita vt vel celeriter hominem rapiat; vel longo temporis spatio finiatur. Sputum omnino cruentum vel flauum, malum est, subcruentum verò multum à principio, malum nō est, sputum enim omne quanto magis commistos humores habet & non diductos inter se, tanto deterius est. Pulsus in pleuritide parvus, plurimumque creber atque durus, mortem significat. Cum autem species morbi ex propriis accidentibus cognoscatur, magnitudo autem morbi ex quantitate eorundem accidentium, dicimus pleuritidem satis mitem futuram, si dolor, anhelitus difficultas, febrisque non multum molestant; praeterea si tussi reiciatur aliquid coloratum, & decubitus in vtramque partem satis perferatur. Contra verò maximam periculosissimamque pleuritidem esse dicimus, si maximus fuerit dolor, qui ad iugulum & ad hypochondria se extendat, si tussis magna fuerit, cum qua nihil expellitur;



basilicam aut medianam, si dicta lateat, è directo ipsius laborantis; simul enim euacuat, reuellit, nec non diuertit, partitis autem vicibus id fiet potissimum vires sint debiles, nec plerhora adsit.

Clysteres clementes iniiciantur si adstricta sit aluus, vel eorum loco suppositoria.

Ligaruræ, nec non

Frictiones, fotusque calidi artuum.

Cucurbitulæ hypochondriis inguinibusque affixæ; hinc etiam humeris, in senibus puerisque magis quam sanguinis missio commendatur, nisi vires sint validæ.

Sanguisugæ etiam apponentur si vena non appareat, potissimum quidem in pueris, caudæque earum abscindetur, vt plus sanguinis sanguisugæ proliciant.

P R A E P A R A N T I B V S.

Syr. violatus, de iuiubis, capillorum Veneris, addendo saccharum violatum; melius enim sputum educit; postea etiam parum mellis addemus.

Syr. glycyrrhizæ cum aqua hordei.

Aqua saccharata, cui cinnamomi etiã aliquid addetur.

Aqua endiuizæ, hordei cocti.

Decoctum hordei, violarum, glycyrrhizæ, iuiubarum, sebesten, cardui benedicti, syrupis dictis additis, ad sitim remittendam, ad detergendum & incidendum præstans est potus.

V A C V A N T I B V S.

Diaprunum lenitium.

Diacatholicum, diaphœnicum.

Syr. rosarum laxatiuus.

Agaricus cum decocto pectorali.

Rhabarbarum cum manna & syr. glycyrrhizæ.

Cassia nouiter extracta.

Clystere potius quam purgatorium medicamentum conuenit ex decocto communi, oleo violato, camomelino, cassia extracta.

Si materia aliqua præter sanguinẽ peccet, conuenienti medicamento educatur. Diligentissime autem hic

O ij

obseruandum, ne validum medicamentum purgans offeramus, & potissimum si aliquibus indiciis augurari liceat materiã adhuc fluere. Omnino autem hîc abstinemus ab elleboratis, scammoniatis, aliisque huiusmodi medicamentis validis; multi equidem inde periere, contingit enim virtutem multum inde debilitari: sanguis prætereà magis ut fluat, huiusmodi purgante medicamento irritatur. Si autem à catarrho malum oriatur, aut si versus hypochondria dolor vergat, aut si in intestinis, aut ventriculo, aliisque partibus vicinis: copiam humorum, à quibus ipse morbus incrementum sumere possit, subsistere intelligamus, tunc conuenientilente medicamento has partes exonerare licebit, aut clysterio. Ante septimum tamen diem deiectorium medicamentum non offeremus: periculum enim est ne sputa inhibeamus, quæ omni ratione promouere debemus. Et ne septimo quidem die peracto, admitteremus deiectorium medicamentum, si corpus sit admodum extenuatum, febrisque fuerit vehemens: magis enim colliquabit corpus quàm humorem peccantem è loco affecto educet.

FACILITANTIBVS *sputum, quæ via est accommodatissima, ut materia pleuritidis educatur.*

Syr. iuiubarum, glycyrrhizæ, violarum, cum duplo aquæ hordei ad quartum usque diem imperabitur: tunc paulatim imminuemus syrupum violarum, & increset syrupi glycyrrhizæ quantitas.

Syr. ziziphorum.

Saccharum violatum, Candum, pillulæ albæ.

Diapenidium, diatragacanthum frigidum cum iulebo violato: cui tandem etiam addetur diaireos Salomonis parum.

Lohoch de pino, lohoch sanum.

Decoctum ficuum, hordei, violarum, ziziphorum, glycyrrhizæ, cui addemus syr. glycyrrhizæ post tertium vel quartum

quartum diem.

Diabuglossatum prædictis permiscebitur pro cordis confortatione.

Vnguentum ex oleo violato ad quartum diem præscribetur, eo autem pectus vngetur: postea addemus oleum amygdalorum dulcium, liliorum, camomelinum: aut solo utemur oleo amygdalorum: postea addemus etiam puluerem ireos, aut hyssopi.

Ab astringentibus hîc abstinebimus medicamentis, eorûmque loco digerentibus, & quæ partem tensam relaxare possunt, utemur, id quod oleum violatum optimè inter reliqua hîc præstat: præterea caloris acrimoniam optimè remittit: pro varietate autem temporis hoc variabimus.

DIGERENTIBVS resoluentibûsque reliquias, suppurationemque prohibentibus; hinc enim periculum ne à sanie ulcus pulmonum, & hinc phtisis oriatur.

Diahyssopus. Prædicta sputum promouentia.

Fomentum ex vino albo in quo decocta sint flores camomillæ, meliloti, radices althææ, semina lini, fœnugræci, furfures, anethum, hyssopus, folia violarum, maluæ. Vesica decocto ex parte impleatur, in flatibus quidem multum emolumenti habet in principio si adhibeatur: si verò sanguis huius mali causa fuerit, potius augebitur malum, quare in principio non nisi cautè eo utendum, postea verò liberius.

Vnguentum dialthææ, cui pul. ireos modicum addetur.

Vnguentum ex oleo camomelino, pinguedine gallinæ, oleo amygdalorum dulcium, violarum, radice ireos.

Brassicæ folia iuxta ignem quasi arefiant, laterique ubi butyro illita erunt, superponantur,

Cataplasma vel emplastrum fiat ex fomentorum materia, oleo amygdalorum dulcium, liliorum, lini, camomelini, mucilagine seminum lini, fœnugræci, althææ, maluæ, quibus inspergere licebit nonnihil pul. sinapi, nasturtij, ubi iam lateri accommodari decretum erit.

O . iij

Sint mollia actúque calentia , atque tenuia omnia quæ lateri admouentur, cūmque refrixerint, remouenda sunt.

THEORICA ET EMPIRICA MEDICAMENTA nobilia in PLEVRITIDE, sæpius cum summa salute plurimorum egrotorum à Gualtero Bruele experta.

CVRATIO PLEVRITIDIS.

℞ hordei mundi m. j. foliorum maluæ, mercurialis, violarum ana m. j. β. pruna damascena numero xij. coquantur in sufficienti quantitate aquæ ad ℥. j. se. colaturæ addatur cassiæ recenter extractæ, sacchari rubri ana ʒ j. olei violarum, lini ana ʒ j. se. vitellum oui, fiat *Clystere* emolliens, alternis diebus iniiciatur.

℞ syrupi de iuiubis, glycyrrhiæ ana ʒ j. se. syr. violati ʒ j. aquarum vngulæ caballinæ ʒ v. decoctionis hordei, ficuum, capillorum Veneris ʒ vj. fiat *Iuleb*.

℞ syr. violacei, glycyrrhiæ, acetosi compositi ana ʒ j. aquarū scabiosæ, vngulæ caballinæ, decocti hordei mūdi ana ʒ iiij. fiat *Iuleb*.

℞ hordei mundi m. iiij. passularum mundatarum ʒ ij. glycyrrhiæ rasæ ʒ j. hyssopi, vngulæ caballinæ ana m. j. seminis anisi, lini, melonum ana ʒ j. florum cordialium p. j. fiat decoctio in aqua q. s. ad ℥ ij. colaturæ addantur syrupi violati ʒ iiij. fiat *Ptisana*.

℞ syr. violati, glycyrrhiæ, oxymellis simplicis ana ʒ se. diarragacathi frigidi, sacchari candi ana ʒ iiij. fiat *Loboch*.

℞ cassiæ recenter extractæ, diacatholiconis ana ʒ se. decoctionis communis q. s. fiat *Haustus*, detur manē.

℞ cassiæ recenter extractæ ʒ vj. diapruni solutiui ʒ ij. rhabarbari electissimi ʒ sem. syrupi violati ʒ j. decocti hordei ʒ iiij. fiat *Haustus*.

℞ agarici albi & leuis ʒ ij. rhabarbari electi ʒ ij. sem. spinæ gr. ii. infundantur in ʒ v. iusculi carnium, colaturæ ad-

ræ addantur diacatholiconis 3 iij. syrupi violati 3 j. fiat *Haustus*.

℞ sacchari violati 3 j. manus Christi perlati 3 vj. sacchari candi 3 β. sp. diatragacanthi frigidi 3 ij. β. syrupi violati q. s. fiat *Linctus*. Aut saccharum candum, necnon violatum in ore detineat, aut diapenidion.

℞ syrupi de iuiubis, violarum, glycyrrhizæ ana 3 j. capillorum Veneris 3 β. sacchari candi 3 vj. fiat *Loboch*, incrassans sputum, si sua tenuitate illudat.

℞ syrupi glycyrrhizæ de hyssopo, acetosi simplicis ana 3 j. oxymellis squillitici 3 vj. fiat *Loboch*, quo utetur si sputum ita crassum viscidumque sit, ut ea ratione difficulter extundatur. Iuscula carniū quoque cum saccharo sæpiuscule dentur. optimè enim sputum promouent.

℞ diaireos simplicis, pillularum bechicarum ana 3 β. diatragacanthi frigidi 3 iij. sacchari candi, succi glycyrrhizæ ana 3 ij. β. syrupi violati q. s. fiat *Linctus*, coquit & expurgat, eius portionem cum bacillo glycyrrhizæ lambendo transmittat paulatim æger.

℞ olei violarum, amygdalorum dulcium ana 3 j. ceræ & croci parum, fiat *Vnguentum*, hinc tempore cum magis resolvere consilium est, addemus radices liliorum alborum, hyssopum, oleum camomillæ, aut sic:

℞ vnguenti pectoralis, olei lini, amygdalorum dulcium, pinguedinis capi ana 3 ij. olei camomelini 3 iij. croci gr. ij. ceræ q. s. fiat *Linimentum*. In principio autem mali,

℞ olei violacei 3 i. amygdalorum dulcium 3 β. lini panni iis imbuantur quibus locus vngatur, fasciæque firmentur.

℞ olei amygdalorum dulcium, keirini, liliorum, vnguenti dialthææ ana 3 β. pinguedinis capi, butyri recentis non saliti ana 3 ij. ceræ & aceti parum, fiat *Linimentum*.

℞ radicū liliorum, florum camomillæ, meliloti,

O iij

rosarum rubrarum, foliorum maluæ, scabiosæ ana m. j. furfurum, seminum lini, fœnugræci ana m. j. *℥*. coquantur in aqua q. s. pro fotu, spongiæque aut vesica porcina lateri accommodentur dolenti, panno lineo lateri prius superposito, ne locus nimium madescat.

℞ olei violacei, amygdalorum dulcium ana *℥* *℥*ss. camomillæ, butyri maialis, vnguenti dialthææ ana 3 j. olei anethini, liliacei ana 3 iij radicum ireos 3 j. cere parum; fiat *Vnguentum* mollis consistentiæ.

℞ olei lini, camomelini, violarum ana q. s. pro *Fomentatione*.

℞ radicum ireos, enulæ campanæ ana 3 j. radicum althææ 3 vj. thymi, vngulæ caballinæ, saluiæ, hyssopi, betonice ana m. *℥*. coquantur in aqua q. s. ad tertię partis consumptionem, colaturæ adde mellis despumati q. s. fiat *Iuleb*, lenit, coquit atque educit materiam mali, maximèque versus declinationem conuenit.

℞ seminum cumini 3 j. rorismarini, hyssopi, origani ana m. j. salis torrefacti m. j. *℥*. furfuris frixi m. ij. conspergantur vino albo tenui dum friguntur, fiat *Sacculus* qui dolenti loco calidus superponatur versus statum. In vino calente immergetur vbi refrixerit, sicque iterum applicabitur, linteolisque calentibus calor conseruabitur; cauendum enim diligenter ne frigescant admota lateri.

℞ maluæ, bismaluæ ana m. j. florum camomillæ, meliloti, artemisię ana m. *℥*. hyssopi p. ij. absinthii p. j. radicum althææ 3 *℥*. fiat decoctio in aqua q. s. ad spissitudinem, pistentur in mortario, addaturque farinæ hordei 3 j. *℥*. farine seminis lini 3 j. pinguedinis capi, butyri sine sale ana 3 *℥*. olei camomelini q. s. fiat *Cataplasma*.

℞ radicum althææ 3 j. florum camomillæ, anethi ana m. j. farine hordei, seminum lini, fœnugræci ana 3 j. seminum anisi 3 *℥*. coquantur in aqua q. s. ad molli-
tudinem; pistatis in mortario conuenienter, addatur
olei

olei camomelini q. s. fiat *Cataplasma*.

R. syrupi violacci ℥ j. papauerini ℥ β. decocti hordei ℥ iij. detur sub noctem si vigiliæ multum perturbent. Vnguentum pro temporibus atque fronte fiat cum oleo violarum, necnon populeonis.

A P P E N D I X

ad prædicta pro curatione PLEVRITIDIS
inseruiens.

Ne incrementum sumat, omnium primò alius clysterio abluatur, eoque reiecto vena incidenda erit vti prædictum est: complementum morbi hoc equidem remoratur. Hinc clysteribus lenioribus, cucurbitulis quæ hypochondriis affiguntur, ligaturis, frictionibus, suppositoriis materia ad partem affectam ruens auerteretur, complementumque morbi prohibebitur. Materia quoque si magna copia grauet corpus, aut furiosa si fuerit, aut si nondum fluxa sit in partem affectam, furiosa modò tamen sit, dolorque ad inferiorem thoracis partem vergat, leni aliquo purgante medicamento vacuabitur etiam ante digestionem, ut augmentum morbi, eiusdemque complementum inhibeamus, quod omni ratione prohibere debemus. Demum materia pleuritidis quæ in pulmones exudat, naturæ obediens reddetur cum iis quæ thoraci familiaria sunt, quæque sputum promouere possunt. Prædictis autem si suppurationem materiei prohibere non possimus, ea quæ pus efficere possunt præscribentur. In quem finem bibet decoctum ficuum, dactylorum, hordei, radicum liliorum, maluæ, seminum nasturtij, lini, fænugræci, sinapi, glycyrrhizæ, passularum. Fomentationes fiant cum decocto maluæ, althææ, seminum fænugræci, lini, cydoniorum, ficuum. Cataplasma fiat cum malua, althæa, semine lini, fænugræci, cydoniorum, dactylis, ficibus, butyro, melle, adipe gallinæ, anatis, porci. Maturationem factam esse postquam ex febris dolorique remissione, necnon ex grauedinis incremento circa locum affectum, intellexerimus: tunc data opera iussiet frequenter, idque hora una interiecta, & in latere affecto potius decumbet quàm sano: Titillabit interiora

palati placidè digi: o vel calamo, ita ut ad vomitum solummodo irritetur, non vomat tamen. Abscessu rupto, propinabimus aquam mellis, aut sacchari, aut aquam hordei cum syrupo de hyssopo, mundificandi gratia. Fomentabimus partem affectam cum decocto hyssopi aut calaminihæ. Ungemus pectus oleo liliorum, camomillæ, pulvere ireos. Dabimus iusculum antiqui caponis in quo coctus sit hyssopus, capillus Veneris. Demum quæ consolidare possunt, propinabimus, ut est lac caprarum, & alia quæ in capite De sputo sanguinis dicentur. Pleuritis autem si fuerit non vera, tunc quæ leuiter resolvere possunt, imperabuntur. R. florum camomillæ m. j. ss. foliorum rutæ, anethi, violarum, maluæ ana m. j. coquantur in aqua ad tertias: sponsia magna immergetur liquori calenti, laterique dolenti applicetur, mediante panno lineo calente, ut calor diutius conseruetur: hoc multoties repetetur, singulisque vicibus nouo panno calente, concludatur sponsia dum apponitur. Ab ulteriori autem operatione excusabimur si corporis absit plenitudo, & si materia dolorem excitans, ventosa fuerit, & ex paucâ humoris quantitate constiterit atque subtili. In eundem finem sacculus poterit applicari ex sale, melle, fursuribus. Aut tale cataplasma, R. florum camomillæ, meliloti ana m. j. foliorum rutæ, maioranæ, nepitæ ana p. j. seminum anisi 3 ij. baccarum lauri, 3 iij. modicè coquantur: hinc pistentur addendo mellis q. s. fiat Cataplasma. Aut emplastrum fiat ex oleo camomellino, pice nauali. Cucurbitulis etiam euocare foras optimè poterimus materiam mali.

Metho-



Methodus pro cognitione

SPVTATIONIS SANGVINIS INSERVIENS.

S P V T V M S A N G V I N I S seu cruenta spuitio ; est quælibet ex ore sanguinis excretio. Est autem hic affectus sæpe causa morborum pessimorum longorúmque. Variis autem ex locis contingit sanguinem reijci, vti ex subsequentiis intelligi potest. Obseruandum autem hîc erit diligenter num sanguis antea fluere è naribus consueuerit ; illinc enim sæpe in ventriculum, fauces, interdum etiam in pulmones ruere contingit, sed plerumque concrescit, & in grumum transit. Si itaque sanguis spuatur, neque sanguinis fluxus narium præcessit, è parte aliqua subiecta prouenit, quod peculiaribus signis, vt sequitur, innotescet.

PARS AFFECTA. A gingiuis atque ipso ore sæpe redditur sanguis spuito, tuncque est sanguinei coloris, eiusque pauci expuitio, idque sine tussi: solutio quoque continui hîc sæpe sensui manifesta est. Si à faucibus aut gurgulione proueniat, tunc screatu reijcitur, non tussi, solutioque continui apparet in locis dictis, si lingua deprimatur. Si verò à capite deferatur, capitis præcessit grauitas & dolor, auriúmque sonitus, venæ frontis sunt elatæ, in ore quidam sensus caloris, sanguinisque, & iuxta palatum titillatio quædam percipitur si in guttur irruat, vnde cum frequenti screatu etiam reijcitur. Sæpe etiam cupiditas tussendi, absque multa tamen tussi est. Si verò à pulmonibus deferatur, tunc sanguis erit spumofus atque floridus, semper quoque tunc cum tussi frequenti, citràque dolorem reijcitur, idque per interualla. Quotiescumque autè sanguis reijcitur,

propterea quòd rupta est vena aliqua magna, tunc magna copia extunditur, etiam nulla notabili præcedente causa, quasque vomitu propellitur ita, ut aliquando etiam eo pelues impleantur. Si verò effundatur propter venæ alicuius in pulmone erosionem, quæ sæpe ab acri humore destillante fit, tunc sensim & per modica intervalla, minúsque copiosè profunditur, nisi magna aliqua vena sit erosa, tunc enim copiosè etiam profunditur, estque hoc periculosum magis. Solet tunc tussis fieri sicca atque magna. Sputum fit purulentum vel subcruentum; praviusque fit coloris atque odoris. Febris hic quoque concurrit. Aliquando etiam pulmonis pars aliqua putrefacta reijcitur tussi; estque illud omnium certissimum indicium propriam pulmonum substantiam esse ulceratam. Subinde etiam sanguis reijcitur sputo ex venæ solius apertura, uti in calidiore humidiorque victus ratione accidit, tunc in parva quoque quantitate in principio reijcitur, estque tenuis rubeusque. Si verò à thorace, pectoreve reijciatur, minimè est tunc sanguis spumefus, sed nigricans ac grumofus; quem colorem aliquando quoque consequitur in pulmonibus, dum è naribus eò deolutus in grumum concrevit. Interdum etiam foetidus, aliquando puri est permixtus, & tussi reijcitur magis valida atque frequenti, eò quòd necessum sit ut ad pulmones trahatur antequam per asperam arteriam propellatur; in pauca autem quantitate etiam reijcitur, idque non absque thoracis dolore. Si ab aspera arteria prodeat, id cum aliqua li sit dolore, sanguis quoque paucus, ruber, calidusque cum parva tussi reijcitur. Si à ventriculo deferatur, id fiet absque tussi, & cum vomitu, eritque non multus, eò quòd parvæ venæ sint in stomacho, grauitas in stomacho etiam percepta fuit. Si verò ab hepate deferatur, splene vel ventre, dolor grauans has partes turbavit, vomitione tunc sanguis redditur. Maiorem autem quantitatem ipso stomacho, reliquæ solent conferre partes. Obscuri quoque coloris erit, ad nigredinem enim

enim aliqualem vergit, grumofus infuper non nihil erit, potiffimum tamen fi à fplene eructetur. Diligenter itaque priusquam remedia inftituantur, proprii reiectionis modi fingularum prædictarum partium obferuandi funt. Eft autè cruenta fputio, fymptoma pertinens ad exiens mutatū toto genere præter naturam.

SIGNA ipsius affectus partiumque affectarum ex prædictis parent.

CAUSA. Fit frequentius à plenitudine, & à fanguine peccante in quantitate, multitudine nimirum; hinc enim oscula vaforum referari contingit, cuius figna funt, bona corporis habitudo, alimentorum calidorum, vini-que immoderatus vfus; menfium fuppreffio. nullus autem tunc incidit dolor, fed potius corporis alleviatio fequitur, grauitasque eiusdem antecellit. tuncque paucus eft, necnon floridus, fpumofus, rubeusque. Mulieres aliquando absque vlllo rabis periculo hac fanguinis profufione in menftruorum fuppreffione leuatae funt. Sæpe quoque ex laboribus, cafu, valido clamore venam pulmonum rumpi contingit, fanguinemque hac ratione profundi. Interdum etiam fit propter vaforum erosionem, tuncque fanguinis reiectio fit paulatim vt prædiximus, & per modica interualla & non confertim, præceffit acris diffillatio. Si quoque putulentus fit fanguis, magis certò in pulmonibus aliquid exulceratum effe fignificabitur: vt fi pars aliqua venæ vel arteriæ pulmonum reiciatur, certum eft easdem pulmonum partes excas effe.

PROGNOSTICA. A pulmone vlcerato plurimum impendit periculi, cum inde fuppuratio & tabes certò expectanda fit; ratione enim continui motus, consolidari non, nifi difficulter poffunt pulmones: adde quòd in fpongiofo membro fanies firmitus hæret, ita vt non nifi magna cum difficultate educi poffit, eaque ratione materiem acredinem contrahit, magisque pulmonem exulcerat, vnde anhelitus impeditur; calor incrementū fumat, corpusque tabefcit. Vena autè pulmo-

in pulmonibus fiat; ut lac, pedes vitulorum, suum, hædorum, gluten piscium. Conueniunt carnes gallinarum, columbarum, cuniculorum, capreolorum, perdicum, phasianorum, auicularum, pisces saxatiles; cancri quoque fluuiales. Sit quoque parua cibi quantitas.

Potus sit vinum aut aquosum, aut aqua rosata dilutum. aliquando etiam detur vinum rubellum astringentium, si vires imbecilles sint.

Lac caprinum bibat.

Exercitium fugiat omne, eiusque loco quies imperetur. Spiritus leniter ducatur; magna equidem respiratio offendit.

Somnus conuenit nocturnus moderatus, nequaquam diurnus.

Excrementa alui respondeant indies arte aut natura. A Venere abstineat.

Animi perturbationes vitet, & potissimum iram.

PRÆPARANTIBVS.

Syr. de succo acetosæ.

Syr. violarum, rosarum.

Syr. myrtilorum, cydoniorum.

Succus granatorum, omphacini.

Aqua acetosæ, rosarum, solani, plantaginis, portulacæ.

Bilis feruorem hæc leniunt; sanguinis quoque fluxum astrictione sua inhibent.

VACVANTIBVS.

Rhabarbarum cum aqua plantaginis.

Myrobalani citrini, chebuli.

Cassia.

Turbith cum zinzibere.

Hæc pituitosos humores sanguini permistos, necnon biliosos acresque, à quibus sæpe venarum fit apertura, & aliquando etiam erosio, & per consequens etiam sanguinis sputum purgant.

AVERTENTIBVS.

Venæ sectio fiet internæ, aut medianæ, bis aut ter autem instituetur in die ; parumque euacuabitur si iam bona sanguinis quantitas sit excreta : contra verò si recens malum sit , & si vasorum adsit plenitudo , parumque sanguinis excreuerit, & ab ulcere sit immunis , liberius euacuabitur, secabitur autem vena in eo latere in quo occasionem mali esse verisimile est, siue ob aperturam aut rupturam sanguinis effusio fiat. Malleoli verò vena aperietur si à mensium suppressione ortum habeat.

Cucurbitulæ natibus, coxis, inguinibus, hypochondriis, hepatisque regioni affigentur.

Frictiones infernarum partium dolorificæ, & ligaturæ paululum supra genu, vel malleolos, nec non supra cubitum & brachia fient.

Fotus earundem partium fiet ex aqua calente; tam enim calor quam dolor attrahit.

Sanguisugæ pectori apponentur.

Hæmorrhoidum prouocatio fiat, aut menstruorum.

Vena aperta vel rupta, præsentibus remediis summo-
perè sanguinis impetum auertere debemus.

*SISTENTIBVS sanguinis motum, vasorumque ora
contrahentibus, tenuitatēque sanguinis atque
humorum incrassantibus.*

Trochisci de terra sigillata cum aqua plantaginis, de spodio cum syr. cydoniorum plurimum iuuant.

Athanasia, phylonium Persicum, Romanum.

Syr. granatorum, myrtinus, cydoniorum, rosatus.

Saccharum rosatum, conferva rosarum antiquarum.

Diacydonium.

Cornu cerui vstum, corallum album vstum, terra Lem-
nia, sigillata, semina cydoniorum, myrtilorum.

Bolus Armenus, malicorium, balaustix, succus ribes.

Mastis, tragacanthum, gummi Arabicum.

Plantago atque portulaca magnarum sunt virium in hoc malo.

Centino-

Centinodium, decoctum hordei cum syr. rosato, cydoniorum, de rosis siccis, saccharo rosato.

Vinum saluiatum, portulaca commansa ore diutius.

Diatragacanthum frigidum.

Loch è lapide hæmatite, bolo Armeno, balauistiis, malicorio, myrtillis, mastiche, tragacantho, corallo, gummi Arabico, cornu cerui vsto, amilo, terra Lemnia, conferua rosarum, diatragacantho frigido, syr. violato.

Fomentum fiat cum aqua scabiosæ, & vino astringente, rosato, cydoniorum, myrtino.

Vnguentum ex oleo cydoniorum, myrtilorum, rosarum, amygdalorum dulcium, camomelino.

Sistunt sanguinem fluentem hæc astrictione sua, & bilis quoque vim obtundunt, vlcus denique vsu glutinant, & catarrhum tenuem incrassant & obtundunt; quæ aliquandiu continuabuntur, etiamsi fluxus sit suppressus, facile enim repetere solet. Sumuntur autem hæc omnia actu frigida. Addenda quoque sunt aliqua quæ tenuium sunt partium, eò quòd eorum vis non admodum penetrat, vt est cinnamomum, spica. Cauendum quoque à medicamentis nimium astringentibus, aut refrigerantibus, cum sanguinem intrò in pulmones impellant, sistantque, vnde eius putrefactio, pulmonumque vlcera sequuntur insanabilia. Ante vsum autem auertentium istis nequaquam vtemur extrinsecus: periculum enim est ne sanguinem intrò in pulmones propellant, cum magna inde venarum internarum repletio tumefactioque sequatur.

CORRIGENTIBVS *symptomata graui.*

Oxymel simplex, compositum, squilliticum.

Oxycratum, seu aqua aceto ita permixta, vt bibi possit, in principio potissimum mali plurimum iuuat, si grumi obhæreant sanguinis concreti.

Diacurcuma, theriaca cum aqua scabiosæ.

Coagulum leporis celebre medicamentum, cerui, hædique.

P

Mummiæ.

Succus saluæ cum saccharo.

Aqua oxalidis, saluæ, scabiosæ.

Theriaca vnius anni.

Phylonium Romanum cum succo polygonij.

Syr. papauerinus, violarum.

Semen papaveris albi.

Cortex radicum mandragoræ.

Iuscula carniū expressa.

Diarrhodium abbatīs.

Aromaticum rosatum.

Prima sanguinem concretum ad exitum adiuuant, sequentia tussim sedant, somnūque accersunt. Postremo ordine posita, vires restaurant.

THEORICA ET EMPIRICA MEDICA-

menta nobilia in SPVTATIONE SANGVINIS sepius cum summa salute plurimorum egrotorum à Gualtero Bruele experta.

CVRATIO SPVTATIONIS SANGVINIS.

℞ syrupi myrtini, de portulaca, cydoniorum, violati ana ℥ j. boli Armeni, lapidis hæmatitis vsti ana ℥ j. sc. aquæ portulacæ, plantaginis, bursæ pastoris ana ℥ iiij. misceantur, fiat *Iuleb*: detur quatuor vicibus actu frigidum.

℞ hordei mundati, rosarum siccarum ana m. ij. seminum plantaginis ℥ j. coquantur in aqua q. s. ad tertiæ partis consumptionem, colaturæ ℥ iiij. addatur sacchari rosacei ℥ se. syrupi de rosis siccis ℥ j. fiat *Potus* quo familiariter vtatur.

℞ syrupi papauerini, de rosis siccis ana ℥ j. sc. cydoniorum ℥ j. aquarum bursæ pastoris, plantaginis, violarum ana ℥ iiij. fiat *Iuleb*.

℞ radicum & foliorum plantaginis ana m. j. glycyrrhizæ rasæ

zæ rasæ 3 ij. rhabarbari electi 3 j. se. coquantur in aqua q. s. ad tertiæ partis consumptionem: huius colaturæ accipe 3 iiij. cassiæ recenter extractæ, syrupi violarum ana 3 j. misceantur, fiat *Hæustus* detur frigidum.

Rz succi plantaginis, portulacæ, virgæ pastoris, millefolij ana 3 j. sem. syrupi violati 3 j. myrtini 3 sem. boli Armeni, lapidis hæmatitis ana 3 se. misceantur: fiat *Potus* præstans.

Rz sacchari rosacei veteris 3 se. succi plantaginis, saluiæ ana 3 j. se. boli Armeni, phyloni Romani, theriacæ recentis ana 3 sem. misceantur: fiat *Potus*, aut eius loco theriaca recens propinetur; aut si antiqua fuerit, momentum opi permiscebitur.

Rz radicum plantaginis 3 j. se. portulacæ, polygonij ana m. j. fructuum rubi immaturorum, vuarum acerbarum ana 3 j. se. balaustiorum 3 se. glycyrrhizæ rasæ 3 j. coquantur in aqua quantum satis ad tertiæ partis consumptionem: colaturæ addatur sacchari albissimi q. s. iterumque ad syrupi confidentiam coquantur, de quo capiat 3 ij. cum succi plantaginis & portulacæ vncia vna & media.

Rz diatragacanthi fridi, sacchari rosacei veteris ana 3 j. se. rob berberorum 3 se. pillularum de cynoglossa 3 ij. syrupi violarum 3 ij. fiat *Linctus*: sæpius in die lambendo transmittat portionem ad pectoris regionem.

Rz sacchari rosacei 3 j. terræ sigillatæ, boli Armeni, mummiæ, rosarum rubrarum, rhabarbari costi ana 3 j. se. pulueris pulmonis vulpis exiccati, cinnamomi, lapidis hæmatitis ana 3 j. seminis plantaginis, papaueris, antheræ ana 3 se. fiat *Pulvis*: dosis 3 j. cum aqua ferrata detur.

Rz mororū rubi immaturorū & exiccatorū 3 ij. cornu cerui vsti 3 ij. sem. boli Armeni, seminum plantaginis ana 3 j. trochicorum de carabe 3 j. sem. thuris, myrrhæ, matichis ana 3 j. glycyrrhizæ 3 j. misceantur, fiat *Pulvis*. detur 3 j. cum vino rubro astringente.

Rz trhochiscorum de terra sigillata 3 ij. trochiscorum de carabe 3 j. se. pillularum de cynoglossa 3 j. cum syru-

P. ij

po violarum, fiat massa *Pillularum*: detur 3 j. in aurora.

℞ rosarum siccarum m. j. granorum sumach, myrtilorum, hypocisthidos ana 3 j. sandalorum rubrorum, corticum malorum granatorum ana 3 iij. coquantur vino austero q. s. ad tertiæ partis consumptionem, fiat *Epihe-*
ma, quo pectus forinfecus irrigetur.

℞ olei rosacei, cydoniorum ana 3 v. boli Armeni 3 j. trochiscorum de carabe 3 se. malicorij 3 j. fiat *Unguentum* pro pectoris regione.

℞ farinæ hordei, lentium, radicum symphyti ana 3 j. malicorij 3 se. foliorum sanguinariæ, portulacæ, plantaginiana m. j. coquantur in vino austero q. s. ad molli-
tudinem: hinc adde thuris, aluminis ana 3 j. se. boli Armeni 3 iij. se. corallorum rubeorum 3 j. olei rosacei, myrtini ana q. s. fiat *Cataplasma*.

℞ mastichis, thuris ana 3 j. boli Armeni 3 iij. sem. mummiæ 3 sem. picis & ceræ quantum satis, fiat *Emplastrum* molle.

APPENDIX

ad prædicta pro curatione SPVTATIONIS SANGVINIS inferuens.

Omniū primò vena interna secabitur observatis antea dietis. Deinde cucurbitulis, ligaturis, sanguisugis, frictionibus, sanguinis motum auertemus. Hinc medicamenta quæ immodicè fluentem sanguinem sistere possunt, offeremus. Magis autem præsens remedium in potionibus quàm in localibus medicamentis est. Deinde quæ conglutinare partes diuisas possunt, præscribentur, potissimum si sanguis profundatur propter rupturam venæ alicuius ipsius pulmonis, antequam sanies generetur: magna equidem cum difficultate alioqui sanabitur si in saniem atque putredinem transeat sanguis excretus antequam vena rupta fuerit consolidata. Multum autem in præseni malo iuuare compertum est potum ex aceto, cui multum permistum sit aquæ: sanguinem equidem infrigidat, & in-
crassat, sicque à fluxu, & ne congeletur, prohibet; vix tamen
eò quòd

cò quòd tussim nonnihil moueat, admittetur, nisi ea quæ tussim sedare possint, commisceantur. Narcoticis autem medicamentis hic nequaquam utemur in mali principio; sed ubi frustra leuioribus remediis usi fuerimus, calamitatèmq; potiùs incrementum sumere obseruabimus, maiora auxilio adhibebimus, viribùsque constantibus narcoticis tunc uti licebit. Si autem à capite ad pulmonem sanguinem illapsum esse ex colore aliquàliter nigricante intellexerimus, astringentia intrò non dentur.

Methodus pro curatione

**PALPITATIONIS COR-
DIS INSE-
VIENS.**

PALPITATIO CORDIS est immodica cordis eleuatio atque depressio, & quidem molesta, præterque naturam, ab excretrice facultate id quod noxium est excludere nitente, incitata. In pulsu quidem naturaliter & ex seipso cor mouetur; in hoc verò malo, quamuis à corde fiat ipse motus, nequaquam tamen fit naturaliter, sed ab excretrice facultate irritatur, & quodammodo concutitur cor, moueturque quasi tremulo quodam motu, cum se nunc dilatat, nunc contrahat, ut noxium vaporem, & id quod molestum est, dissoluat atque excutiat. Operatio itaque motus qui in pulsu fit, naturalis est; qui verò in palpitatione cordis motus accidit, præter naturam est. Affectus autem hic nomen inuenit à parte affecta atque symptomate quo molestatur æger. A cardiaca passione plurimum differt palpitatio cordis, illa enim ipsius oris ventriculi affectus est, nequaquam autem cordis, uti hoc de quo nunc agimus malum.

PARS AFFECTA, est ipsum cor, quod cum pericari-

P iiij

dio afficitur aut primario, aut per consensum stomachi, matricis, intestinorum, lienis, hepatis, aut alterius partis, quod fit, cum in iis humores aut vapores maligni latent, cordique inde communicantur, quod intelligitur per nocumenta earundem partium quę adfunt aut præcesserunt. Est autem palpitation cordis, symptoma quod continetur sub deprauato motu ipsius cordis, qui toto genere præter naturam est.

SIGNA. Spiratio est exigua atque rara; pulsus ipse est inæqualis, cor ipsius ægri quasi concussum, tremit & palpitat, ita ut id medicus etiam primò occursum quasi percipiet, modò manum cordis regioni applicet: facileque observabit, multum differre hanc motionem cordis, à vero pulsu cordis. Totius quoque corporis arteriæ, potissimum tamen quę iuxta iugulum sunt, validè pulsant. In aliquibus quoque tantus est tremor cordis, ut etiam panni qui pectus ab iniuriis externis muniunt, videantur ab astantibus ad motum cordis per intervalla eleuari atque deprimi, subinde quoque sonitum audire solent astantes satis manifestum.

CAUSA. Frequentissimè fit à flatuosis, fumosis, malignis, crassis vaporibus atque spiritibus in pericardio magna ex parte, aliquando quoque in sinibus cordis conclusis, qui aut in corde generantur, aut aliunde importantur, nimirum ex hypochondriis, in hypochondriaca melancholia, matrice, ventre, aliisque corporis partibus malè dispositis; ex partibus enim prædictis facile multi feculenti, fuliginosi que vapores per arterias in cor subeunt. Sæpe quoque fit ab aquoso putridoque humore, urinæ simili, à quo malus odor quoque efflorescit, qui maiori copia pericardio concluditur quàm ut cor liberè se dilatare possit. Ab ira, Venere, crapula, cibis flatuosis, balneorum denique usu, laboribusque validis hoc malum sæpe irritatur, corporisque quiete remittitur; contingit equidem cor à prædictis irritari, tuncque nititur id quod noxium est, valida pulsatione expellere. Potest idem malum nasci ex tumore aliquo aquoso.

aquoso, sanguineo, vel carnosio in pericardio enato. In temperies quoque cordis calida vel frigida, huius mali causa est, vti subita quoque euacuatio, necnon imprægnatio idem incommodum adducere solet interdum.

PROGNOSTICA. Quamuis nonnulli ab hoc symptomate liberati sint per venæ sectionem, victumque extenuantem, ac medicamentorum ope; nihilominus permulti eorum qui post annum vel plures menses eodem malo rursus correpti fuerunt, ante senectutem morte præuenti sunt; verum alii quidem per acutas febres, alii verò cum sani degerent, syncope correpti, extincti sunt; periculum enim repentinæ mortis impendet, si diutius superfluëque affligat, crebròque repetat. Hoc malum familiare est syncope correptis, quam egri- tudinem & antecedere, & in quam etiam mutari solet. rursus etiam iis quibus lien tumidum est atro feculentòque sanguine, & qui hypochondriaca melancholia laborant, hoc etiam malo familiariter perturbari solent.



Methodus pro curatione

PALPITATIONIS CORDIS INSERVIENS.

Perficitur autem subsequèntibus remediorum generibus.

VICTVS RATIONE.

A Er ad caliditatem siccitatémque declinet, sitque suauiter olens.

Cibus. Carnes conueniunt pullorum, perdicum, caponum, gallinarum, vitulorum, quæ condiri poterunt siue elixentur, siue assentur, caryophyllis, pipere, cinnamomo, fœniculo, hyssopo, serpyllo. Inter olera conueniunt serpyllum, hyssopus, maiorana,

P iiij

borago, fœniculum, saturcia, melissa, pulegium.
 Potus. Vinum conuenit dilutum aqua, in qua borago
 aut melissa est cocta.
 Exercitium sit moderatum.
 Somnus quoque sit moderatus.
 Excrementa alui respondeant arte aut natura.
 Animo sit quieto; non conturbetur ira, aut mœstitia,
 gaudiôve immodico.

PRAEPARANTIBVS.

Syr. acetosus compositus, simplex, de duabus radicibus,
 de buglossa.

Syr. Byzantinus, glycyrrhizæ, de prasio.

Mel rosaceum.

Oxymel simplex, compositum, squilliticum.

Syr. de hyssopo, de quinque & duabus radicibus.

Aqua betonicæ, prasii, scabiosæ.

Decoctum anisi, fœniculi, galangæ, melissophylli, beto-
 nicæ, prasii, scabiosæ, fœniculi marini seu empetri, ca-
 ryophyllorum, macis.

Syr. de epithymo, de lupulis, pomis dulcibus.

Syr. de fumaria, succo boraginis.

Aqua buglossæ, scolopendriæ, boraginis, fumaricæ, melis-
 sæ, fœniculi.

Syr. violatus, acetosus simplex.

De cichoreo cum rhabarbaro.

De succo limonum.

De succo acetosæ.

Aqua lactucæ, violarum, buglossæ, rosarum, cicho-
 rei.

Prioribus vtemur, si fiat à materia crassa pituitosâque;
 sequentibus verò, si à materia fiat melancholica, quæ
 frequentissimè quidem hunc affectum adducere solet.
 Vltimo verò loco positis vtemur, cum materia calida
 huius mali causa fuerit.

VACVANTIBVS.

Agaricus trochiscatus.

Electuarium Indum, diaphoreticum.

Myro-

Myrobalani kebuli.

Pillulæ de agarico.

Diacatholicum, confectio hamech.

Diasena.

Pillulæ Indæ, de lapide lazuli, aureæ, aggregatiuæ, sine quibus esse nolo.

Hiera simplex.

Myrobalani Indi, sena, epithymus.

Syr. de multiplici infusione rosarum.

Myrobalani citrini.

Rhabarbarum.

Venæ sectio fiat in plethorico corpore ipsius basilicæ in dextro brachio, si periculum sit alicuius apostematis, aut si hæmorrhoidarum mensiumve subsistentium ratione fiat hoc malum, aut si ab aquosis multis humoribus fiat pericardio conclusis, breui enim temporis spatio finire malum solet. In sinistro verò brachio instituetur venæ sectio, si à melancholia fiat, aut si vapores melancholici in causa sint. Si verò id quod noxiam affert, ex inferioribus partibus illabatur, sectio fiet ipsius malleoli.

Posteriora conueniunt, dum à calidis humoribus ortum habet malum, priora verò dum à frigidis pituitosisque oritur: medio verò loco positus utemur, dum à melancholicis fit humoribus. Purgantibus autem hisce utemur medicamentis, si corpus fuerit cacochymicum, etiam statim à principio ante præparantium usum, si necessitas urgeat, & cum à malignis multisque fit humoribus aliunde transmissis, aut ibidem generatis; aut cum materia multa subito ad cor ruit. Hinc per interualla humores præparabimus, rursusque paulò fortioribus medicamentis euacuabimus.

AVERTENTIBVS *materiam, vaporesque*
à corde.

Venæ sectio ipsius malleoli.

Clysteres.

Cucurbitulæ.

Ligaturæ dolorificæ tempore accessionis solummodo.

Frictiones cum linteolis odoratis fient.

*ROBORANTIBVS, intemperiemque reli-
Etiam corrigentibus.*

Diambra, confectio de granis tinctoriis, diathod. abbat-
tis, aromaticum rosatum, theriaca cum aqua buglos-
sæ.

Conserua magna nostræ descriptionis mirificas hîc ha-
bet vires.

Mithridatum, confectio de ligno aloës, electuarium de
hyacintho, de gemnis, sp. lætificantis Galeni.

Diacinnamomum, diamulcum dulce, dianisum, diabu-
glossatum, diaboraginaturn, diamargaritum calidum,
plirisarcoticum.

Vinum Hippocraticum, succus buglossæ, cortices citri
conditi, seminaque, zedoaria, doronicum.

Mosculus, ambra, caryophylli, nux muscata, galanga,
amomum, cinnamomum, macis, mentha, rosmari-
nus.

Auri laminæ tenues frequentissimè incalescant, toties-
que extinguantur vino aliquo generoso.

Epithema ex aqua boraginis, melissæ, maiorana, sp.
diambræ, diamosci dulcis, ligno aloës, seminibus ci-
tri, mace, cinnamomo, caryophyllis, nucè muscata, vi-
no aromatico.

Diarhodum abbatis, diamargaritum frigidum, diatrion
sandali.

Syr. de succo granatorum, acetosæ, è persicorum flori-
bus.

Succus ribes, camphora, sandali, coriandrum præpara-
tum, succus granatorum, limonum, pomorum odo-
ratorum, cydoniorum.

Epithema è floribus nymphææ, rosarum.

Sacculus ex prædictis, quibus addere licebit moscum,
ambra, flores buglossi.

Pomum odoriferum fieri poterit ex dictis, addendo
ceram & labdanum. Vn-

Vnguentum ex oleo liliorum, amygdalorum dulcium, spice, croco, ligno aloës, mace, alypta moscata, cera. Melissa, buglossum, borago, corailū, margaritę, smaragdus, hyacinthus, aurum, cornu ceruinum, vnicornu, ebur, os de corde cerui.

Prioribus, si cordis intemperies frigida in causa sit; posterioribus verò, si calida eam excitarit, vtemur. Vtrique autem malo conueniunt melissa, carduus benedictus, buglossum, alięque quę vltimo ordine ponuntur.

**THEORICA ET EMPIRICA MEDICAMENTA nobilia in PALPITATIONE CORDIS
sepius cum summa salute plurimorum egrotorum à
Gualtero Bruel experta.**

CURATIO PALPITATIONIS CORDIS.

℞ radicum angelicę 3 iiij. β. buglossę 3 j. β. maioranę, melissę, hyssopi ana m. j. β. seminum anisi, feniculi ana 3 iiij. cardui benedicti 3 j. β. corticum aurantiorum, limonum ana 3 j. florum cardui benedicti m. β. senę Alexandrinę 3 j. rhabarbari 3 ij. β. myrobalanorum citrinorum, Indorum ana 3 ij. β. caryophyllorum 3 β. coquantur in iusculo carniū ad libram j. ℞. colaturę adde olei amygdalorum dulcium, liliorum ana 3 j. ℞. pulueris diasenę 3 j. fiat Clystere.

℞ syrupi pomorum dulcium 3 j. ℞. buglossę, de corticibus citri, oxymellis squillitici ana 3 j. aquarum boraginis, buglossę, cardui benedicti ana 3 iiij. fiat *Ulebus*: detur tribus vicibus in aurora.

℞ succi boraginis, pomorum odoriferorum, cydoniorum, acetosę, ē floribus persicorum, granatorum ana 3 ij. sacchari albissimi q. s. fiat arte *Syrupus*: detur 3 j. cum aquę cardui benedicti 3 iiij.

℞ radicum fœniculi, petroseliniana 3 j. zedoariæ 3 iiij. rorismarini, menthæ ana m. j. florum cordialium m. s. seminum cardui benedicti 3 j. anisi 3 β. agarici albi & levis 3 ij. zinziberis 3 j. β. polypodii quercini 3 vj. senę Alexandrinę 3 j. coquantur in aqua q. s. ad ℥ j. β. colaturę adde diaturbith cum rhabarbaro 3 vj. syrupi de succo acetosę 3 iiij. fiat *Potio*: sumat 3 iiij. in aurora.

℞ pillularum cochiarum, agarici trochiscati, pillularum de rhabarbaro ana 3 j. trochiscorum alhandal gr. iiij. syrupi granatorum q. s. fiant *Pillule* sex aut septem numero; dentur post primum somnum.

℞ radicum angelicę, galangę ana 3 ij. seminum anisi 3 j. β. cardui benedicti 3 j. rhabarbari electi 3 j. β. agarici albi & levis 3 ij. zinziberis 3 j. β. calentibus cineribus viginti quatuor horarum spatio macerentur in aqua cardui benedicti, fumaricę & buglossę q. s. hinc fortiter exprimantur, colaturę addantur syrupi de multiplici infusione rosarum 3 iiij. diacatholiconis 3 vij. fiat *Potio* pro duabus vicibus.

℞ confectiōis hamech, electuarii Indi maioris ana 3 iiij. β. corticum myrobalanorum chebulorum 3 j. β. syrupi de epithymo, byzantiis ana 3 β. aquarum cardui benedicti, boraginis ana 3 ij. fiat *Haustus*, detur sex horis ante prandium.

℞ mithridati electi 3 j. radicum angelicę, theriacę andromachi ana 3 j. radicum zedoarię 3 s. vini hypocratici 3 iiij. fiat *Haustus*; detur die sequenti in aurora ubi purgatus fuerit.

℞ radicum angelicę 3 j. caryophyllorum 3 j. cinnamomi 3 ij. s. in vino generoso infundantur per aliquot horas, colaturę addatur sacchari albissimi q. s. ad dulcorandum: detur haustus tempore prandii & coenę per aliquot dies.

℞ sp. aromatici rosati, diacinnamomi ana 3 s. sp. diamusci dulcis, diambre ana 3 ij. dianisi, sacchari albissimi dissoluti in aqua boraginis, buglossę ana q. s. fiat
Ele

Electuarium in tabulis.

℞ conferuæ buglossę, violarum ana ʒ β. sp. diamusci dulcis, theriacę veteris, electuarii de gemmis, diarthodonis abbatis ana ʒ j. β. dianisi ʒ j. cinnamomi ʒ j. sacchari rosacei ʒ j. syr. de corticibus citri q.s. ad *Electuarij* mollis consistentiam.

℞ vini odoriferi ʒ iiij. in eo dissoluantur musci gr. iiij. ambre ʒ β. huius portio aliqua naribus attrahatur. fiat *Nasale*.

℞ aquarum acetosę, maioranę, rosarum, boraginis, buglossę, melissę ana ʒ iiij. vini generosi ʒ iiij. sp. electuarii de gemmis, diamusci dulcis, diambre ana ʒ j. β. sandalorum ʒ j. ligni aloës, maceris, doronici, croci ana ʒ β. musci gr. ij. aceti guttas aliquot, fiat *Epithema*, quo tepente cor refocillabimus manẽ & vespere.

℞ florum melissophylli, rosarum rubrarum siccatarum, lauendulę, rorismarini, boraginis, buglossę, maioranę ana m. β. foliorum lauri numero iiij. sandalorum citrinorum, caryophyllorum, maceris, corticum citri, cinnamoni, ligni aloës, ossis de corde cerui, galliæ muscatę ana ʒ ij. ambre, moschi ana gr. j. fiat *Sacculus* e serico, in quo superiora insinuantur, habeátque figuram pyramidis; tempore vsus irrigetur aqua rosarum, buglossę, vino odorifero, cordique applicetur ad conseruandum eius vires.

℞ olei nardini, liliacei, balsami ana ʒ β. olei rosacei ʒ iiij. seminis acetosę, nucis muscatę, caryophyllorum, doronici, zedoarię, macis ana ʒ j. β. croci gr. iiij. cerę quantum satis; fiat *Vnguentum*, quo cor post epithematis vsum inungetur.

℞ olei liliorum alborum ʒ j. olei lateritii ʒ j. rad. angelicę ʒ j. aque vitę & cerę parum; fiat *Vnguentum*, quo spina dorsi inungetur calentibus manibus, secundum eius longitudinem.

APPENDIX

ad prædicta pro curatione PALPITATIONIS
CORDIS inferuiens.

Omniū primò vena incidatur, si vires aliàque prædictæ admittant, & si ab humoribus inuicem permistis, vaporibúsque fiat, id quod magna ex parte accidit. Demum si cacochymicum fuerit corpus, humores naturæ obediētes reddantur: hinc è corpore excludantur; interim caueat sibi diligenter à medicamentis fortiter purgantibus. Demum materiam peccantem ad partes ignobiles deducemus: id quod omnium commodissimè fiet clysteribus, necnon cucurbitulis: nonnihil quoque frictions ad ià adiumenti afferent. Postea roborabimus ipsum cor, intemperiemque emendabimus. Quæ omnia nunc anteaque dictis medicamentis felicissimo cum successu consequi poterimus: modò vniuersalia particularibus debita ratione adhibeantur. Si à vermibus hoc malum fiat, occidantur & expellantur, uti suo loco indicabitur. Si ab humiditate fiat in capsula cordis existente, non multum in quantitate peccante, utatur cibus bonum sanguinem generantibus, interim parcè. Si per consensum ventriculi fiat, ante cænam detur ʒ j. ss. hieræ picræ Galeni bis in septimana. Eodem modo si per consensum alterius membri fiat, curetur illarum partium affectus omnium primò: hinc quæcor corroborare possunt, propinentur.

Metho-



Methodus pro cognitione

SYNCOPE S I N S E R -
V I E N S .

SYNCOPE est præceps virium lapsus, malumque est mortis finitimum, cum sit solutionis initium ipsius naturæ. Solet autem Liporhymia præcedere Syncope. Significat autem Liporhymia animi quidem defectionem absque sudore tamen, frigescentibus tantum extremis corporis partibus una cum virium præcipiti lapsu; tuncque spiritus vel dissoluti, vel aliqua ratione vitiiati sunt, facultate vitali non omnino dissoluta existente. Præter animales autem facultates, contingit quoque cor & vitales facultates, quæ aliarum facultatum fundamentum existunt, in syncope semper oblaedi, etiam si primario non laboret cor, unde reliquæ etiam corporis vires seu facultates necessario offenduntur. Omnes equidem corporis partes peculiari cordis temperie actiones suas perficiunt; unde si huius vires infringantur, reliquarum etiam sequitur iactura atque detrimentum, actionumque priuatio.

PARS AFFECTA: est ipsum cor, id quod patet ex præcipiti omnium virium lapsu, ex imbecillitate paruitateque pulsus, ab extremorum frigiditate. Est autem symptoma pertinens ad actionem læsam omnium facultatum, omnium tamen primò vitalium. Contingit autem cor laborare aliquando per se, cum videlicet nullus alius affectus antecessit, nullumque signum præcessit alicuius alterius partis affectæ. Id autem accidit, aut propter magnam eius intemperiem, tunc autem subito non perit animal; aut propter vitiosum venenosumve aliquem humorem. Subinde quoque fit propter inflammationem tumoremve ab aliquo alio humore excitatum,

tuncque plerumque subitanea comitatur mors. Aliàs laborat per consensum alterius partis, & subinde quidem ob consensum quem habet cum ore ventriculi, diciturque tunc syncope stomatica, id quod patet ex propriis eius mali signis, & sic de reliquis partibus intelligendum erit.

SIGNA. Magna ex parte facies homini mortuo similis fit, ita faciei color mutatur ad pallorem, cineritiumque, propterea quod sanguis intrò ruat, extremæ corporis partes frigent, propter caloris exolutionem, sudoremque reddunt ingratum, propter solidarum partium dissolutionem. Anxietas suboritur atque animi perturbatio, tandemque animus deficit, ita ut corpus resolutum, sentiendi mouendique vi destituatur, in tantum, ut stans cadat, pedesque nec non brachia & manus plicabiles manent. Spectra noua malo inuadente visui offeruntur, impotentia sequitur ad loquendum, & pænè respirandi facultas intercipitur, palpebræ concidunt, pulsus fit rarus, obscurus, & quasi abolitus, nec non formicans.

CAUSÆ Syncopes sunt frequenter vigiliæ immodicæ, ira, tristitia, magna anxietas, timor grauis, dolor acerbus, febres acutæ, prolixæ. Immodicæ corporis inanitiones per famem, sudores, labores, vomitiones, ventris vacuationes, sanguinis profusionem, per aquæ in hydropæ vacuationem subitò factam. Immodicæ equidem hinc spirituum euacuationes atque resolutiones fiunt, unde non possunt non fieri cordis maximæ euerfiones. Frequenter quoque fit à copia crassorum, crudorum, putridorum, acrium, mordaciumque humorum, quorum postremis assidua mordicatione vellicant os stomachi, præcedentes verò vias spiritum ita obstruunt ut à motu intercipientur, haud secus atque fit in respiratione prohibita, sicque syncopen frequentissimè inducere solent. Nec mirum est spiritus posse intercipi, cum in respiratione id etiam fiat, cum tanta humorum copia in ductibus pulmonum concludatur aliquando,

ut

ut spiritu attrahere æger non possit. Aëris quoque ambientis malitia, necnon venenatus humor vel vapor ex aliqua corporis parte, vel intrinsecus cordi communicatus aut stomacho: item inflammatio & reliqua huiusmodi quæ immodicè alterare vel corrumpere possunt cordis, vel stomachi, vel spirituum intemperiem, syncopen quoque frequenter inducunt, cum virium robur consistat in earundem partium bona constitutione. Spiritus quoque soli prædicto modo læsi, affectionem suam principibus partibus, illisque consentientibus, communicant, earumque temperiem infringunt, sic syncope irruit periculosa, sæpe quidem mortalis, cui sudor concurrit magna ex parte. Atque hoc symptoma potiore quasi partium morientium inuoluit. Subito autem vires, quæ in spiritibus, non in temperamento partium solidarum quasi habitant, labuntur; aut propter spirituum defectum, aut eorundem alterationem, aut ob eorum corruptionem, aut propter partium solidarum temperamenti destructionem, quod morbi tam acuti quàm diuturni sæpe efficiunt.

PROGNOSTICA. Si syncope correpti caput in humeros aut thoracem delabatur, pulsus atque respiratio aboleatur, fac. esque fuerit viridis, nigra vel liuida, sumptoque medicamento sternutatorio conuenienti frustra, iam præsens adest exitium. Qui sæpe & subito exoluuntur sine causa manifesta, ne subito moriantur, periclitantur. Quando causæ syncopen accersentes non fuerint fortes, tremoræ sæpe, cum verò multum fortes fuerint, syncopen inducunt; si verò magis adhuc increcant, tandem morient immittunt. Syncope ex animi affectibus inducta, nequaquam mortalis est, si robur sit validum. Quemadmodum syncope ex cerebri intemperie orta, grauior erit quàm si ex iecore originem haberet, sic quoque si ex cordis intemperie fiat, deterior est quàm si ex cerebro id fieret intemperato, aut stomacho.

Q

PRAEPARANTIBVS.

- Syr. de corticibus citri, Byzantinus.
 Syr. de succo granatorum.
 * Syr. de pomis, oxymel simplex, compositum.
 Oxyfaccharum simplex.
 Syr. acetosus, violarum, limonum, de persicis, cydoniorum, rosarum, de succo endiuiae.
 De acetositate citri, de pomis.
 Aqua boraginis, violarum, rosarum, buglossae, acetosae.
 Posterioribus in calida, prioribus verò in frigida causa utemur.

VACVANTIBVS.

- Venæ sectio dum à plenitudine fit, praesentaneum admodum est remedium.
 Manna, agaricus.
 Cassia recenter extracta.
 Diaphœnicum.
 Rhabarbarum.
 Pillulae alephanginae.
 Tamarindi.
 Clystere leni.
 Vomitus cum aqua calida, syr. acetoso simplici, oleo communi, ubi à phlegmate viscoso aut putridis humoribus ventriculo conclusis oritur, aut suspicio veneni est, tuncque repetetur, digitisque aut penna adiuuabitur.
 Purgantia medicamenta hic conueniunt fortia, sic nec venæ sectio, cum etiam sine his saepe syncope incidat, nisi dolor acerbus à vitiosis humoribus excitatus, syncopen inducat.

AVERTENTIBVS.

- Venæ sectio.
 Frictiones fient tam in tempore paroxysmi quam extra, à summitate humerorum versus inferiora, cum

Q ij

lenteolis modicè asperis. Spina quoque dorsi similiter fricabitur.

Frictio linguæ, tempore paroxysmi cum mithridato, theriaca.

Ligaturæ dolorificæ fient crurum, necnon brachiorum, sic equidem spiritus ad externas partes reuocabuntur, qui ad cor iam se receperant.

Cucurbitulæ.

Iniectio fiet in faciem ab alto aquæ rosacæ, aut frigida, cui aceti non nihil permiscebitur, sic equidem spiritus euocantur, id tamen vitabitur, si à fluore fiat alui, aut à frigida causa.

Clamores atque vociferationes fiant altæ.

Sternutamentum cientia, & potissimum si à præfocatione fiat.

Oris, narium, digitorum atque manuum compressio fiet.

Frictionibus atque ligaturis non utemur, si ab immodica fiat euacuatione, periculum enim est ne ij qui reliqui sunt spiritus circa cor, si reuocentur, omnino dissoluantur, sed his potius quietem imperabimus, vini que generosioris pauxillum per interualla offeremus.

CORROBORANTIBVS alterantibusque spirituum intemperiem.

Diamuscum dulce, diambra, theriaca, mithridatum.

Electuarium de gemmis, aromaticum rosatum, diatrium pipereon.

Ol. cinnamomi arte chymica extracti.

Syr. de corticibus citri, vinum generosum.

Epithema pro corde ex caryophyllis, cinnamomo, croco, moscho, ligno aloës, ambra, cortice mali citri, aqua roris marini, aqua rosacea, melissæ, maioranæ, vino odorifero.

Vnguentum ex oleo camomelino, anethino, liliorum alborum, quo dorsi spina atque artus fricabuntur.

Odoramentum ex ligno aloës, corticibus mali citri, floribus citrangulorum, ambra, moscho, aceto, aqua rosacea,

rosacea, melissæ, maioranæ.

Sacculus ex caryophyllis, cinnamomo, ligno aloës, corticibus mali citri, croco, moscho, rosis siccis, floribus rorismarini, maiorana, melissa, serpyllo.

Emplastrum ex farina hordei, palmulis, mastiche, aloë, croco, vino.

Syr. de pomis, limonum.

Saccharum rosarum, violarum.

Diamargaritum frigidum, diatrion sandali.

Conserua buglossæ, oxysaccharum, diabuglossatum.

Potio ex decocto absinthij.

Epithema pro corde ex ligno aloës, sp. sandalorum, croco, osse de corde cerui, cortice mali citri, moscho, corallo rubro, aqua rosarum, acetosæ, boraginis, melissæ, vino generoso.

Sacculus ex ligno aloës, sandalis, ambra, croco, cortice citri, floribus rosarum, violarum, boraginis, nymphæ, melissophylli.

Odoramentum ex sandalis, corticibus mali citri, corallo rubro, aceto, moscho, aqua nymphæ, rosarum, myrtilorum.

Prioribus, dum à frigida; secundo verò ordine positis, dum à calida causa ortum habet syncope, locus erit.

Epithemata autem atque vnctiones sub sinistra papilla applicabuntur.



THEORICA ET EMPIRICA MEDICAMENTA nobilia in SYNCOPE, sæpius cum summa salute plurimorum egrotorum à Gualtero Bruele experta.

CURATIO SYNCOPE.

R^z radicum angelicæ, corticum mali citri ana 3vj.
foliorum melissæ, maioranæ, acetosæ ana m.j. florum

Q iij

cordialium p. j. agarici albi & leuis 3 iij. rhabarbari 3 ij. coquantur in aqua q. s. ad lb j. colaturæ adde diacatholiconis 3 vij. olei rosacei, liliorum ana 3 j. β. vini maluatici 3 iij. fiat *Enema*.

℞ syrupi de corticibus citri, mellis rosati colati, syrupi Byzantini ana 3 j. aquarum boraginis, melissæ ana 3 iij. vini odoriferi 3 iij. fiat *Tuleb*.

℞ radicum fœniculi, petroselini 3 j. radicum angelicæ 3 iij. foliorum melissæ, florum boraginis, buglossæ ana m. j. corticum mali citri 3 j. seminum anisi, glycyrrhizæ rasæ ana 3 v. agarici albi & leuis 3 ij. zinziberis 3 se. rhabarbari 3 j. nucis muscatæ, cinnamomi ana 3 ij. coquantur in aqua q. s. ad lb j. se. colaturæ addantur syrupi Byzanti 3 ij. de corticibus citri 3 j. diaphœniconis 3 vij. misceantur, fiat *Potio*.

℞ diaphœniconis 3 vj. cassiæ recenter extractæ 3 v. aquæ boraginis 3 iij. fiat *Haustus*.

℞ syrupi acetosi simplicis 3 j. sem. aquæ calidæ 3 vj. misceantur pro *Vomitório* medicamento: digito autem aut calamo incitabitur.

℞ diaphœniconis 3 se. agarici trochiscati 3 se. rhabarbari electi 3 j. decocti radicum angelicæ, maioranæ, melissæ, corticum citri, nucis muscatæ 3 iij. misceantur pro haustu.

℞ mithridati 3 j. theriacæ Andromachi 3 se. syrupi de corticibus citri 3 se. aquarum melissæ, cardui benedicti, angelicæ ana 3 iij. fiat *Haustus*, detur sequenti die manè postquam purgatus erit, in veneni suspitione multum etiam valet.

℞ cassiæ recenter extractæ 3 vj. rhabarbari electissimi, agarici trochiscati ana 3 ij. cinnamomi gr. xij. syrupi menthæ q. s. fiat *Bolus*.

℞ pillularum alephanginarum 3 ij. agarici trochiscati 3 j. rhabarbari electissimi 3 se. syrupi de succo acetosæ q. s. fiant *Pillule* septem aut octo numero.

℞ diambra, diamusci dulcis ana 3 ij. specierum lætificantis Galeni 3 j. aromatici rosati Gabrielis 3 iij. syrupi men-

pi menthæ q. s. fiat *Electuarium* ad formam opiati; sumat dragmam vnam cum vini odoriferi ℥ iij. sex horis ante prandium.

℞ specierum lætificantis Galeni, electuarii de gemmis ana ℥ j. ss. aromatici rosati, cinnamomi, nucis muscatæ ana ℥ j. corticis citri ℥ j. ss. caryophyllorum gr. xij. fiat *Pulvis*. Cum iusculis alimentisque conuenientibus sumat.

℞ corticum mali citri ℥ j. nucis muscatæ 3 j. ss. caryophyllorum, cinnamomi ana 3 j. infundantur viginti quatuor horarum spatio in vini maluatici lb j. colaturæ adde sacchari albissimi q. s. huius haustum tempore prandii & cœnæ bibat.

℞ specierum diamusci dulcis 3 ss. plurisarcotici ℥ j. electuarii de gemmis, caryophyllorum, corticum mali citri ana ℥ ss. sacchari albissimi in aqua menthæ dissoluti q. s. fiat *Electuarium* in tabulis; detur tabella vna aliquoties in die.

℞ corticum citri, cinnamomi, nucis muscatæ ana 3 j. mastiches, caryophyllorum ana 3 ss. mithridati optimi 3 j. ss. electuarii de gemmis ℥ ij. conferuæ buglossæ ℥ j. conferuæ anthos ℥ ss. syrupi de pomis dulcibus q. s. fiat *Electuarium* molle.

℞ caryophyllorum, cinnamomi ana ℥ ij. ossis de corde cerui 3 j. corticum mali citri, ligni aloës ana ℥ j. rosarum m. j. specierum electuarii lætificantis Galeni 3 j. moschi, croci ana gr. iij. vini odoriferi ℥ vj. aquæ melissæ, cardui benedicti, maioranæ, buglossæ, vini maluatici ana ℥ iiij. misceantur, fiat *Epithema* pro cordis regione.

℞ olei camomelini, liliorum alborum ana 3 iiij. electuarii de gemmis, corticum mali citri ana ℥ ss. aquæ cinnamomi 3 j. ss. ceræ parum; fiat *Unguentum* molle pro cordis regione.

℞ ligni aloës, cinnamomi, caryophyllorum, corticum mali citri ana 3 j. croci gr. xij. florum rosarum ℥ ij. roris-marini, melissæ, maioranæ ana 3 ss. fiat *Sacculus*, eo cor-

℞ iiij.

languidum recreabimus postquam inunctum erit prædicto vnguento, calens autem cordi applicetur, vinoque generoso calente irroretur.


℞ olei nucis muscatæ, mastichini, liliorum ana 3 iij. camomelini 3 ss. cinnamomi, caryophyllorum ana 3 ss. fiat Vnguentum, quo spina dorsi vngetur.

APPENDIX

ad prædicta pro curatione SYNCOPES
inferuiens.

*Dum ab humoribus obstruentibus vias spirituum fit, Omnium primò enemate aluius eluatur. Demum humores obstruentes spirituum vias, naturæ obediens reddantur, cum aliquantulum restauratæ fuerint vires. Leni deinde medicamento solutino è corpore educantur. Procul autem hîc ea medicamenta purgantia ablegentur, quæ spiritum vitalem aliquo modo resolvere possunt. Avertentibus demum medicamentis quoque locus erit. Cor autem interea temporis quoque roborabimus tam sumptis quam admotis medicamentis. Quæ omnia nunc anteaque dictis medicamentis felicissimò cum successu consequi poterimus, modò universaliter particularibus debita ratione adhibeantur. Si ab immodica sanguinis vacuatione fiat, lectulo quiescat, atque inspergatur violenter tempore paroxysmi in faciem ut excitetur, aqua rosacea, vel frigida communis, cui vini generosi aliquid addatur. Atque hoc in omni syncope fieri potest tempore paroxysmi, quia inde spiritus vitales excitantur, & ad exteriora reuocantur. Digi-
giti quoque tempore paroxysmi contorquendi sunt, ut dolores excitentur. Sternutamentum excitantia in eundem finem tunc quoque offerantur. Nares quoque & os constringatur ut anhelitus retineatur: exitum equidem non inueniens, ad interiora redit, sicque spiritus vitales commouet atque excitat. Ob morbum verò si accidat diuturnum, propterea quòd spiritus consumpti sunt, nutriatur optimis alimentis. Si syncope à venenosis vaporibus in corpore natis fiat, conserua magnæ nostræ descriptionis cum felicissimo successu propinabitur: mirabiliter enim auxiliatur morbis qui à malignis vaporibus in corpore natis ortum
sum*

suum aliqua ratione habent, ut est matricis suffocatio, epilepsia, vertigo, incubus, melancholicus affectus omnis, quem comitantur malæ cogitationes, tristitia atque timiditas sine causa manifesta, obliuio, saltus, tremor, aut insanie quædam species, qualis in spasticis; seu iis qui dæmonium quasi habere videntur; aliquando obseruamus. Mirificum quoque antidotum est contra febres omnes intermittentes atque erraticas, contra neruorum tensiones, vermium luxuriam. Seminaria enim horum morborum mirifice absorbit, spiritusque vitales, humidumque radicale, seu vitæ subiectum, summopere reficit atque præseruat, & propterea in præcauendis morbis summopere quoque commendatum est medicamentum. Si stomachus acerbis oppressus humoribus syncopen induxerit, unguentum pro eo fiat ex oleo rosarum, cydoniorum, myrtilorum. Si post purgatorium medicamentum, syncope irruat: R. theriacæ nouæ ℥ iij. aut si antiqua sit, addantur gr. ij. opij, vini generosi ℥ iij. detur unica vice. Odoramenta naribus nequaquam offerantur, si à præfocatione matricis syncope fiat: alioqui verò licebit.



Methodus pro cognitione

CHOLERÆ INSER- VIENS.

CHOLERA, est immodica ventriculi intestino-
rumque perturbatio, in qua supra infraque mali-
gnorum humorum fit eruptio. Usque adeo autem ve-
heimens frequenter est hoc nialum, ut vno atque altero
die ferè sine febre, vel saltem paucis diebus hominem
è medio tollat, per vomitum atque secessum effusa cor-
poris substantia; tanto enim impetu deiectio hic sæpe
fit, ut etiam spirituum multitudo vnà cum humoribus
expellatur, vnde sitis, cordis tremor, viriumque languor,

Tandem etiam sudor, necnon mors succedit; est enim acutissimus atrocissimusque affectus. estque huic malo inditum nomen ab ipsa materia, causaque efficiente.

PARS AFFECTA, ipse est ventriculus tam secundum superiorem eius partem quam inferiorem, ipse enim primario totus afficitur. Per consensum autem etiam laborant intestina, eò quòd per ipsa ventriculus se exonerare cogatur. Signa autem indicantia has partes esse affectas, est vomitus delectioque concurrens, intestinorum dolor, stomachique magna torsio, necnon distensio à flatibus facta. est autem symptoma perti-nens ad actionem læsam facultatis expultricis.

SIGNA. Vomitibus & delectionibus biliosa, acida, nidorosaque deiciuntur tam supernè quam infernè per plures etiam horas, haud secus atque si talia in maxima copia ebibisset, & primò quidem liquidiora minusque maligna, hinc crassiora coloratioraque redduntur; nam subinde citrino, hinc viridi, aliquando etiam nigro colore tincta profunduntur. In principio malum satis leue est, verùm tandem in ventriculo & intestinis superioribus sentitur dolor & angustia, necnon mordicatio, sitis quoque concurrit molesta, sudoribus quoque languido homine reddito, totum corpus perfunditur, pulsus fit frequens, celer ac ferè parvus, tandem etiam omninò ferè concidit. Malo incremente musculorum, maximè autem surarum, subinde etiam manuum & pedum fit contractio tensioque, estque maximè proprium huic morbo symptoma, magisque si malum increseat, tandem cum animi deliquio frigidisque sudoribus mors haud rarò irruit.

CAUSA huius mali plerumque est bilis, quæ subinde magna copia colligitur vel in toto corpore, aut in folliculo fellis, aliàs in iecore, nonnunquam in mesenterio, subinde etiam in intestinis aut alia aliqua totius parte, quæ tempore maligna venenosaque qualitate aliqua perfunditur, quæ in ventriculum si reiciatur à parte gravata, naturæ summè fit infensa atque molesta pro-

propter copiam malignamque qualitatem, erosionisque sensum fortem, quem orificio ventriculi infert; quare huc illucque variè impellitur, tandemque dicto modo excluditur. Idem malum etiam fit frequenter ex pravis corruptisque alimentis assumptis, humoribusve aliis vna cum bile in corpore putrefacti.

PROGNOSTICA. Morbus hic est acutissimus; immodicè enim vires in eo brevissimo etiam temporis spatio resolui contingit, eaque ratione citò succurrendum est. Senioribus autem maximè est formidabilis morbus: eo interim rariùs corripuntur. tunc autem summo in periculo res versatur, si continuo vomat, necnon sudet, si syncope comitetur, aut si quod euomit malè olet; quando enim foetentia vomit, vel stercus, pulsusque quasi deficit vna cum viribus, partiùmque extremarum si frigus concurrat, est mortale; benè autem est sperandum, si vomitum supprimi contingat, melius quoque si somnus admittatur. In urinae autem ardorem aliquando hoc malum transit; materia mali ad vesicam depressa.

XX

Methodus pro curatione

CHOLERICÆ PASSIONIS INSERVIENS.

Perficitur autem subsequentibus remediorum generibus.

VICTVS RATIONE.

A Er ad frigidum parum declinet, mediocriter quoque sit luminosus, exagitantur enim humores atque spiritus à calore atque lumine notabili.

Cibus. Oua sorbilia, carnes gallinarum, columbarum.

leporum, auicularum, perdicum, turturum, capreolorum conueniunt. parum autem alimenti admittat in principio mali, modò vires constent, imò à cibo omnino quasi tunc abstinebit.

Potus. Vinum generosum tenue, vt melius penetrer, offeratur; in eo autem extinguantur auri laminæ aliquoties, hoc quidem solo remedio frequenter hoc morbi genus mitescit, in principio tamen parcè bibat, in quem finem os colluat succo cydoniorum aut granatorum.

Quies corporis imperetur, interim vt vomat placidissimè iuuandus est æger si nausea molestetur, parumque aut nihil vomat.

Somnus omni ratione conciliandus est, nocturno potissimum tempore.

Animi pathemata cuitentur, mœstitia nimirum, sollicitudo, ira.

VACVANTIBVS.

Clystere ex aqua hordei, oleo communi, violarum, saccharo rubro, vitello oui, quo educto bibat aquæ calidæ vel hordei bonam quantitatem; suntque hæc sæpius reiteranda, vt materia mordens atque acris non-nihil temperetur.

Vomitum cum aqua hordei calente & oxymelite simplici, vel syr. de succo acetosæ, aut decocto raphani & aqua saccharata instituat, quibus cumini atque nitri nonnihil incoquemus, magna autem huius copia bibetur, sic enim retentrix facultas nimio onere grauata, expultricem mouet. digito quoque in os immisso, aut penna oleo intincta iuuari, vt melius vomat, poterit; dabitur autem in magna quantitate & frequenter, idque statim in principio antequàm alia offerantur remedia. In causa frigida addetur cinnamomum, in calida saccharum.

Syr. rosarum laxatiuus, pillulæ de hiera picra, pillulæ aromaticæ in causa frigida.

Cassia fistula, aloë, manna, rhabarbarum, myrobalanorum decoctum. Clysteriis,

Clysteriis, aut aliis utemur purgantibus medicamentis, dum ad inferna materiam peccantem deturbare nos posse existimamus; sic enim naturam blandè iuuabimus. Vomitus autem nonnihil promouebimus in principio mali; dum nauseabundus est æger, neque liberè tamen vomit; cumque id quod corruptum atque noxium est natura vomitu expellere laborat, quam hoc quoque ingenio blandè iuuabimus. Vitentur autem omninò fortia vomitiua & solutiua, ne stomachus nimium relaxetur, iis autem minus erit opus si humores per se ad fluendum satis sint parati; quare tunc quàm ocyssimè fieri poterit, vomitus componemus, materiamque corruptam atque exitiosam per infernas corporis partes educere conabimur.

PRÆPARANTIBVS.

Ligaturæ dolorificæ coxarum, cubitorum; earumdemque partium.

Frictiones primò validæ, hinc mediocres.

Cucurbitulæ magnæ dorso, spatulis, regionique mediæ inter umbilicum & stomachum affixæ plurimùm iuant; nonnunquam etiam splenis iecorisque regioni applicari poterunt, non diu autem permaneant, sed sæpius permulentur, ne dolorem nimium excitent.

Sudoris prouocatio fiat; plurimùm enim conferre poterit, modò vires satis consent.

Balneum quoque aquæ calidæ si vires ferant, cum coctio peracta erit, conuenit, eo autem non diu detineatur, ne vires prosteruantur.

Materia non admodum maligna existente, hisce remediis utemur, & potissimùm si secessibus nimium frequentibus sagitetur.

SISTENTIBVS humorum fluxum, roborantibusque stomachum & intestina.

Syr. de rosis siccis, de succo granatorum, limonum, cydoniorum, de acida citri parte.

Aqua mensalis nostræ descriptionis.

Rosata nouella, diacodium, trochisci de olibano.

Cortices citri conditi. Caro cydoniorum sine speciebus, conserua rosarum.

Succus malorum agrestium, trifolii, tam sumptus quàm admotus. Dum stomacho applicantur, linteolo excipiantur duplici.

Cyathus aquæ frigidæ, modicè interim bibar.

Vinum rubellum astringens generosum, cui aqua chalybeata permisceatur.

Clystere ex decocto capitum papaueris addito amylo, humorum motum sistit, somnūque accersit, vnde plurimū iuuantur in hoc similibus malis ægri.

Aquæ frigidæ in faciem subita injectio vomitum sistere potest, si fiat eo tempore quo videmus hominem vt vomat inclinari.

Fotus astringentes fiant, celeriter enim agunt.

Vnguentum ex oleo violarum, myrtino, rosaceo, cydoniorum, absinthii, menthæ, mastichino, nardino, balauistiis, hypocistide, malicorio, rosis rubris, bolo Armeno, sanguine draconis, thure, myrtulis, sandalidis, dactylis, mastiche, acacia, corallo, rhoë obsoniorum.

Cataplasma ex dictorum materia.

Dropax ex pice, ol. cydoniorum eximiè vomitum sistit.

Ceratum stomachicum Galeni, modò frigida sit causa.

Emplastrum diaphænicum, de mica panis, pro stomacho Mesuæ, mastichinum.

Ista ductus & vias communes constringunt, humoresque currentes incrassant, stomachūq; & intestina roborant, ne humores eò ruentes ita faciliè recipiant. Hisce interim non vtemur antequam vitiosi humores aut vomitu aut secessu bona ex parte sint expulsi, nisi periculum syncopis aut conuulsionis impendere videamus; quantumuis enim hæc excretio utilis sit, tamen modum si excesserit; periculo haud vacat, eò quod ex immodica virium prostratione sæpe mors sequitur. Localia autem me-

me-

medicamenta hîc citius operantur cùm sumpta ferè reiciantur à ventriculo iam immodicè perturbato. Vbi verò modicè se remittit malum, plus proderunt sumpta quàm admota, eò quòd tunc citius agunt assumpta. Omnium autem primò vomitum sistemus. Aluus autem vt moderatè fluat operam dabimus, donec humores malignos mediocriter expulsos esse intellexerimus.

CORRIGENTIBVS *accidentia.*

Vinum rubellum austeriusculum, odoriferumque.

Vinum quoque generosum aqua frigida dilutum, generosum est remedium.

Miua cydoniorum.

Emplastrum ex rosis, sandalis, cydoniis, acetoque pro stomacho.

Unguentum ex oleo liliorum, amygdalorum, irino, violarum, axungia humana, castoreo.

Fomentatio partium contractarum fiet cum iisdem oleis; vel,

Linimenta oleis calidis constantia, partibus contractis circumponantur.

Balneum ex iisdem etiam oleis pro parte spasmata, maximi est iuuamenti.

Decoctum seminis lactuæ, cucurbitæ, intubi, cucumeris.

Aqua communis cocta, cui addatur syr. cydoniorum, de rosis siccis, de acetosa citri parte.

Syrupus granatorum, cydoniorum, eorundemque succi, syr. rosarum.

Clystere ex aqua in qua decocta sint semina intubi, lactuæ, papaueris albi capita, amyllum.

Singulum priora corrigunt; spasnum verò ex inani-
tione sequentia; sitim sedant somnumque prouocant
ultimo loco posita.

**THEORICA ET EMPIRICA MEDICAMENTA nobilia in CHOLERICA PASSIONE
sepius cū summa salute plurimorum agrotorum à
Gualtero Bruel experta.**

CVRATIO CHOLERÆ.

℞ hordei mundi m. ij. β. foliorum violarum, centau-
rei minoris, absinthii, menthæ, florum camomillæ, meli-
lotiana m. j. agarici albi & levis 3 ij. rhabarbari electis-
simi 3 j. β. polypodii quercini 3 iiij. coquantur in aqua q.
s. ad lb j. colaturæ adde olei rutacei, camomelini ana 3
j. β. vini generosi 3 iiij. diacatholic. 3. iiij. fiat *Clystere*.

℞ syr. acetosi simplicis 3 ij. decoctionis hordei, ra-
phani, ficuum pinguium 3 vj. fiat *Vomitorium* medica-
mentum, sumat tepidum. Si verò laboriosè admodum
vomat, purgante medicamento sequenti naturam iu-
uabimus.

℞ rhabarbari electissimi 3 j. syrupi menthæ 3 j. gr.
iiij. spicæ, aquæ menthæ 3 iiij. fiat *Haustus*.

℞ electuarii de succo rosarum, rhabarbari electissimi
ana 3 j. β. spicæ gr. iiij. syr. de cichoreo cum rhabarbaro
3 β. aquarum absinthii 3 iiij. fiat *Haustus* cholæræ solu-
tius, dabimusque si ad inferiora materiam aliquo mo-
do reperere intelligamus, sic enim plenius ad inferiora
conuertetur. Optimè verò clysteribus frequenter repe-
ritis ad inferiora ducemus materiam.

℞ foliorum violarum m. j. rosarum m. β. seminum por-
tulacæ, plantaginis ana 3 j. malicorii, seminum berbero-
rum ana 3 ij. β. myrobalanorum citrinorum 3 j. cinna-
momi electi 3 j. β. coquantur in aqua q. s. ad lb j. vncijs
quatuor colaturæ adde rhabarbari electi 3 β. syr. rosarum
3 ss. fiat *Potio*.

℞ syr. cydoniorum, rosarum ana 3 j. ss. myrtillorum
3 j. cinnamomi, nucis mulcæ ana 3 ss. dentur duo
cochlea-

cochlearia sæpe in die absque aquis, cum ventriculus nimia humiditate relaxetur.

℞ syr. de agresta, menthæ ana ʒ j. sem. succi granatorum ʒ j. sumat ʒ j. cum tribus vnciis aquæ cinnamomi aliquoties in die.

℞ sacchari rosati, confervæ rosarum antiquarum ana ʒ j. se. carnis cydoniorum ʒ j. corallorum rubrorum ʒ ij. se. corticum citri conditorum ʒ se. cornu cerui vsti, boli Armeni ana ʒ j. se. syr. de acida citri parte, syr. in quo myrobalani citrini conseruati fuerint q. s. ad *Electuarij* mollis consistentiam, fiat *Mixtura*, vbi materiam mediocriter vacuatam esse conicere licebit, caueremur.

℞ foliorum absinthij, menthæ siccæ ana m. j. rosarum rubrarum. camomillæ ana m. ij. se. malicorij, balaustiorum ana ʒ ij. seminum myrrilorum ʒ j. sandalorum rubrorum ʒ j. coquantur in sufficienti quantitate vini nigristiptici ad tertiæ partis consumptionem, fiat *Fomentatio* pro stomacho.

℞ olei myrrilorum, cydoniorum, rosarum ana ʒ se. absinthij, menthæ, ana ʒ ij. se. seminum antheræ, boli Armeni, thuris ana ʒ j. misceantur, fiat *Vnguentum*, quo ventriculus calidè inungatur manè & vespere extrinsecus, roborat vires stomachi: astrictione sua nobili.

℞ cerati stomatici Mesuæ ʒ j. se. mastichis, thuris ana ʒ j. coralli rubri, galangæ, sandalorum alborum, rosarum rubrarum ana ʒ j. balaustiorum, menthæ siccæ, absinthij ana ʒ se. olei nardini, mastichini, rosacei ana q. s. fiat *Scutum* stomaticum.

℞ absinthij, menthæ, spicæ nardi ana ʒ se. rosarum rubrarum, camomillæ ana ʒ i. thuris ʒ i. se. boli Armeni ʒ se. fiat *Pulvis*, qui stomacho inspergetur postquam dicto vnguento inunctus erit.

℞ menthæ, trifolij, absinthij ana m. i. se. rosarum rubrarum m. ii. cinnamomi, macis, ana ʒ sem. trochisc. de olibano ʒ i. panis rosti macerati que in vino generoso adstringente & aceti nonnihil ʒ ii. fiat *Emplastrum*:

R

aut, mastix dissoluatur cum albumine oui, hinc cum mica panis tosta, in vinóque generoso & aceti nonnihil macerata, fiat ad modum emplastri.

APPENDIX

ad prædicta pro curatione CHOLERICAE PASSIONIS inferuiens.

In principio huius mali dum ad infernas corporis partes materia peccans moueri aliqua ratione videtur, virésque nimium labi, naturam iuuabimus deiectorio aliquo medicamento conuenienti, cui addemus ea quæ acrimoniam humorum remittere possunt, ut est cassia fistula, manna, rhabarbarum, aliudve simile conueniens medicamentum: alioqui tantum abest ut vomitum sistere debeamus, sed potius si non ita liberè vomat æger, iuuandus est cum magna quantitate iusculi carniū pulloꝝ, aut aqua hordei, aut etiam aqua tepida in qua coquantur anisi, necnon cumini semina, addendo syr. acetosi simplicis portionem. Vomitorio autem præscripto medicamento nequaquam olea addemus, eò quòd vires intestinorum atque ventriculi relaxent. Ab iis interim omnino abstinere debemus, quæ vomitum intendere possunt; nequaquam enim simul per superiora & inferiora euocabimus materiam cum impetu: quare si vomitu immodico æger perturbetur, clysterio auertemus materiam. Cum autem materia mali magna ex parte vacuata erit, quod magna ex parte fit 24. horarum spatium, tunc iis quæ auertere possunt humorum motum ad stomachum utemur, & quidem clysterio materiam ad inferiora reuocabimus, quibus ea quoque addemus quæ humorum acrimoniam remittere possunt, sepiusque repetemus. Ligaturis quoque necnon frictionibus dolorificis, aliisque antea dictis instrumentis eorundem humorum impetum ad stomachum auertemus. Demum adstringentibus sistere humorum fluxum, stomachūque & intestina corroborare debemus. Postea cum in hoc malo symptomata concurrant grauiā, quæ etiam medicum perterrere solent, illis prouidendum erit. Quæ omnia nunc anteaque dictis medicamentis felicissimo cum successu consequi poterimus, modò vniuersalia particularibus debita ratione applicen-

plicentur. Celerrime autem hoc malum iuuandum erit, cum subito maximam virium prostrationem syncopénque periculosam accersat.



Methodus pro cognitione

SINGULTVS INSE-
VIENS.

SINGULTVS, est motus quidam vehemens ac violentus ipsius vètriculi, quo ea quæ illius tunicis infident, & in ipsius corpore quiescunt, pertinaciùsque impacta hærent, expellere conatur. Non autem ea quæ in concavitate stomachi continentur hoc motu quasi conuulsuo excludere laborat natura; vomitu equidem ista potius explodentur à ventriculo. Quamuis autem eiusdem sit generis cum vomitu, tamen mouetur in singultu ventriculus validius quàm in vomitu, eo quòd difficiliùs expellantur quæ in corpore ipsius ventriculi latent, quàm quæ in concavitate stomachi oberrant. Humores tunicis ventriculi infarcti ipsius corpus molescentes sua caliditate vel frigiditate, vel mordacitate nauseam potius excitant quàm singultum, quamdiu morsum non inferunt valdè molestum. Singultus autem potius excitatur quàm nausea, cum validam mordacitatem humores inferunt.

PARS AFFECTA. Subinde os ventriculi, aliquando etiam totus ventriculus afficitur. Est autem symptoma pertinens ad actionem læsam facultatis expultricis, necnon retentricis. Fit autem aliquando proprio ventriculi vitio, aliàs fit per consensum iecoris, in eius nimirum inflammatione. In febribus ardentibus totius fit corporis vitio.

R ij

SIGNA. Frequenter idque per intervalla repetit, ut noxium explodat humorem quemadmodum tussis, idque cum sonitu, propter angustiam exitus aëris, qui in ventriculo continetur magna ex parte.

CAUSAE. Frequenter fit à repletionem & superflua humiditate; sic enim aut grauat nervos, aut quasi contrahit eos replendo: id autem patebit ex signis ipsius plenitudinis; aliàs fit ab humoribus acerbis; mordacibus, malignisque, qui quasi pungunt qualitate sua maligna. id ex victus ratione præcedente cognoscitur, tuncque si vomitus concurrat, liberantur. Fit etiam ex nimia perfrictione oris ventriculi; cum enim nervosum sit corpus, ex frigiditate ita condensatur, ut facile conferuentur quæ insinuant se in illius substantiam, sicque repletio fit, unde singultus. Perniciosi quoque vapores ad os ventriculi derivati sæpe graui singultu hominem molestant, uti pestiferæ, ardentisque testantur febres. Item iecoris necnon ventriculi, alteriusve visceris inflammationes magnæ hoc malum produciunt. fit quoque ex corruptione alimenti in ventre partibusque vicinis, cum mordacem qualitatem afficit. Aliàs fit à pituita viscida tunicis ventriculi impacta. Subinde quoque fit ex inanitione nimia, seu siccitate, ut fit in magnis ardoribus, febribusque diu durantibus, corporisque substantiam immodicè consummentibus: fit quoque ob immodicam vacuationem per aluum. Idem fit etiam malum ex nimia sanguinis euacuatione; quod sæpe fit in mensium fluore nimio, item in dysenteria magna, in vulnere magno, in vomitu immodico, longa inedia. Ea ergo quæ præcesserunt, nobis facile indicabunt, num ob inanitionem singultus prouenerit, nec ne.

PROGNOSTICA. Singultui sternutatio si superuenit, liberabitur, si à plenitudine fiat. Singultus in iliaca passione proueniens, malus. Singultum animi delicatio, aut nervorum distentionibus, aut delirio superuenisse, mortiferum est. Inflammationi hepatis, uteri, cerebri, vulncrique notabili singultus superueniens, pe-

periculo haud vacat quoque, vt plurimum enim mortem minatur. In acutis item morbis, febribusque ardentibus ac pestilentialibus, singultus superueniens ferè lethalis esse solet. Singultus quoque ex inanitione nimia si fiat, semper malum est. Malum quoque est si à vomitu singultus irruat, periculum enim inflammationis stomachi vel cerebri minatur. Delirium quoque aut distentio neruorum, singultui si superueniat, mortale quoque est.

XX

Methodus pro curatione

SINGULTVS INSE-
VIENS.

Perficitur autem subsequētibz remēdiorum generibz.

VICTVS RATIONE.

Aer temperatus maximè conuenit; & si à frigidis fiat humoribus, id quod frequentissimè quidem accidit, ad caliditatem atque siccitatem declinet nonnihil.

Cibus. Alimenta quæ calefacere atque exiccare possunt, præscribantur; eaque ratione condiri poterunt caryophyllis, zinzibere, cinnamomo, nuce muscata, pipere, galanga.

Potus. Conuenit vinum generosum; parua tamen eius quantitas admittatur.

PRAEPARANTIBVS.

Syr. de duabus radicibus, de storachade, oxysaccharum simplex.

Oxymel simplex, squilliticum, mel rosatum, melicratum cum hyssopo fiat acetum squilliticum.

R iij

Decoctum radicum asari, galangæ, enulæ campanæ, marrubij, hyssopi, calaminthæ, apij, pulegij, seminibus cumini.

Syr. de Epithymo, de thymo.

Syr. de pomis, de fumaria.

Aqua fumarix, lupulorum, scolopendrix.

Syr. violatus, rosatus, acetosus simplex, de succo endiuix.

Aqua hordei, violarum, cardui benedicti, endiuix, aqua calida.

Si morbus diu perseveret, præsentibus concoquenda materia, antequam vomitu aliòve medicamento purgante educatur. Prioribus autem utemur commodè si à pituitosis viscidisque fiat humoribus, sequentibus verò, si à melancholicis, posterioribus autem, dum ab acris fit humoribus, altius tunicis ventriculi conclusis.

VACVANTIBVS.

Vomitus cum aqua tepida decoctionis hordei. Sit autem magna eius quantitas, cui syrupus endiuix, oxymel simplex aut squilliticum permiscebitur; præstans est hoc remedium, modò ad superiora humores moueantur; alioqui clysteribus lenientibus, aut purgantibus medicamentis per os sumptis, utemur; aliquamdiu autem postquam ebiberit, medicamentum retineat; melius equidem sic educetur materia, quam si statim vomitus excitaretur.

Diaphœnicum, diacydonites solutium.

Hiera picra, syr. de multiplici infusione rosarum.

Pillulæ aromaticæ, stomaticæ, coccix, quibus in frigida materia castorei aliquid addemus.

Rhabarbarum infusum, manna, cassia.

Hiscæ locus erit cum malum ab humoribus mordacibus viscosive oritur, nullo autem modo, si ab inanitione malum fiat, admittantur; tunc enim, quamuis ferè insanabile sit malum, alimenta boni nutrimenti potius imperanda erunt.

▲ V E R -

AVERTENTIBVS.

Clysteres conueniunt in omnibus ferè causis.

Ligaturæ, frictionesque extremarum partium dolorificæ fiant, digiti que dexteri mediique compressio ad latera vtriusque fiat.

Cucurbitulæ dorso iuxta duodecimam vertebram, scapulis, umbilico, postea ori ventriculi cum plurima flamma apponantur, maximo enim hoc fit cum iuuamento magna ex parte dū à flatibus fit malum.

Sternutatio conuenientes excitetur: per concussionem enim tunc capitis, necnon ventris, totiusque corporis, materia conclusa sæpe excutitur.

Timor subitaneus fiat aqua gelida in faciem iniecta, præter expectationem.

Spiritus retentio potissimum dum à flatibus malum oritur, aut stomachi intemperie frigida.

Rubificantia si malum non cesserit, cucurbitularum etiam appositione.

Frictiones aut motiones in auribus fiant digito auriculari.

Balneo extremæ corporis partes sæpe perluende calido.

CONFORTANTIBVS, *intemperiemque
relictam emendantibus.*

Diagalanga, electuarius de baccis lauri, diacuminum, dianisum, diacalamintus.

Theriaca, mithridatum, zinziber conditum cum vino generoso oblatum, aqua vitæ in qua cinnamomum infusum sit.

Vinum generosum, in quo decocta sint semina cumini, lauri, iuniperi, dauci, anethi, radices galangæ.

Castoreum, cuminum, anethi decoctum.

Retentio anhelitus.

Cucurbitula ori ipsius ventriculi applicetur, mirum in modum malum remittit.

Fomentatio ex decocto seminum anethi, anisi, cumini, fœniculi, ameos, baccarum lauri, galangæ, menthæ, abrotani, origani, in vino atque aqua fiat.

R iiii

Diatrion pipercon, theriaca, diagalanga, aromaticum caryophyllarum, diarhodon abbatis, syr. menthæ, absinthii.

Aqua mensalis nostræ descriptionis.

Vinum absinthites, vinum generosum in quo coctum sit cinnamomum, nux muscata, mastix, galanga, asarum, zinziber, zedoaria, lignum aloës, corali rubri.

Castoreum, zinziber conditum, acorus conditus, caryophylli commanducantur.

Spiritus retentio natium calorem adiuuat.

Odoramentum ex semine anethi, in vino odorifero cocti.

Fomentum ex galanga, cumino, absinthio, schœnantho, mentha, origano, calamo aromatico.

Vnguentum ex oleo mastichino, amygdalorum dulcium, liliorum, violarum, maceris, castorei.

Vnguentum ex oleo in quo absinthium, cuminum, ruta, anisum decoctum sit; ventriculo, lana excepta, apponetur.

Ceratum ex castoreo & oleo veteri.

Diarhodon abbatis, diatrion sandali, saccharum violatum, rosatum.

Syr. violaceus, rosaceus, endiuixæ.

Ceratum sandalinum cum oleo rosaceo malaxetur, oleum rosaceum.

Fomentatio stomachi & dorsi partiumque circumstantium, ex oleo violarum fiat.

Vnguentum ex oleo amygdalorum dulcium, violaceo, pro partibus iam dictis.

Primo loco posita proderunt, dum à flatibus malum ipsum (quod sit magna quidem ex parte) dependet. Secundo verò loco positis vtemur, si à frigidis humoribus, aut intemperie frigida ortū habet; vti si à contraria fiat intemperie, aut humoribus contrariis; tertio loco posita maximè proderunt. Dum autem ab inanitione malum dependet, ultimo loco posita præscribenda erunt.

OB.

OBTUNDENTIBVS vim sentiendi ipsius oris ventriculi, si ab acribus humoribus immodicè irritetur.

Phylonium Romanum cum succo intubi; quo tamen non utemur, nisi prius leuiora tentauerimus remedia frustra.

Pillulæ de cynoglossa, dosi 3 j. theriaca recens.

Syr. nymphææ, violarum, de papauere, dosi cochlearia duo cum aqua violarum.

Saccharum nymphææ, violarum, rosaceum.

Lac asininum vel bubulum optimè mordacitatem humorum remittit.

Semina lactucæ, portulacæ, cucumeris, papaueris albi cum aqua lactucæ contusa, coquantur.

Aqua frigida in magna quantitate detur; cautela bona id interim fiat.

Leuioribus primò utemur, hinc ad fortiora transibimus.

THEORICA ET EMPIRICA MEDICAMENTA nobilia in SINGVLTV sapius cum summa salute plurimorum egrotorum à Gualtero Bruel experta.

CURATIO SINGVLTVS, à materia frigida & flatibus.

℞ radicum asari ʒ ss. galangæ ʒ iiij. florum camomillæ, meliloti ana m. ij. maluarum ij. ss. betæ m. j. ss. carycarum pinguium numero vj. garici albi & leuis ʒ ss. feminum anethi ʒ v. coquantur in aqua q. s. ad lb. j. ss. colaturæ adde hieræ picræ Galeni ʒ ij. diacatholiconis ʒ j. mellis rosati ʒ ij. fiat Clystere.

℞ oxymellis squillitici, oxymellis simplicis ana ʒ j. mellis rosati colati ʒ j. ss. aquarum menthæ, absinthii ana ʒ v. misceantur, fiat Iuleb.

℞ radicū asari 3 ij. aristolochiæ rotundæ, galangæ, enulæ campanæ ana 3 ij. ꝑ. calaminthæ, thymi, pulegii, hyssopi, marribii ana m. ꝑ. anethi, squillæ ana 3 ꝑ. cinnamomi 3 ij. coquantur in vino odorifero q. s. ad ℥ j. colaturæ addatur oxymellis simplicis, squillitici ana 3 j. ꝑ. fiat *Potio*.

℞ pillularum stomaticarum, hieræ picre Galeni, trochiscorum de agarico ana 3 j. syrupi de hyssopo q. s. fiant *Pillulæ*; viij. numero dentur in aurora.

℞ diagalange 3 j. ellebori nigri 3 iiij. nucis muscatæ, cinnamomi ana 3 ꝑ. fiat infusio per duodecim horas in vini maluatici 3 v. fiat *Haustus* in contumaciori malo.

℞ radicū galangæ, zedoariæ ana 3 ij. ꝑ. seminum anethi 3 ij. nucis muscatæ 3 j. ꝑ. mithridati 3 iiij. misceantur; detur 3 j. in vino generoso.

℞ castorii 3 ꝑ. cinnamomi, radicū enulæ campanæ, radicū angelicæ, galangæ ana 3 ꝑ. vini hypocratici 3 iiij. fiat *Haustus*.

℞ cinnamomi optimi 3 iiij. zinziberis 3 j. radicū galangæ 3 v. seminum anisi, anethi ana 3 ij. radicū enulæ campanæ, angelicæ, zedoariæ ana 3 j. quiescant in vino odorifero crassiusculè contusa, sæpiusque per saccum hypocraticum transcolentur, colaturæ adde sacchari albiissimi q. s. & açeri squillitici portionem, fiat *Potus Hypocraticus*.

℞ pillularum de cynoglossa 3 ij. ꝑ. phylonii Romani 3 j. fiant *Pillulæ* octo aut nouem; detur vna sub noctem; plurimum enim iuuant.

℞ foliorum menthæ, absinthii, rutæ ana m. j. seminum cumini 3 ꝑ. bulliant nonnihil in olei communis quantitate sufficienti, fiat *Fomentatio* stomachi cum spongia, aut lana liquore eo imbuta.

℞ olei de castoreo, olei amygdalorum dulcium, mæceris, mastichini ana 3 j. ꝑ. in iis coquantur nonnihil semina anethi, radicū galangæ ana 3 j. ꝑ. fiat *Unguentum* pro stomacho.

℞ aristolochiæ longæ, galangæ, seminum anisi, bacca-
rum

rum lauri, gentianę, rutę ana 3 iiij. castorii, myrrhę, caryo-
phyllorum ana 3 ij. rosarum rubrarum m. j. mastiches 3
iiij. fiat *Emplastrum* cum melle, & aqua sampsuchi, absque
febre si malum affligat, admodum sepe iuuat.

A materia autem calida si singultum originem habe-
re certò intelligamus, tunc R^z syrupi de succo acetosę,
oxysacchari simplicis, syrupi rosati ana 3 j. β. aquarum
endiuię, acetosę, portulacę ana 3 iiij. fiat *Iuleb.* aut,

R^z syrupi violarum, de cichoreo cum rhabarbaro, ace-
tosi simplicis ana 3 j. syrupi nymphę, papaueris ana 3
β. aquarum cichorei, lactucę, portulacę ana 3 iiij. fiat
Iuleb.

R^z decocti cichorei, endiuię, buglossę, hordei, semi-
num cardui benedicti 3 iiij. in iis infundantur duode-
cim horarum spatio rhabarbari 3 ij. colaturę addatur
syrupi de multiplici infusione rosarum 3 j. β. fiat *Hau-*
stus.

R^z hordei mundi m. iiij. coquantur in aqua q. s. ad di-
midium, vnciis sex colaturę adde syrupi acetosi simpli-
cis 3 ij. fiat *Vomitorium* medicamentum.

R^z hierę picrę Galeni, rhabarbari optimi ana 3 ij. sy-
rupi de cichoreo cum rhabarbaro q. s. fiant *Pillulę.*

R^z diarhodonis abbatis sine moscho 3 β. sacchari vio-
lati, nymphę ana 3 v. syrupi rosacei, violarum ana q. s.
ad electuarii mollis consistentiam.

R^z butyri recentis modicè saliti 3 ij. decocti seminum
atriplicis, hordei, amygdalorum 3 iiij. oxymellis simpli-
cis 3 ij. fiat *Haustus*: plurimum auxilii affert si à remor-
dente aut acri singultus fiat.

R^z olei rosacei, nymphę ana 3 v. papauerini, cydo-
niorum ana 3 β. cerę & aceti parum, fiat *Vnguentum.*

R^z cerati sandalini 3 j. β. rosarum rubrarum, seminum
portulacę ana 3 β. olei rosacei q. s. fiat *Scutum stomaticum.*

R^z phylonii Romani, pillularum de cynoglossa ana
3 j. detur pillula sub noctem.

APPENDIX

ad prædicta pro curatione SINGVLTVS
inferuiens.

Primò materiam peccantem, siue frigida, siue calida fuerit, naturæ obediẽtem reddemus. Demùm conuenienti medicamento purgante è corpore eandem educemus. Hinc humorum fluxum ad ventriculum, auertentibus impediemus. Postea ventriculum tam sumptis quàm admotis, roborabimus, intemperiemque relictam emendabimus. Quæ omnia nunc anteaquæ dictis medicamentis felicissimo cum successu consequi poterimus, modò vniversalia particularibus debita ratione applicentur. Ab inanitione autem, aut à siccitate si singultus fiat, propinentur iuscula carniũ, syrupus rosatus, aqua hordei, lac caprinum, similiãque alimenta humectantia. Arte quoque chymica è decocto carniũ perdicum, caponum, mica panis, conferva violarum, aqua buglossæ, menthæ, vinoque generoso, liquor eliciatur, cui tempore vsus, sacchari aliquid permiscebitur. Conuenit quoque balneum aquæ dulcis. Ventriculus denique, nec non spina dorsi cum oleo violato inungatur. Si ab acris humoribus, medicamentis aut alimentis excitetur, cremor ptisanæ, oleum amygdalorum dulcium, aut oleum commune plurimùm iuuant. Si iecoris inflammatio in causa sit, ea primò curanda erit. Si verò à venenosa aliqua materia sui ortus principium habeat, conuenit theriaca cum decocto seminis cardui benedicti, anethi, galangæ, boraginis, cinnamomi. Si à frigidityte ori ventriculi oritur, spiritus retentio fiat; sic equidem calor ibidem colligetur, malumque placabitur.

Meho-



Methodus pro cognitione

DOLORIS STOMACHI
INSERVIENS.

VENTRICULI DOLOR SEV CARDIALGIA, est oris ventriculi tristis quædam sensatio, à succis mordentibus proueniens. Huic malo affinitate quædam coniungitur cardiaca passio, quæ nihil aliud est, quàm ipsius oris ventriculi vitium, ab humoribus prauis, erodentibus virulentisque proueniens, qui eò aut aliunde confluxerunt, aut ibidè collecti sunt, vnde magna corporis sequitur imbecillitas atque languor, eiusdemque per sudorem resolutio, vt subinde etiã in syn- copen incidant sic laborantes, contingitque partes corporis extimas quasi frigere, cum interim è facie, toto thorace, capite atque cervice glutinosi sudores prorumpant. A cardialgia differt in eo, quòd cardiaca passio nò à mordacibus, vt cardialgia, sed potius à virulentis & venenosis humoribus excitetur; ita quidem malignis, quòd æstuosa acutâque febris in cardiaca passione semper concurrat. Isti affectus oris ventriculi diligenter animaduertendi sunt, proptereà quòd os ventriculi magnam societatem habeat cum multis aliis corporis partibus. Cum corde quidè, proptereius vicinitatem; cum cerebro etiam habet maximam, propter nervos recurrentes, illi quasi implantatos. quarum virtutè acutissimo sensu perfusum est os ventriculi. Cum itaque principes corporis partes illi tanta affinitate coniungantur, propriumque illius munus sit cibos appetere, vti cavitatis eiusdem ventriculi proprium munus est, assumptos cibos concoquere; magno studio obseruandi erunt atque placandi dolores huius partis. Ab ipso autem affectu partèque affecta, malum hoc etiam nomen mutuauit,

cum os ventriculi cardia, id est cor, vocarint superioris ætatis medici, propterea quod ex oris ventriculi offensa tam gravia fere sequuntur symptomata, quam si cor læsum esset.

PARS AFFECTA, os ventriculi primò afficitur, vnde & cor ipsum per consensum, propter vicinitatem etiam oblæditur. Id autem testatur dolor cum positu; sub pectoris enim cartilagine dolor angorque cum morlu ac rosione sentitur. Est autem tam cardialgia quam cardiaca passio, symptoma pertinens ad actionem læsam facultatis sensitivæ, ipsius tactus nimirum.

SIGNA. In cardiaca passione sequitur languor & exolutio innati calidi, totiusque corporis. Adest febris acuta maiori ex parte, æstuosaque, necnon pulsus obscurus atque densus, extremarum partium frigiditas, sudores interim viscosi circa faciem & pectus obhærent. Odor diffunditur corporis terrestris, comitatur desperatio, angor animi, & corporis iactatio. In cardialgia verò fit erosio, morsus, atque punctura in ore ventriculi; aliquando alvus biliosa deiecit; quibusdam etiam bilis vomitus evenire consuevit; febris hæc rarius vrget, non ita sudore immodico in cardialgia dissolvuntur, neque tanta imbecillitate toto corpore laborant, magna ventriculi gravitas sentitur & distentio, propter quam magna spirandi difficultas adest, per aluum sæpe plurimum biliosa excluduntur, recreanturque, si ructus, aut per aluum flatus excludantur, & dum alimentum sumptum ad ventris partes descendit.

CAUSA. Excitatur magna ex parte utrumque malum ab humore acri atque mordaci, qui iuxta os ventriculi obhæret, vnde appetitus imminuitur, magisque ante cibum dolent quam post. in cardiaca passione prædictus humor præter acrimoniam atque mordacitatem etiam virulenta venenosaque qualitate participat. A vermibus etiã tam cardialgia quam cardiaca passio excitari potest, quod ex signis in capite de vermibus positis, intelligetur. In bene sanis quoque si ieiuniũ diutius

toleretur, corpusque valide excitetur, cardialgia excitatur. Idem malum aliquando fit à mærore, contingit enim à prædictis causis bilem flauam in ventriculū confluere, vnde morbus rosionesque excitantur. Oritur etiam ex inflammatione, aliōve tumore, aut vlcere, quod propriis signis innotescet. Aliquando (& quidem frequenter) quoque dolor fit propter acidos pituitososque humores; vnde ventositates perturbantes in ventriculo efflorescunt, qui ventriculum haud aliter distendunt, quàm intestina in colico dolore à flatibus conclusis distendi solent. ab humoribus autem frigidis acidisque cum sit, appetitus satis constat, magis quoque à cibo dolent.

PROGNOSTICA. Cardialgia si absque febre inuadat, minus est periculosa, cardiacus verò morbus, eò quod cum acuta febre fiat, perpetuò periculum minatur, nec minus erit periculofus morbus, à lumbricis ascendentibus ad ipsum os ventriculi ortus. Sæpe autem hoc malum iuuenes molestat. In morbis quoque acutis frequenter circa eorum augmentum concurrere solet.



Methodus pro curatione

DOLORIS STOMACHI INSERVIENS.

Perficitur autem subsequētibz remediōrum generibus.

VICTVS RATIONE.

A Er ad frigidum declinet arte aut natura. Cibus offeratur concoctu facilis, & qui corruptioni minimè sit obnoxius, vti sunt auiculæ, capones, perdices, gallinæ pulli, iuscula carniū. Condiuntur alimenta succo granatorum, aurantiorum.

Potus sit vinum aquosum tenue, aut cinnamomi decoctum, hordei ve aqua.

Motus vt malum irritat, sic quies aliquo modo componit.

Somnus sit moderatus, vigilæ enim diuturniores noxiæ.

Animi perturbationes vitentur, potissimum tamen mœror.

PRAEPARANTIBVS.

Oxymel simplex & compositum.

Syrupus menthæ, oxymel squilliticum.

Syrupus de absinthio, mel rosatum.

Aqua saluæ, maioranæ, betonicæ, absinthij, fœniculi.

Syrupus de cichoreo cum rhabbarbaro.

Syrupus violatus, rosarum.

Syrupus de succo acetosæ, acetositis citri.

Syrupus granatorum.

Aqua acetosæ, cichorei, plantaginis, rosarum, buglossæ.

Si dolor non sit tantus vt ordinem curæ inuertat, & materia altius in ventriculi tunicis sit recepta, præsentibus vtetur medicamentis; alioqui ea quæ dolorem placare possunt, omnium primò in vsum aduocabimus. Priori autem loco hæc positis vtetur, si frigida sit materia, posterioribus verò in calida.

VACVARTIBVS.

Vomitibus fiat cum aqua tepida & aceto, necnon oxymelle simplici, digito irritando aut calamo palati interiora.

Clystere ex decocto camomillæ, mel loti, menthæ, maluarum, absinthij, mercurialis, additis diacatholicon, benedicta laxatiua.

Syrupus de multiplici infusione rosarum.

Manna, tamarindi, cassia, rhabbarbarum, myrobalani citrini.

Diaturbith cum rhabbarbaro, hiera picra simplex, composita, hiera logodij.

Pillulæ de agarico, alephangina, mastichina, diaphœnicum. Agarici

Agarici infusum & decoctum, agaricus trochiscatus. Venæ sectio fiet ipsius basilicæ dexteri lateris, si à sanguinis copia ortum habeat, & dolor maximus fuerit, plurimum enim tunc semper iuuamenti affert.

Clementioribus vacuantibus medicamentis hîc utemur, quorum vis hepar non transcendat. Scammoniata autem, cæque quæ turbith admittunt, aliæque fortia medicamenta hîc omnino arcebitur, modò leuioribus malum superari possit.

SEDANTIBVS *dolorem.*

Decoctum camomillæ cum nuce muscata in potu detur, aut scobs eboris; dolores enim placidè hæc leniunt.

Aristolochia longa magnas habet vires in doloribus stomachi.

Fomentationes ex vino fiant, in quo decocta sint semina lini, fœnugræci, fœniculi, mentha, calamus aromaticus, spongiæque prædictis liquoribus imbuta, expressæque, stomacho applicetur, postquam irrigata fuerit prædicto liquore. Calor autem spongiæ conseruetur pannis calentibus.

Unguentum ex oleo absinthij, mastichino, spicæ, nucis muscatæ, anethino, camomelino.

Sacculi ex floribus camomillæ, meliloti, rosis, absinthio, furfure, sale, milio, floribus roris marini.

Emplastrum ex farina lini, fœnugræci, radicibus althææ, oleo lini, camomelini.

Phylonium Romanum.

Athanasia Nicolai.

Zazena.

Syrupus papauerinus, nenupharinus, violaceus, rosaceus.

Postremo loco positis stupefacientibus medicamentis non utemur, nisi periculum viribus immineat, ne ex immodico dolore prosternantur. Ab iis quoque omnino abstinebimus, in quibus vires admodum sunt debiles.

**CORROBORANTIBVS *intemperiemque*
*emendantibus.***

Aromaticum rosatum, diacuminum.

Diagalanga.

Diarhodon abbatis.

Panis ossa infusa in vino generoso.

Vnguentum ex oleo nardino, camomelino, axungia humana, absinthio, oleo maceris, mastichino, caryophyllorum.

Ceratum Galeni stomaticum.

Emplastrum ex ladano, styrace calamita, galanga, mastiche, oleo de absinthio.

Sacculus pro stomacho ex cinnamomo, mace, caryophyllis, ladano, mentha sicca, coriandro præparato.

Rosata nouella, diarhodon abbatis.

Electuarium diatrion sandalorum.

Conserua acetosæ, rosarum, violarum.

Conserua nostra magna magnoperè hîc sæpe iuuat.

Syrupus rosatus, granatorum.

Saccharum rosatum.

Caro cydoniorum sine speciebus.

Vnguentum ex oleo rosato, cydoniorum, mastichino.

Emplastrum fiat ex rosis, mastiche, aloë, alumine, hypocistide.

Odoramentum concinnetur cum aqua rosarum, aceto rosato, rosis atque vino.

Prioribus locus erit dum à frigidis humoribus flatibusve malum dependet; posterioribus verò cum ab acris humoribus originem habet.

T H E O-

~~THEORICA ET EMPIRICA MEDICA~~

THEORICA ET EMPIRICA MEDICA.

menta nobilia in DOLORIS STOMACHI sepius cum summa salute plurimorum agrotorum à Gualtero Bruele experta.

CURATIO DOLORIS STOMACHI.

℞ syrupi de absinthio, menthæ ana ℥ j. ss. oxymellis compositi ℥ j. aquarum menthæ, absinthij, maioranæ ana ℥ iiij. misceantur, fiat *Iuleb.* detur tribus aut quatuor vicibus in aurora.

℞ diaphœniconis ℥ iiij. rhabarbari electissimi, spicæ ana ℥ j. cassiæ recenter extractæ, benedictæ laxatiuæ ana ℥ j. ss. cum saccharo albissimo q. s. fiat *Bolus.*

℞ radicis aristolochiæ longæ ℥ ij. seminum anisi, carui ana m. ij. croci gr. vj. iusculo carniū coquantur aliquamdiu, colaturæ sacchari nonnihil addatur, fiat *Potio.*

℞ hieræ picæ Galeni ℥ ij. pillularum mastichinarum, agarici trochiscati ana ℥ j. syrupi de absinthio q. s. fiant *Pillule* viij. dentur in aurora.

℞ seminis raphani, atriplicis ana ℥ ij. radicū asari ℥ j. coquantur in aqua communi q. s. ad mediætatē consumptionem, colaturæ vnciis quatuor addantur oxymellis simplicis ℥ ij. olei lini ℥ j. fiat *Vomitōrium* medicamentum, detur tepidum manē.

℞ diaphœniconis ℥ vj. phyloniij Romani ℥ j. decocti camomillæ, fœniculi, anisi ℥ iiij. fiat *Haustus*, in dolore admodum vehementi.

℞ specierum diarhodonis abbatis, aromatici rosmari Gabriælis ana ℥ ij. sem. zinziberis conditi ℥ j. cinnamomi ℥ j. sem. castorei, seminum ameos ana ℥ ij. sem. cumini post infusionem in aceto torrefacti, galangæ ana ℥ j. sem. syrupi menthæ & absinthij q. s. fiat *Mixtura.*

S ij.

℞ mithridati ℥ j. theriacæ Andromachi ℥ ij. aristolochiæ longæ ℥ ss. vini generosi ℥ iiij. fiat *Haustus*.

℞ radicū aristolochiæ longæ, feminum ameos, cumini ana ℥ ss. cinnamomi ℥ j. ss. zinziberis conditi ℥ ij. castorei ℥ j. terebinthinæ q. l. fiat *Mixtura*, vel massa pilularum.

℞ vini rubelli modicè astringentis ℔ j. ss. in eo aliquamdiu macerentur panis mediocriter torrefacti ℥ iiij. cinnamomi, nucis muscatæ ana ℥ j. optimè exprimantur, addaturque sacchari albissimi q. s. bibat aliquoties in die *Haustum* mediocre.

℞ diagalangæ ℥ iiij. diacumini, theriacæ veteris, mithridati optimi ana ℥ j. syrupi menthæ q. s. fiat *Electuarium* molle.

℞ olei nardini, mastichini ana ℥ ij. olei macis, camomelini, anethini ana ℥ iiij. olei rutacei, axungię humanæ ana ℥ iiij. ss. nucis muscatæ ℥ ss. fiat *Unguentum*.

℞ florum rosarum rubrarum, camomillæ, meliloti ana m. j. ss. foliorum absinthij m. ij. feminum lini, fœnugræci ana ℥ j. ss. feminum fœniculi, anisi ana ℥ ss. coquantur in sufficienti quantitate aquæ ad tertiæ partis consumptionem, fiat *Fomentatio* stomachi aliquoties in die calente liquore.

℞ radicū aristolochiæ longæ ℥ ss. florum camomillæ, meliloti ana m. j. ss. rosarum rubrarum m. ss. feminum cumini, anisi, fœniculi ana ℥ j. ss. feminum fœnugræci, lini ana ℥ j. foliorum absinthij m. j. coquantur vt prædictum est ad tertiæ partis consumptionem; fiat *Fomentatio* stomachi.

℞ panis mediocriter tosti q. s. vino maluatico, succoque menthæ & absinthij ana q. s. maceretur, addito nucis muscatæ ℥ ij. fiat *Cataplasma* pro stomacho: sedat dolorem, vomitum & singultum.

℞ emplastri stomatici Galeni ℥ j. caryophyllorum, macis, mastichis, rosarum rubrarum, feminum anisi, fœniculi ana ℥ j. galangæ, menthæ siccæ ana ℥ ss. ladanij ℥ ij. ss. olei nardini, mastichini ana q. s. fiat *Scatum*

rum stomaticum.

℞ florum rosarum rubrarum, menthæ siccæ, absinthij ana 3 ij. ss. galangæ, cinnamomi, caryophyllorum, mace-
ris, ladani ana 3 j. ss. comminuantur, pannóque rubeo è
serico insinuantur, fiat *Sacculus* pro stomacho.

℞ cumini in aceto infusi, torrefactique, cinnamomi
ana 3 ss. aristolochiæ longæ 3 j. ss. nucis muscatæ nume-
ro iiij. macis 3 ij. ss. diarhodonis abbatis 3 iiij. concludan-
tur linteolo tenui mollique, quo scutella cineribus mo-
dicè calentibus impleta, cooperietur, sicque stomacho
totum accommodabitur.

APPENDIX

ad prædicta pro curatione DOLORIS STO-
MACHI, ab humoribus frigidis, acidis,
flatibusque prouenientis.

*Omniū primò naturæ obediētes reddemus humores peccan-
tes. Demum electo medicamento conuenienti è corpore excludan-
tur. Interea autem temporis ea quoque offeremus quæ dolorem se-
dare possunt, in quæ in finem theriacam propinare licebit recen-
tem, si dolor admodum urgeat, aut electuarij diaphæniconis drag-
mis sex permiscebimus Phylonij Romani 3 j. Hinc ventriculum,
circumstantesque partes roborabimus, intemperiemque relictam
emendabimus. Quæ omnia nunc antèaque dictis medicamentis fe-
licissimo cum successu consequi poterimus, modò uniuersalia par-
ticularibus debita ratione adhibeantur. Oleo quoque rosato
myrtinòve corpus, si sudoribus exoluatur, inungemus. Si à
vermibus hoc malum incrementum sumat,
primò interimantur, hinc è corpore
excludantur; uti suo loco
indicatur.*

S iiij

XX

Methodus pro Cognitione

**IMBECILLITATIS
VENTRICULI**

INSERVIENS.

VENTRICULI CRUDITAS VEL IMBECILLITAS, est dispositio alteratricis facultatis eius in qua cibus aut omninò non, aut saltem vitiosè alteratur atque concoquitur. Si prius accidat, tunc priuatio alterationis alimentorum accidit. Si verò posterius, solummodo deprauatio alterationis fit. Contingit autem ventriculum bene se habentem, alimentum cibúmque sibi assimilare, & in conuenientem animali qualitatem alterare, propter certam quandam elementorum temperiem, quæ proprietatem eiusdem corporis efficit. Si verò ab aliqua causa non naturali oppugnetur, mox etiam deprauata sequitur alteratricis facultatis actio, quam ventriculi cruditas, de qua nunc agimus, excipit.

PARS AFFECTA. Ventriculum eiusdemque facultatem hîc oblædi contingit magna ex parte: omnium equidem iudicio, alteratio alimentorum à ventriculo fit. Subinde etiam ab externa aliqua causa contingit alteratricem ventriculi facultatem errare, ventriculique cruditatem subsequi, etiam si ventriculi facultas non lædatur, vti ex sequentibus patebit.


SIGNA. Tarda difficilisque fit concoctio, subinde etiam concoctricis facultatis fit priuatio; tuncque alimentorum qualitas etiam diu post sentitur; acidi quoque ructus sæpè fiunt, halituoso denique ventriculus spiritu grauat.

CAUSA.

CAUSA. Contingit sæpe ventriculi debilitatem relinqui in conualescentibus, morbo acuto aut longo superato, aliquando quidem tantam, ut neque assumat alimentum, aut assumptum non elaboret, estque indicium reliquias morbi relictas in causa esse, quod suctionis sensum non percipiat; aliàs autem quoque accidit, quod suctionis sensum percipiat quidem, quæ à membris extenuatis ipsius corporis fit, eaque ratione alimentum expetit, elaborare tamen assumptum non potest ob debilitatem relictam. Frequenter quoque in sanis ventriculi debilitas accidit, ob ventriculi intemperiem calidam, frigidam, humidam aut siccam, quæ aliàs sola est, diu interim subsistere non potest absque humorum peccantium concursu; digestiva enim ventriculi virtute labefactata, necessario humores crudi colliguntur calidi vel frigidi, aliave qualitate extranea molestantes, tuncque plerumque concurrit nausea, stomachi gravitas, ructus, aliquando etiam vomitus, & quidem frequenter à vitiato intus humore pituitoso fit: tunc sapor qui linguæ communicatur, dulcis aut aquosus est, multumque salivæ sine ructu scretivè redditur, acidus fit ructus, impeditur concoctio, inflatur distenditurque ventriculus aliquot horis à cibo, magnæ torsiones, gravesque dolores in ventriculo excitantur, unde sæpe hydropes, colicæ, iliacæque passiones originem habent. Nonnumquam fit à flava bile: tunc ventriculi erosio sentitur, potissimum per incediam, vomitu iniicitur amarus humor, unde os quoque amarore inficitur, unde etiam subinde in cardialgiam transitio fit. Si autem à melancholico succo intus luxuriante fiat, acidus gignitur in ore sapor, tristitia afficitur, fitque meticulosus, insomniis quoque agitur turbulentis, palpitatio in sinistro hypochondrio sentitur, appetitus etiam pro tempore increfcit, sicque in melancholiâ hypochondriacam vel epilepsiam transitio fit, surarum muscoli contrahuntur. Subinde verò ventriculi cruditas occidit, cum læsa nequaquam facultas est, sed frustratur vel

impeditur ab externo aliquo errore, ut sunt immodicæ vigiliæ, exercitationesque mox à cibo factæ, alimentorum maior copia assumpta quàm ut à calore naturali confici possit, aut eorundem prava aliqua qualitas. Ab humoribus etiam fit vitiosis, aliunde ad ventriculum transmissis, ut in hæmorrhoidum mensiumque suppressione. Sic sæpe in morbis articularibus contingit materiam sæpe ad stomachum transmitti, quæ ad alias partes derivari solebat.

PROGNOSTICA. Deterior est ea cruditas quam vitiosi succi cibaria efficiunt. Aequè mala quoque est in amara bile redundantibus cruditas; citissimè enim febrem accendit. Maximè autem vitanda est cruditas assidua; morbi equidem ex ea gignuntur graues, longi, variique; imò mater ferè est omnium ægritudinum materialium, hydropis nimirum, colicæ iliacæque passionis, lientericæ denique, alique quàm plures morbi ex ea efflorescunt. Mala complexio stomachi postquam est antiqua & confirmata, non recipit curationem. Qui multum spuunt, aquamve quasi acidam reieciunt frequenter, à frigidityte stomachi id fieri solet.



Methodus pro curatione

IMBECILLITATIS VENTRICULI INSERVIENS.

Perficitur autem subsequentibus remediorum generibus.

VICTVS RATIONE.

A Er versus calidum declinet. Plurimum autem hic proderit vestimentis bene muniti aduersus iniurias externas.

Cibus

Cibus qui faciliè concoqui possit offeratur in parua quantitate; vnicè enim hîc cauendum ne plus quàm vires tolerant, alimenti sumatur, & ne antequam hesternus cibus concoctus sit (horam consuetam præuertendo) alimentum sumat. Vitentur omnia ea quæ difficulter concoquuntur, vt sunt carnes ceruinæ bubulæ, bouinæ duriusculæ, multumque salis, pinguis omnia, pisces arefacti duramque habentes carnem. Ea quoque vitabuntur quæ corruptionem citò admittunt, & quæ flatuosa sunt, multumque calida aut frigida, grauiusque olentia, oua sorbilia cum mastiche condiantur, aut cinnamomo.

Potus: Vinum bonum conuenit. Intempestius autem vini vsus maximè fugiendus, cum vnionem alimenterum impediat.

Exercitium conturbans à cibo sumpto noxium admodum est, eaque ratione quies imperetur.

Somnus sit nocte non turbatus, pauloque sublimius caput, connexæque corporis partes componantur tempore somni.

Animi accidentia vitentur, gaudiumque admittat moderatum.

PRÆPARANTIBVS.

Syrupus de absinthio, hyssopo, calamintha, syrupus menthæ.

Oxymel compositum, squilliticum.

Aqua menthæ, absinthij, fœniculi, betonicæ.

Syr. de succo acetosæ, rosarum, cydoniorum, de succo ribes.

Aqua acetosæ, plantaginis, rosarum.

Primo loco positus, dum ab intemperie aut materia sit frigida ventriculi debilitas, sequentibus verò utemur, si ab intemperie aut materia calida dicti visceris imbecillitas fiat. Tepentia autem nequaquam dabimus bibenda, cum inde virtus stomachi relaxetur, sed potius frigida aut actu calentia offeremus.

VACVANTIBVS.

Venæ sectio iccorariæ fiet, si dolor concurret multum

molestus, aut repentinus.

Diaturbith cum rhabarbaro, hiera picra, hiera de agarico.

Pillulæ alephanginæ, stomaticæ.

Syr. de multiplici infusione rosarum.

Rhabarbarum infusum, cassia fistula, myrobalani kebuli, emblici, bellirici, aloë lotum.

Vomitus cū dilutissima mulsa, vel aqua tepida, in qua raphanus incoctus fuerit, & cui oleū cōmune additū sit, mox prouocādus erit; diuersis autē alimētis vnica vice vretur. Per quatuor autē aut quinque dies, instituetur semel in die, poterimusque addere oxymel squilliticum; sic equidem sperandum quòd humores phlegmatici aliq; maligni eis misti, expellentur; solet enim hoc frequenter euenire.

Lenissimis hīc vti conuenit medicamentis, dum materia aliqua peccans adest, alioqui enim oberunt, cō quòd fortioribus medicamentis vires ventriculi debiles magis debilitarentur. adde quòd materia in propinquo est, & parum semota.

AVERTENTIBVS.

Clysteres leues, & aliquando quoque acres, prout res exigit.

Ligaturæ pedum fortes supra genua.

Ventosæ natibus, coxis, vel aliquando etiam vmbilico appositæ.

Lotiones pedum & brachiorum cum aqua calente.

Hæmorrhoidalium venarum apertio.

Sudores prouocantia.

Vrinæ prouocatio.

SISTENTIBVS.

Syrupus Cydoniorum.

Granatorum.

Trochisci de olibano.

Trochisci de terra sigillata.

CORROBORANTIBVS stomachum,
intemperiemque emendantibus.

Theriaca, mithridatum.

Dia-

Diarhodon abbatis, aromaticum rosatum, diatrion piperon, diaspoliticum, diagalanga.

Plirisarcoticum, diaxyloaloes, diacinnamomum, diacydonium, diacalaminthes.

Syr. menthæ, vinum hypocraticum, absinthites, aqua vitæ, syr. de absinthio.

Cortices citri condite; zinziber conditum, galanga condita, conserua florum anthos.

Piper longum, cinnamomum, macis, caryophylli, calamus aromaticus, cyperi radix.

Decoctum ligni guaiaci.

Absinthium, mentha, nux muscata, massix, vux passæ.

Pueri carnosi ventriculo admouebuntur. aut,

Pellis leporis, aut catuli, cuniculi ve, palma manus calida ventriculo admoueatur.

Decubitus primum in latus dexterum, hinc sinistrum, iterumque in dexterum.

Fotus ventriculi cum spongia immersa in vino generoso, cui sint incocta nonnulla ex stomaticis iam dictis.

Vnguentum dialthææ, aut ex oleo absinthii, menthæ, macis, mastichis, in his aromata coquantur.

Sacculus ex mollissima pluma anseris.

Scutum stomaticum ex bombace bene carpto, in vino generoso immerso, exiccatoque; cui tandem cinnamomi, absinthii, nucis muscatæ, aliorumque prædictorum aromatum portio aliqua permiscebitur, & infarciatur.

Ceratum stomaticum Galeni, ex galanga, nuce muscata, absinthio, caryophyllis, mentha.

Syr. de succo cydoniorum, de succo ribes, de succo acetosæ, de rosis siccis, acetosus simplex, vinum granatorum.

Conserua rosarum, violarum, miua cydoniorum, caro cydoniorum.

Diamargaritum frigidum, diatragacanthum, diatrium sandalorum.

Ambra citrina, cornu cerui, ebur vstum, corallum.

Aqua acetosæ, rosarum, plantaginis.

Vnguentum ex oleo rosarum, myrtilorum, cydoniorum.

Vnguentum rosarum, violarum.

Ceratum sandalinum, ex balauistiis, corallo, sandalis, rosis, spodio, malicorio.

Priora conueniunt, dum frigidam intemperiem relictam esse suspicamur; posteriora verò, dum calida perstiterit. Cauendum interim à multum frigidis erit; ventriculus equidem cum natura sua multum frigidus sit, facile læderetur ab immodicè refrigerantibus.

**THEORICA ET EMPIRICA MEDICAMENTA nobilia in DEBILITATE VENTRICULI
sapius cum summa salute plurimorum aegrotorum à
Gualtero Bruel experta.**

CVRATIO DEBILITATIS VENTRICULI.

℞ syrupi menthæ, cydoniorum, absinthii ana ʒ j. oxymellis squillitici, mellis rosati colati ana ʒ β. aquarum absinthii, fœniculi, menthæ ana ʒ iiij. fiat *Iuleb.* dentur in aurore quatuor vicibus vnciæ quatuor.

℞ decoctionis hordei & raphani ʒ vj. oxymellis squillitici ʒ j. β. olei amygdalorum dulcium ʒ j. misceantur simul, fiat *Vomitorium* medicamentum, quo sepius utetur, sumet autem tepidum.

℞ diaturbith cum rhabarbaro ʒ iiij. cassiæ recentè extractæ ʒ v. sacchari albissimi q.s. fiat *Bolus.*

℞ radicum petroselini, buglossæ ana ʒ j. β. galangæ ʒ ij β. foliorum melissæ, menthæ ana m. j. β. seminum anisi ʒ β. glycyrrhizæ rasæ ʒ iiij. vuarum passarum enucleatarum ʒ j. cinnamomi ʒ j. agarici albi ʒ iiij. coquantur

in

in aqua q. s. ad lb j. β . colaturæ adde diacatholiconis \mathfrak{z} j. β . syrupi de corticibus citri \mathfrak{z} ij. fiat *Potus*.

\mathcal{R} pillularum mastichinarum, aloës, ana \mathfrak{z} j. β . cum syrupo menthæ q. s. fiant *Pillule* octo numero.

\mathcal{R} hieræ picræ Galeni, pillularum stomaticarum, de agarico ana \mathfrak{z} j. rhabarbari electissimi \mathfrak{z} β . syrupi absinthii, menthæ ana q. s. fiant *Pillule* octo.

\mathcal{R} specierum aromatici rosati Gabrielis \mathfrak{z} β . diagalangæ, zinziberis conditi ana \mathfrak{z} ij. mastiches, cinnamomi ana \mathfrak{z} j. β . caryophyllorum, nucis muscatæ ana \mathfrak{z} j. sacchari albillimi dissoluti in aqua absinthii & menthæ ana q. s. fiat *Electuarium* in tabulis, sumat vnâ hora vna ante cibum : hinc bibat haustum vini optimi stipticique.

\mathcal{R} diamargariti calidi \mathfrak{z} ij. aromatici rosati Gabrielis, mithridati ana \mathfrak{z} j. diacydonites cum speciebus \mathfrak{z} j. syrupi menthæ q. s. fiat *Electuarium* molle.

\mathcal{R} mastiches \mathfrak{z} ij. spice nardi \mathfrak{z} β . aloës \mathfrak{z} iiij. rhabarbari \mathfrak{z} j. β . agarici trochiscati \mathfrak{z} j. β . syrupi de eupatorio & mentha ana q. s. fiant *Pillule*, maximè quidem conueniunt stomacho.

\mathcal{R} mastiches, olibani ana \mathfrak{z} iiij. cum syrupo menthæ figuretur massa *Pillularum*; detur \mathfrak{z} j. liquefacta in vino, propineturque in aurora; calefacit atque exiccat stomachum, & catarrhum à cerebro descendentem restringit, si manè & sub noctem iis vtatur pluribus diebus.

\mathcal{R} radicum ireos \mathfrak{z} iiij. rosarum rubrarum \mathfrak{z} iiij. menthæ siccæ \mathfrak{z} j. mastiches \mathfrak{z} ij. β . florum nucis muscatæ, cinnamomi ana \mathfrak{z} β . syrupi granatorum q. s. fiat *Mixtura* in humiditate stomachi.

lb sp. aromatici rosati \mathfrak{z} ij. diagalangæ \mathfrak{z} j. zinziberis conditi \mathfrak{z} j. β . zedoariæ, nucis muscatæ ana \mathfrak{z} ij. syrupi de corticibus citri q. s. ad consistentiâ mollis *Electuarij*.

\mathcal{R} radicum galangæ \mathfrak{z} ij. β . florum camomillæ, cecilioti ana m. j. foliorum absinthii, menthæ, ana m. j. cin-

namomi optimi, macis, nucis muscatæ ana 3 j. contusa nonnihil bulliant in vino odorifero atque generoso ad tertiæ partis consumptionem; fiat *Fomentatio* pro stomacho.

℞ olei nardini, mastichini ana 3 j. olei rosacei 3 iij. olei cydoniorum 3 j. ꝑ. cerę & aceti parum, fiat *Vnguentum* molle.

℞ florum camomille, rosarum rubrarum ana m. ꝑ. foliorum absinthii, menthæ ana m. j. cinnamomi, caryophyllorum, macis ana 3 j. galangæ, ligni aloës, calami aromatici ana 3 j. ꝑ. mastiches 3 ij. olei menthæ q. s. fiat *Ceratum*.

℞ menthę siccæ, maioranæ, absinthii ana m. j. mastiches, thuris ana 3 j. maceris, zinziberis, nucis muscatæ, cinnamomi, caryophyllorum ana 3 iij. calami odorati, galangæ, ligni aloës ana 3 ij. galliæ muscatæ, ladani ana 3 ꝑ. terebinthinæ & ceræ q. s. fiat *Emplastrum* mollis consistentiæ; hinc quoque scutum fieri poterit pro ventriculo.

℞ ceroti stomatici Galeni 3 j. ꝑ. radicem cyperi 3 j. croci 3 ꝑ. cinnamomi 3 ij. mastiches 3 ꝑ. olei absinthii q. s. fiat *Emplastrum*.

℞ rosarum rubrarum m. ꝑ. absinthii, menthę, ana m. j. ꝑ. coquantur in vino generoso q. s. ad mollitudinem, pistatis adde panis tostii q. s. fiat *Cataplasma*. A materia calida dum fit:

℞ syrupi violarum, de cichorco cum rhabarbaro ana 3 ij. aquarum endiviæ, boraginis, violarum ana 3 iij. fiat *Uleb*.

℞ syrupi violarum 3 ij. rosacei, granatorum ana 3 j. aquarum violarum, buglossæ ana 3 v. fiat *Uleb*.

℞ rhabarbari electi 3 j. myrobalanorum citrinorum 3 ij. calliæ recenter extractæ 3 ꝑ. spicæ gr. ii j. fiat *Bolus*.

℞ hordei mundati m. iij. glycyrrhizæ rasæ 3 vj. seminum cucurbitę, cucumeris ana 3 iij. acetosę 3 ij. glycyrrhizæ

rhizæ 3 iij. vuarum passarum m.ij. coquantur ad tertie partis consumptionem, fiat *Potio*.

R^x syrupi violarum, rosacei ana 3 ss. rosarum nouellæ 3 ij. ss. conseruæ boraginis, rosarum, violarum ana 3 ss. sacchari rosacei 3 j. ss. syrupi granatorum 3 j. misceantur: fiat *Mixture*.

R^x diatragacanthi frigidi, diamargariti frigidi ana 3 j. ss. sacchari albissimi dissoluti in aqua violarum q.s. fiat *Electuarium* in tabulis.

R^x rosarum rubrarum m.ij. foliorum absinthii m. ss. seminum coriandrorum præparatorum, sandalorum citrinorum, corallorum rubrorum ana 3 j ss. coquantur in aqua q.s. ad tertie partis consumptionem, fiat *Fomentatio* ventriculi.

R^x olei rosacei 3 v. cydoniorum, myrtilorum ana 3 vj. rosarum rubrarum, corallorum rubrorum ana 3 ss. sandalorum citrinorum 3 j. ceræ & aceti parum; fiat *Unguentum*.

R^x cerati refrigerantis Galeni, sandalini ana 3 j. olei rosarum, cydoniorum ana q.s. fiat *Cerotum*.

A P P E N D I X

ad prædicta pro curatione DEBILITATIS
VENTRICULI inferuens.

Omniū primò hîc tentandum an medicamento vomitum leuiter excitante, materiam in ventriculo morantem educere possimus. Quòd si voti compotes minimè sic fiamus, naturæ obediētes reddemus humores peccantes. Dentur autem actū frigida potius aut calida quàm tepida. Demum ubi dictorum vsu humores concoctos obseruabimus, purgante medicamento e corpore educemus. Hinc quæ ventriculum roborare possunt offerenda erunt. Quæ omnia nunc aut eaque dictis medicamentis felicissimo cum successu consequi poterimus, modò vniuersalia particularibus debita ratione adhibeantur. Semper autem aliqua

addemus prædictis quæ hepar roborare possunt, quamvis læsum non sit, cum maximè iuvet stomachum in operationibus suis naturalibus; est equidem principium & sedes facultatis naturalis. Plurimum autem momenti habet tam in præservatione quàm in curatione huius mali, ut alimentum non offeratur antequàm assumptum digestum sit. Multùmque proderit à mensa surgere cum reliquis famis. Si per consensum alicuius partis, aut à toto corpore materia superflua ad stomachum deriuetur, id primò purgabimus, postea stomachum Deinde adstringentibus medicamentis locus erit quibus humores fluentes sistemus; in qua re plurimùm prodest syrupus papaverinus. Denuum roboretur stomachus modo prædicto. Ab intemperie sicca si accidat stomachi debilitas, iis quæ humectare possunt curabitur, lacte nimirum, carniū iusculis, balneis humectantibus, similibusque. Cavendum autem ne nimium humectemus, cum inde virtus dissolvatur stomachi. Si causæ diversæ complicantur, pro causarum diversitate curandi rationem instituemus. Si debilitas fiat ob imbecillitatem à morbo relictam, uti sæpe post longas accidit ægrotudines, cavè providendum, ut tantum solummodò alimenti offeratur, quantum stomachus conficere potest; alioquin enim periculum est ne in recidivam incidat.

Methodus

Methodus pro cognitione

OPPI LATIONIS HE-

PATIS INSE-

VIENS.

OPPILATIO HEPATIS, est constrictio seu coarctatio venarum, seu foraminum pororumque qui in hepate sunt. Malum autem hoc inter omnia alia admodum huic visceri familiare est, nec mirum; iecur equidem vera est sanguinis officina, e qua omnes reliquæ corporis partes alimentum depromunt. Vnà autem cum puriore sanguine, crassi quoque humores atque lenti in iecore, e chymo præsertim minus puro generantur. Cum autem rami venæ cavæ, ramis venæ portæ ita obscure coniungantur, ut visum omnino effugiat eorum copula continuatioque: cum denique alimentum omnium corporis partium traduci transportarique debeat per extremitates venæ portæ, necnon venæ cavæ, quæ, uti diximus, admodum sunt parvæ ubi in iecoris substantiam terminantur, non est, inquam, mirum si propter magnam venarum meatuumque angustiam obstructions frequentius hic fiant quàm in aliis visceribus. est autem hoc malum variorum morbotum quasi seminarium. Nequaquam autem hic agimus de obstructione iecoris quæ fit ab eiusdem visceris inflammatione, aut ab erysipelate, aliòve aliquo tumore non naturali, sed de ea læsione quæ sequitur obstructionem extremitatum venarum ex infarctu alicuius substantiæ, flatuosi condensatique nimirum spiritus, aut alicuius humoris.

PARS AFFECTA. In extremis partibus vasorum venæ portæ atque cavæ malum istud feri solet, ubi in tenuissimas extremitates in iecoris substantia finiun-

T


tur, osculisque admodum exiguis sibi mutuò quasi committuntur, per quæ tamen distributio alimenti per totum corpus fieri debet; id quod ex doloris qualitate, eiusdemque positu intelligitur: in loco equidem iecoris, dolorem grauantem atque obtusum sentiunt ægri. Nequaquam autem in visceris ipsius substantia fit hæc obstructio, cum ibidem viæ nullæ sint usque eò sensibiles, ut obstrui possint, quamuis spatia tamen concedamus ratione potius contemplabilia, quæ obstructa tamen non dicentur.

SIGNA. Dextero hypochondrio grauitas atque distensio cum obtuso dolore si insideat tum potissimum perceptibilis, cum mox à cibo quis exercitatur, certissimum erit obstructionis signum. Nulla febris, nullusque tumor accedit, nisi id diuturnitate in crude scat: omnis equidem obstructio inueterata putrefactionem operatur, eaque ratione febrè tempore parit. Spiritus impedite trahitur, potissimum si iter faciat per loca nonnihil montosa. Color faciei mutatur in magis fœdum, citrinum nimirum vel pallidum, eò quod partes distantes priuentur alimento conuenienti. Urina nonnihil fit tenuis aquosaque. Si in caua iecoris parte fiat obstructio, ut plurimum post prandium sentitur dolor atque grauitas in hepatis loco maior, eò quod humores atque vapores alimentis eò delati, non possunt ita liberè subire iecoris substantiam per ductus conuenientes, propter eorundem angustiam alius nunc liquida, nunc adstricta est in hoc malo.

CAUSA. Meatum venarumque iecoris angustia, sæpe huius mali causa est, id quod nonnullis obtigit ab ipsa generatione, tuncque diuturnum est malum, & à principio generationis nonnulla adfuere signa huius mali, ex omnique leui occasione obstructionem in hepate fieri, obseruare licuit. Frequens autem esse solet iis qui frigidam intemperiem corporis habent, omnium tamen frequentissimè ex multis crassis lentisque humoribus obstructio iecoris fit, qui se insinuant in extremitates

mitates ramorū venæ portæ, vbi in iecoris substantiam dispergitur, tunc circa dexteram præcordiorum partem grauitatis sensus percipitur aliquādo cum dolore obtuso, aliàs etiam nonnihil intenso. Idem etiam à multis crassis viscosisque alimentis fieri solet, dum vsu balnearum, aut exercitio validiore mox à cibo, in iecur rapiuntur. Idem malum fit ab humoribus crassis à cerebro in ventriculum delapsis, aut circa intestinorum loca coaceruatis, simili ratione ad iecur transmissis. Aperientium quoque vsus medicamentorum ventriculo existente pleno crudis humoribus, eandem obstructionem aliquādo facere solet. Aliquando quoque ex densis halituosisque vaporibus, cum exitum non habent, propter corpulentiam quam induerunt, malum etiam istud excitatur, sentiuntque laborantes non solum grauitatis, sed etiam distensionis tunc sensum.

PROGNOSTICA. Totius corporis extenuationem fieri ex eius diuturnitate necessum est, propter alimentum pænuriam. Ex iecoris obstructione longiuscula multi grauésque in corpore nascuntur morbi; hinc enim durus sine dolore tumor, inflammatio, febris, humorum putrefactio, fluxio alui, iliaca passio, colicusque dolor, icteritia, hydrops. Frigidi humores dum diu in iecoris vasculo continentur, demum quoque iecoris propriam substantiam in frigidam mutant, vnde tunc hydrops facile se insinuat. A natiuitate ob viarum paruitatem, si facta sit obstructio, curam non admittit, bono tamen regimine à multis ægritudinibus præseruari potest, quæ ad huius præsentiam subsequi solent.



Methodus pro curatione

OBSTRVCTIONIS IECORIS INSER- VIENS.

*Perficitur autem subsequentibus remediorum
generibus.*

VICTVS RATIONE.

A Er calidus atque clarus.

Cibus. Ea quæ calefacere obstructionemque tol-
lere possunt, admittantur; quæ autem succum crassum
generare solent, vitentur. In iusculis coquantur radi-
ces petroselini, fœniculi, apij, asparagi, eorundemque
semina, folia cichorei, pulegij, hyssopi, intubi, por-
rum. Copiam vitet ferculorum; neque admittat ali-
menta priusquam digesta sint quæ prius sumpta fe-
runt; tuncque ita moderatè victitet, ut famis reliquæ
maneant dum à mensa surgit.

Potus sit ptisana, vinum tenue atque vertus. Vina verò
dulcia, astringentia, necnon crassa, vitentur. non bibat
priusquam pro ratione alimentum assumpserit.

Exercitia sumpto cibo vitentur, & maximè equidem
balnea. Interposito autem spatio exercitium admitta-
tur moderatum, quies equidem noxia.

Somnus diurnus vitetur atque diuturnus; sitque no-
cturnus quasi septem horarum.

Excrementa alui respondeant.

Animi accidentia vitentur, ira nimirum, tristitia, solli-
citus.

Ea verò quæ lætitiā mouere possunt, admittantur.

PRAEPARANTIBVS.

Syr. Byzantinus, de eupatorio, absinthio, capillorum
Veneris.

Oxymel

Oxymel simplex, compositum, squilliticum, oxysaccharum.

Mel rosatum.

Aqua foeniculi, asparagi, cuscute, absinthij, eupatorii, apij.

Decoctum radicum ireos, rubiae maioris, asari, petroselini, squillae, scolopendriae, calaminthae, eupatorii, prasilij, hyssopi, cichorei, seminum anisi, foeniculi, capillorum Veneris, hepaticae, absinthij, cuscute, cicetum, vuarum, cinnamomi, melle, acetique addito.

Syr. acetosus compositus de cichoreo cum rhabarbaro.

Oxymel squilliticum, syr. de quinque radicibus.

Syr. endiviae eiusdemque decoctum, calorem praeternaturalem remittit, qui obstructioni iecoris coniungitur.

Aqua intubi, cichorei, lupuli, endiviae, cuscute.

Decoctum cicetum rubrorum, lupinorum, fructuum alkekengi, cuscute, endiviae, squinanthi, chamæpitryos, radicum graminis, foeniculi.

Prioribus, aperientibus, incidentibus detergentibusque medicamentis utemur; si obstructio iecoris fiat à materia frigida, crassa atque viscosa, cum qua nec febris, nec sitis, nec ardor adest. Secundo verò loco positus utemur, si caliditas, sitis, suspicioque febris cum ipsa obstructione concurrat. In omnibus autem observandum ne à principio incipiamus cum medicamentis fortiter aperientibus; ne materias ruere faciamus ad hepar.

VACUANTIBVS.

Venae iecorariae dextrae sectio fiet, si in vetustatem malum necdum abierit; aut si materia crassa sanguini copiose permisceantur; hanc enim loco moveri cogit sanguinis missio. In hæmorrhoidibus tamen, mensibusque suppressis, cruris venam secabimus.

Electuarium Indum, diaphoenicum.

Agaricus trochiscatus, hiera picra.

T iij

Pillulæ alephanginæ, aggregatiuæ, de eupatorio.

Pillulæ de rhabarbaro, de agarico.

Rhabarbarum, cassia, manna.

Decoctum radicum petroselinæ, asparagi, fœniculi, rusci, apij, foliorum absinthij, prasiij, hyssopi, chamæpitios, chamædryos, seminum anisi, epithymi, seneg, agarici, rhabarbari, turbith, oxymelite addite.

CORROBORANTIBVS *hepar, obstructio-
nemque tollentibus.*

Trochisci de rhabarbaro, de eupatorio, de absinthio.

Diarhodon abbatis.

Diagalanga.

Aromaticum rosatum.

Syr. de eupatorio.

Diacurcuma, dialacra.

Dianisum, diambra.

Pistaciæ, vux passæ, endiuiz tres species.

Hepar lupi.

Rhabarbarum.

Succus granati acidi permixtus cum oxymelite.

Absinthium, eupatorium, cuscuta, cichoreum, spica nardi, fumaria, dracunculus, radices asparagi, asari.

Radices æori, rusci, semina anisi, lupini, amygdalæ amaræ.

Epithema ex vino mediocriter adstringente, in quo coquantur radices cyperi, asari, folia eupatorij, absinthij, capillorum Veneris, flores spicæ, cassia lignea, cinnamomum.

Vnguentum ex oleo spicæ, absinthij, cinnamomo, cassia lignea, aceto & cera.

Emplastrum de meliloto.

Diachylum ireatum commune.

Quæ multum sunt viscosa, aut stiptica, hinc vitanda omninò sunt; ea enim potius obstructionem augebunt.

CORRIGENTIBVS *symptomata.*

Hydrops,

Colica.

Iliaca.

Fluxus ventris.

Hæc accidentia, aliique multi morbi qui ex obstructione iecoris nascuntur, vti suis locis indicatur, curari debent.

**THEORICA ET EMPIRICA MEDICAMENTA nobilia in OBSTRUCTIONE HEPATIS
sepius cum summa salute plurimorum egrotorum à
Gualtero Bruel experta.**

CURATIO OBSTRUCTIONIS HEPATIS.

℞ radicum asari, angelicę ana ʒ vj. eupatorii, lupulorum, absinthii, culcutę ana m. j. seminum anisi ʒ j. fructuum alkekengi ʒ ss. cicerum rubrorum ʒ iiij. agarici albi & leuis ʒ ij. ss. coquantur in aqua q. s. ad libram vnam & mediam: colaturæ adde diaturbith cum rhabarbaro ʒ viij. olei absinthii ʒ iiij. fiat *Clystere*.

℞ pulpe cassię recenter extractę ʒ j. rhabarbari electi, agarici trochiscati ana ʒ j. ss. trochis. de eupatorio ʒ j. sacchari albillimi q. s. fiat *Bolus*.

℞ syrupi de cichoreo cum rhabarbaro, syrupi Byzantini, acetosi compositi, de eupatorio ana ʒ j. aquarum cuscutę, vini albi odoriferi ana ʒ vj. fiat *Iuleb*. aut,

℞ oxymellis compositi ʒ ij. oxymellis squillitici ʒ j. decocti eupatorii, seminum endiuie, radicum fœniculi, asparagi, petroselini, dracunculi ʒ x. fiat *Iuleb*; cum sacchari quantitate sufficienti.

℞ radicum gentianę, asari ana ʒ ss. eupatorii, capillorum Veneris, endiuie, cuscutę, chamędryos ana m. j. seminum carui, cicerum rubrorum, fœniculi ana ʒ iiij. cinnamomi, macis, rhabarbari ana ʒ j. ss. coquantur in aqua q. s. ad lb j. ss. colaturæ adde oxymellis squillitici ʒ iiij. fiat *Potio* in causa frigida.

T iiij

℞ radicum fœniculi, petroselini, asparagi ana ℥ j. β. cuscūtæ, foliorum absinthii, eupatorii ana m. β. seminum fœniculi, anisi, ana ℥ β. glycyrrhizæ rasæ ℥ ii j. vuarum passarum enucleatarum ℥ j. iulubarum, sebesten ana numero viij. senæ Alexandrinæ ℥ j. agarici albi & leuis ℥ β. rhabarbari electissimi ℥ ij. zinziberis, salis gemmæ ana ℥ j. coquantur in aqua q. s. ad ℔ j. β. colaturæ adde syrupi Byzantini ℥ ii j. fiat *Porio*.

℞ radicum eringii conditarum ℥ ij. corticum aurantiorum conditorum ℥ j. galangæ conditæ, florum sambuci conditorum ana ℥ β. diarhodonis abbatis, trochiscorum de rhabarbaro ana ℥ ij. syrupi de eupatorio q. s. fiat *Mixtura*: dentur ante cibum dragmę duę aut tres.

℞ diacatholiconis, diaphœniconis ana ℥ ii j. agarici trochiscati, rhabarbari electissimi ana ℥ j. syrupi Byzantini ℥ j. aquarum intubi, cichorei ana ℥ j. β. fiat *Haustus*.

℞ pillularum de rhabarbaro ℥ j. pillularum de agarico ℥ β. diagridii gr. ii j. syrupi Byzantini q. s. fiant *Pillulæ* octo numero.

℞ benedictæ laxatiuę ℥ ii j. rhabarbari ℥ j. syrupi de eupatorio ℥ j. aquarum endiuie ℥ ii j. fiat *Haustus*.

℞ sp. diarhodonis abbatis ℥ ij. trochiscorum de rhabarbaro ℥ β. radicum aristolochiæ rotundæ, asari ana ℥ β. seminis fœniculi, anisi, rhabarbari, cinnamomi ana gr. xij. sacchari albissimi in aqua cuscūtę & eupatorii dissoluti q. s. fiat arte *Electuarium* in tabulis.

℞ trochiscorum de rhabarbaro ℥ ii j. dialaccę, diarhodonis abbatis, dianisi ana ℥ j. β. radicum asari, glycyrrhizę rasæ ana ℥ β. iecoris lupini ℥ ii j. seminum anisi ℥ j. succi fumi terre in trochiscorum formam redacti ℥ ii j. β. syrupi de eupatorio, Byzantini ana q. s. ad electuarii mollis consistentiam, fiat *Mixtura*.

℞ foliorum absinthii m. j. cuscūtæ m. j. β. florum sambuci m. β. rhabarbari electi, radicum asari ana ℥ ij. infundantur in vini generosi ℔ ij. viginti quatuor horarum

rarum spatio, bibat alternis diebus haustum duabus horis sumpto *Electuario*.

℞ trochiscorum de rhabarbaro, de eupatorio ana ʒ iiij. fiat *Pulvis*, detur ʒ j. cum succi endiuie ʒ iiij. oxy- sacchari simplicis ʒ j. aque cuscute, eupatorii ana vn- cia media.

℞ vnguenti martiati, olei spice, absinthii ana ʒ β. spice, cinnamomi electi ana ʒ j. aceti guttas aliquot, ce- ræ parum, fiat *Vnguentum* molle.

℞ florum camomille, meliloti ana m. j. foliorum eu- patorii, absinthii ana m. j. β. radicum cyperi ʒ j. cin- namomi, spice ana ʒ j. cassie lignee ʒ β. cumini ʒ β. furfurum ʒ j. coquantur in sufficiente quantitate vini albi ad tertiae partis consumptionem, fiat iecori *Epithe- ma*.

℞ florum camomillæ, meliloti ana m. j. β. absin- thii, abrotani, eupatorii, cuscute ana m. j. cicetum ru- brorum ʒ j. feminum endiuie, apii ana ʒ β. spice nar- di ʒ ij. β. coquantur in aqua q. s. ad mollitudinem; hinc adde olei amygdalorum amygdalorum amarorum q. s. fiat *Cataplasmata*.

℞ radicum althee ʒ iiij. eupatorii, cuscute, endiuie, fœniculi, maioranæ, fumarie, violarum ana m. iiij. florum camomillæ, meliloti ana m. ij. β. seminum fœnugræci ʒ vj. coquantur nonnihil in aqua q. s. pro balneo. Humo- res crassos vias communes obstruentes, emollit atque eliquat, naturæque obedientes reddit.


℞ emplastri de meliloto ʒ j. β. radicum asari ʒ β. ma- stiches ʒ j. absinthii sicci ʒ j. β. olei sambucini q. s. fiat arte *Ceratum*.

APPENDIX

ad prædicta pro curatione OBSTRUCTIONIS
IECORIS, quæ à materia crassa potissi-
mum fit, inferuens.

Omniùm primò humores obstructiones facientes, naturæ obe-
dientes reddemus medicamentis incidentibus, subtiliantibusque
quos ubi concoctos observabimus, purgante aliquo medicamento
e corpore educemus. Demum utemur medicamentis tollentibus
obstructionem: liberatis autem obstructionibus, intemperiem
emendabimus, viscus roborabimus, putridaque excludemus.
Postremò symptomata gravia si aliqua molestant, placabimus.
Quæ omnia nunc anteaque dictis medicamentis felicissimo cum
successu consequi poterimus, modò uniuersalia particularibus
debita ratione adhibeantur. Debet autem æger præscriptis uti
medicamentis per plures dies propter mali pertinaciam. Diligen-
tem quoque operam dabit æger ut bona fiat digestio tam prima
quàm secunda, in quem finem tenui utemur dieta tam tempore
prandiij quàm cænæ. Illi quoque qui frequenter incurrunt ob-
structionem hepatis, ea quæ lentum crassumque succum generare
possunt, ablegabunt. Si à materia calida crassaque hoc malum
fiat, cum decocto cichorei, endiuie, oxalidis, rhabarbari, syrupo-
que de cichoreo cum rhabarbaro emendetur. Aut R^x radicum
fœniculi, rusci, petroselini, graminis ana ℥ j. endiuie, cichorei,
cuscutæ, capillorū Veneris ana m. j. seminum endiuie, cucumeris,
cicerum rubrorum ana ℥ ss. anethi ℥ j. coquantur in aqua
q. s. ad lb j. ss. colaturæ adde syrupi Byzantini ℥
iij. fiat arte Syrupus.

Metho-



Methodus pro cognitione

DEBILITATIS HEPATIS

INSERVIENS.

HEPATIS DEBILITAS, seu hepatici dicuntur, cum citra manifestum aliquod in viscere malum imbecillitas iecoris accidit ex sola intemperie: Hepatis autem propria principalissimaque facultas seu actio, est vis sanguifica, quod ei ex propria suæ substantiæ obtrigit proprietate, quæ non ex quavis intemperie mox labefactatur: necessum enim est ut illa intemperies, antequam iecoris actionem propriam imminuere poterit, ita altè radices agat, ut ad iecoris substantiam perveniat, eiusque vires & harmoniam dissolvat. A quacumque autem intemperie hoc fiat, iecur proprium suum officium non facit nisi diminutè; excrementa enim tunc funduntur quæ aquam referunt, in qua carnes recentè mactatæ, lotæ sunt. Quamdiu autem hæc actio propria iecoris labefactata non erit, edet corruptas facultates actiones, non imminutas. Non ergo ab omni intemperie propria iecoris actio læditur; cum ab ea solùm fiat, quæ diuturnitate temporis substantiam iecoris, viresque resolvit. Quòd autem per alium reddantur potius quàm per alia loca huiusmodi excrementa, fit propterea quòd natura magna ex parte expellere soleat succum imperfectè transmutatum à iecore ob eius debilitatè per intestina, propterea quòd sit via magis propinqua, quam per urinarios meatus, per quos tamè contingit aliquando huiusmodi superfluitates loturam carnis referentes quoque excludi; vnde nonnullos contingit decipi, qui à calculo semper hoc fieri exclamant. Contingit quoque per alium subinde sincerum quasi excludi sanguinem, & id quidem absque dysenteria, & he-

pate quoque bene constituto; id potissimum fit cum rupta aliqua vena est in inferioribus partibus ipsius iecoris. Contingit rursus per aluum excludi sanguinem magis nigricantem, qui præ se fert aliquando atram bilem, à qua tamen differt, quòd lintea ea tincta rubeant; hoc autem fit dum vena aliqua rupta est in superioribus partibus. Sæpe quoque sanguis per aluum redditur, propterea quòd consueta vacuatio aliqua substiterit, aut propterea quòd mutilatum est aliquod membrum, sed quemadmodum tunc in magna copia subito profunditur, sic subito quoque desinit, suis temporibus recurrens. Aliquando quoque ab hæmorroidibus, nonnumquam quoque à iecoris apostemate, necnon eiusdem ulcere sanguis profunditur per sedem, quæ omnia suis locis dicuntur plenius: nec enim quicquam de iis sanguinis excretionibus hîc agimus, cum propter propriam iecoris actionem læsam non proueniant. Sola itaque ea inter dictas sanguinis excretiones, in quæ ea quæ excernuntur per aluum, aquam referunt, in quæ carnes recenter mactatæ, lotæ sunt, iecur ipsum citra manifestum aliquod in viscere malum in propria essentia læsum esse ostendit.

PARS AFFECTA. Iecur hîc oblæditur, id quod ex proprij muneris læsione constat, per speciem eorum, quæ excernuntur. Contingit equidem hac ratione iecur, ubi malum altius radices egerit, sanguinem probe non elaborare, sed potius crudum aquosumque relinquere, vnde excrementa per aluum loturæ carnum recenter enectarum similia excluduntur. Possumus autem vocare aquosum sanguinem; significat autem alimenta satis fuisse à ventriculo concocta, & etiam aliquamdiu in iecore inchoata, non tamen fuisse absoluta propter eius debilitatem. est autem symptoma perti-nens ad actionem læsam facultatis sanguificæ ipsius iecoris, quæ debilitata est.

SIGNA. A quacumque intemperie fiat hepatis imbecillitas, ita radicata ut spiritum caloremque eius
natum

natum dissipare, & harmoniam, necnon vires & actionem dissolvere possit, perpetuo sanguinem aquosum & semicoctum, similemque aquæ in qua carnes recenter mactatæ, lotæ sunt, reddit absque dolore & copiosè. Semper quoque corporis color maximeque faciei, tristis efficitur; quodam equidem pallore, necnon virore foedatur.

CAUSA. Imbecillitatis ipsius iecoris causa frequenter est frigida eiusdem intemperies, quæ quamdiu levis est, albescit faciei color, parùm færent quæ excernuntur, pauca excrementa redduntur, frigescit corpus atque intumescit; nisi cordis calor resarciat iecoris frigidam intemperiem, urina tenuis est, nulla adest febris, neque sitis, aliàs à calida fit intemperie, quæ quamdiu levis est, graueolentia sunt bileque crassa perfusa, subinde etiam variè colorata quæ excernuntur, urina rufa est, sitis febrisque concurrunt, linguæ videtur scabrities, flauus efflorescit in facie color, totum corpus plus æquo calet, præ cæteris tamen volæ manuum, plantæque pedum. Acres vapores per cutim sæpe deferri sentiuntur. Contingit etiam tandem biliosos humores vomitu expelli, ventrem plerumque astrictum habent, eo quòd validè attrahat calor. Quotiescumque verò humida intemperies substantiam iecoris alterauerit, vix sitit, sed potius oris concurrunt humiditas, alius plurima reddit excrementa aquosa, tenuiaque. Istis contraria in sicca intemperie concurrunt; corpus enim siccius squalidiusque redditur, tandem etiam iecoris vires harmoniaque dissolvitur, facies hinc tristi quodam pallore aut virore foedatur. Quæ deiciuntur primò liquida sunt, ut cremor; tandem præter alia symptomata concurrunt fluxus prædictus hepaticus, in quo cruenta sunt quæ deiciuntur, loturamque referunt carnum recenter enectarum, hæcque excrementa variè tandem mutantur, prout variè intemperatum est ipsum iecur.

PROGNOSTICA. Si antiqua fuerit hepatis debilitas, difficillimè emendatur, temporeque aut in malum

corporis habitum, vnde debilitas totius fit corporis, aut in hydropem vertitur, potissimum si à frigida intemperie ortum habeat. Hinc tempore colliquationes fiunt, primò quidem ipsorum humorum, deinde ipsius etiam carnis, hinc totum corpus consumitur. Frequenter quoque contingit in hac iecoris debilitate sanguinem vltro è naribus profundi, aliquando verò id fit per vterum, interdum verò per hæmorrhoides, nonnunquam etiam per vrinarios meatus.



Methodus pro curatione

DEBILITATIS HEPATIS
INSERVIENS.

*Perficitur autem subsequētibz remēdiorū gē-
neribz.*

VICTVS RATIONE.

A Er conuenit temperatus.
Cibi qui facile concoquuntur, quique modicè calefaciunt, offerantur; carnes caponum, gallinarum, phasianorum, perdicum, pullorum, paruorum auicularum. Inter olera fœniculum, salvia, hyssopus, saturia, intubus conueniunt. Iuscula condiantur caryophyllis, cinnamomo, galanga. Vuæ passæ inter fructus maximè conueniunt.

Potus: tenue atque odoriferum bibat vinum.

Exercitium moderatum otio præferatur.

Somnus fit mediocris.

Animi perturbationibus non moleſtetur.

PRÆPARANTIBVS.

Syr. de eupatorio.

De absinthio.

De endiuia, de cichoreo cum rhabarbaro.

Aqua

Aqua endiuiaë, cichorei, eupatorii, cuscutæ.

Decoctum radicum asari, fœniculi, petroselini, cichorei, endiuiaë, cyperi, ireos, absinthii, origani, menthæ, eupatorii, rosarum, calaminthæ, cuscutæ, hyssopi, seminum cumini, anisi, hordei, calami aromatici, cinnamomi, vuarum passularum, addito melle & aceto.

VACVANTIBVS.

Diaprunum solutium.

Electuarium Indum.

Electuarium de succo rosarum.

Hiera picra.

Tamarindi.

Sena.

Rhabarbarum.

Agaricus, myrobalani.

Si in iecoris corpore, aut venis annexis humores frigidi, aut biliosi, ex frigida calidave iecoris intemperie orti atque corrupti obhæreant, nec à natura expellantur, euacuabimus eosdem medicamentis convenientibus, quibus semper quæ corroborare iecur possunt, addemus.

CORROBORANTIBVS *intemperiemque relictam*
emendantibus.

Diarrhodon abbatis, diamargaritum frigidum.

Dialacca, diacurcuma, cum aqua absinthii, syrupo de eupatorio.

Electuarium diatrion sandalinum.

Trochisci de rhabarbaro, de eupatorio.

Trochisci de absinthio.

Saccharum rosaceum.

Phylonium Romanum.

Rhabarbarum.

Hepar lupi.

Cochlearum carnes.

Syr. absinthii, eupatorii; & aquæ earundem.

Aqua è limacibus destillata.

Aqua hordei, in qua endiuiæ, cichoreum decocta sint.

Cuscuta, vix passæ, pistachia, endiuiæ, intubus.

Absinthium, eupatorium, spica, squinantum.

Cinnamomum, calamus aromaticus, myrrha, unicornu, rasura eboris.

Aqua mellis, mel, terebinthina, virulentum atque putridum abstergunt, prioraque, si quid corrupti est, emendant.

Epithema æstate frigidum actu, hieme verò calidum, ex aqua rosarum, acetosæ: lactucæ, nymphææ, sandalis rubris, diarhodone abbatis, diatrio sandali, camphora.

Fomentationes ex decocto rosarum, acetosæ, camomillæ, absinthij.

Vnguentum ex oleo rosarum, nymphææ, cydoniorum, mastiches, camphora, sandalis albis & rubris, aceto, oleo absinthij. Lana iisdem madefacta, illi loco ubi iecur est situm, imponatur.

Diagalanga, dianisum, diacatamintha.

Diacinnamomum, trochisc. de rhabarbaro, saccharum saluæ, aqua mellis destillata.

Syr. de cichoreo, aqua endiuiæ, cuscutæ, cichorei.

Absinthium, eupatorium, cassia lignea, cinnamomum, acorus conditus.

Hepar lupi, nardus Celtica, squinantum.

Epithema ex decocto caryophyllorum, cinnamomi, iunci odorati, eupatorij, radicum asari, seminum fœniculi, anisi, ameos, quibus addetur diagalanga, diacinnamomum, aqua eupatorij, cuscutæ, acetum.

Vnguentum ex oleo nardino, mastichino, spicæ, absinthij, ligno aloës, mastiche, caryophyllis, cinnamomo, succo eupatorij.

Ceratum stomaticum Galeni, ceratum ex radice asari, ireos, iunco odorato, absinthio, eupatorio, meliloto, thure, mastiche, myrrha, farina seminum lupinorum, fœnugræci, oleo mastichino, rosato, nardino.

Oleum in quo radices enulæ campanæ, gentianæ, cyperi vi-

peti vires deposuerint.

Dialacca, diacurcuma.

Syr. de absinthio.

Hepar lupi, spodium, saccharum rosatum.

Unguentum ex oleo absinthij, nardino, iis incoquantur radices enulæ campanæ, gentianæ, iridis.

Prioribus utemur, dum calida intemperies in causa est, ex iis autem si nonnulla fuerint calidiora iusto, ad temperiem reduci poterunt commodè cum aqua endiuivæ. Sequentibus in frigida intemperie utemur; ultimo verò loco positis, in humida. Nonnulla eorum omni quasi iccoris intemperiei conveniunt.

THEORICA ET EMPIRICA MEDICA-

menta nobilia in DEBILITATE HEPATIS sæpius cum summa salute plurimorum aegrotorum a Gualtero Bruele experta.

CVRATIO DEBILITATIS HEPATIS, ob frigidam causam.

R^x syrupi de absinthio, de eupatorio ana ʒ j. sc. endiuivæ, oxymellis compositi ana ʒ sc. aquarum eupatorij, endiuivæ, centaurei minoris ana ʒ iiij. fiat *Tuleb.*

R^x radicum angelicæ, fœniculi, petroseliniana ʒ j. aristolochiæ rotundæ, gērianæ ana ʒ sc. eupatorij, saluiæ, fumiteriæ ana m. j. sc. absinthij, menthæ ana m. sc. glycyrrhizæ rasæ ʒ v. rhabarbari ʒ ij. senæ Alexandrinæ ʒ j. agarici albi & levis ʒ ij. zinziberis ʒ j. coquantur in aqua q. s. ad lb j. sem. colaturæ adde syrupi de eupatorio ʒ iiij fiat *Potio.*

R^x pillularum de agarico, cochiarum, de rhabarbaro ana ʒ j. cum syrupo de eupatorio q. s. fiant *Pillule octo numero.*

R^x diagalingæ ʒ j. sc. trochiscorum de absinthio ʒ j. seminum endiuivæ ʒ j. sacchari albissimi in aqua indiuivæ

V

dissoluti q. s. fiat *Electuarium* in tabulis.

℞ trochiscorū de rhabarbaro ʒ sem. de absinthio ʒ ij. dialaccæ ʒ j. se. aureæ Alexandrinæ ʒ j. radicū alari, aristolochiæ rotundæ, hepatis lupini ana ʒ j. se. fiat *Electuarium* molle cum syrupo de eupatorio quātum satis.

℞ radicū alari ʒ ij. glycyrrhizæ rasæ, seminum anisi, apij ana ʒ j. vuarum passarum ʒ j. amygdalorum amarorum ʒ vj. trochiscorum de absinthio ʒ ij. syrupi de absinthio q. s. fiat *Conditum*.

℞ aromatici rosati Gabrielis, diagalangæ, diarhodonis abbatis ana ʒ ij. glycyrrhizæ ʒ j. vuarum passarum ʒ j. se. seminis anisi ʒ j. se. iecoris lupini exiccati ʒ ij. se. confervæ florum anthos ʒ j. se. corticū citri conditarum ʒ j. se. syrupi de eupatorio q. s. fiat *Mixtura*.

℞ foliorum eupatorij, absinthij ana m. j. se. spicæ nardi, florum camomillæ ana m. j. se. roris marini. m. j. cinnamomi ʒ j. se. in æqua portione vini & aquæ coquantur, fiat *Fotus*.

℞ olei de absinthio, mastichini ana ʒ sem. nardini, rosarum ana ʒ ij. caryophyllorum, cinnamomi ana ʒ j. sem. succi eupatorij ʒ j. aceti & ceræ parum, fiat *Unguentum*.

℞ florum camomillæ, meliloti ana m. j. sem. seminum lupinorum ʒ sem. foliorum absinthij, eupatorij ana m. j. sem. rosarum rubrarum m. sem. coquantur ad mollitudinem, addendo olei de absinthio q. s. fiat *Cataplasma*.

Si à calida fiat cāusa, ℞ syrupi violarum ʒ ij. acetosi simplicis & compositi ana ʒ j. aquarum endiviæ, cuscute, eupatorij ana ʒ iiij. misceantur, fiat *Iuleb*.

℞ radicū fœniculi, asparagi, petroselini ana ʒ j. foliorū senecionis m. j. se. foliorum cichorei, endiviæ, chamæpytis, cuscute, eupatorij ana m. j. seminum anisi ʒ j. se. glycyrrhizæ ʒ ij. vuarum passarum ʒ j. rhabarbari ʒ ij. se. agarici ʒ j. se. cinnamomi ʒ iiij. coquantur in aqua q. s. ad lb. j. sem. colaturæ adde syrupi de cichoreo cum rhabarbaro ʒ iiij. fiat *Potio*.

℞ hordei

℞ hordei mundati m. iij. endiuia, cichorei, acrimonia m. j. se. lactucæ m. se. seminum endiuia, cucurbitæ, melonum ana 3 se. glycyrrhizæ rasæ 3 v. florum violarum m. j. coquantur in aqua q. s. ad tertiæ partis consumptionem: ad lb j. se. colaturæ addantur syrupi de cichoreo cum rhabarbaro 3 iij. fiat *Potio*.

℞ terebinthinæ Venetæ in aqua endiuia lotæ 3 se. seminum endiuia 3 ij. rhabarbari electi 3 j. rosatæ nouellæ 3 se. sacchari q. s. fiat *Bolus*.

℞ rosatæ nouellæ 3 ij. diarhodonis abbatis sine moscho, diatragacanthi frigidi ana 3 j. se. iecoris lupini 3 ij. sacchari albissimi in aqua endiuia dissoluti ana q. s. fiat *Electuarium* in tabulis.

℞ diarhodonis abbatis 3 ii. trochiscorū de rhabarbaro, seminum endiuie, diatrium sandalorum, diamargaritifrigidi ana 3 i. se. vuarum passarū 3 i. syrupi de cichoreo cum rhabarbaro q. s. fiat *Electuarium* in forma opiati.

℞ iecoris lupini 3 i. sem. radicum cichorei 3 ii. schœnanthi 3 i. cornu cerui 3 se. glycyrrhizæ 3 i. se. rhabarbari 3 ii. se. spicæ gr. xii. fiat *Puluis*, dosis 3 i. cū aqua mellis.

℞ iecoris lupini 3 i. rhabarbari 3 ii. spicæ nardi 3 se. terebinthinæ Venetæ in aqua endiuia lotæ q. s. fiat *Massa*, sumat bolum vnum aut alterum alternis diebus.

℞ rosarum rubrarum, florum camomillæ, cichorei, scariolæ ana m. i. se. summitatum absinthii m. i. sandalorum alborum & rubrorum ana 3 vi. camphoræ 3 ii. se. cichorei, endiuia ana m. i. sem. coquantur in aqua q. s. pro *Fotu*.

℞ olei violarum 3 i. rosacei 3 se. camomelini 3 vi. ceræ & aceti parum. fiat *Vnguentum*.

APPENDIX

ad prædicta pro curatione DEBILITATIS HEPATIS.

Magna ex parte fit ab intemperie eius frigida, vel primario, sæpius etiam secundo, dum scilicet calori immodico succedit, sine attractrix, sine retentrix, sine alteratrix facultas imbe-

V ij

illis tantum euaserit, siue omnes simul, id quod magna ex parte accidit, eò quod cum una fuerit imbecillis facultas naturalis, omnes ferè debilitantur. Hanc itaque intemperiem emendabimus medicamentis quæ modicè corroborare possunt hepar, necnon obstructions aperire, cum obstructio ferè semper concurrat. Si autem hæc intemperies foueatur à multitudine crudorum humorum, eos naturæ obediētes reddemus; hinc purgante medicamento euacuabimus: postremò iecur roborabimus, intemperiemque relictam emendabimus. Quæ omnia nunc anteaquæ dictis medicamentis felicissimo cum successu consequi poterimus. modò uniuersalia particularibus debita ratione adhibeantur. Sicca autem si sit hepatis intemperies, conueniunt balnea, lactis usus. & quæ humiditatem restaurare possunt naturalem, & quæ hecticis prosunt. De debilitate autem hepatis quæ provenit ratione alicuius tumoris, qualis est inflammatio, erysipelas, scirrhus, œdema, aut ratione magnæ exulcerationis, aut denique abscessus, hîc nequaquam agimus, cum propriis locis horum cura tradatur. Syrupus de eupatorio, electuarium diatrium sandalorum in iecoris debilitate sæpius locum habent, eò quod roborent facultatem iecoris retentricem, attractricem, alteratricem & expultricem, quæ omnes ex vnius læsione perturbari solent.



Methodus pro Cognitione

TVMORIS TVM DV- RI TVM LAXI, IPSIVS SPLENIS INSE- uiens.

SPLENIS TVMOR, sæpe ex eius inflammatio-
ne minus rectè curata ortum habet. Contingit au-
tem splenem citò vt iecur indurari, necnon intumes-
cere: quamuis habeat substantiam magis raram quàm
iecur; eius enim alimentum admodum est crassum.
San-

Sanguinis præterea feces seu limum, partemque eius magis terrestrem & impuram excipere debet. Propter raritatem autem substantiæ, contingit splenem eousque aliquando increfcere, necnon intumescere, vt sinistram ventris partem omnino quasi impleat, sicque quasi fistit septum transuersum, ne liberè attolli deprimiue possit dum respirationi inferuit; vnde aliquando quasi grun- nitus in somno eduntur frequentes atque magni, ma- gnâque difficultas spirandi accedit. Hepar quoque citò induratur, propterea quòd multum est compactum eius corpus, venâsque minimas habeat, vnde accidit ea quæ crassiorē nacta sunt substantiam; facile obhærere in e- ius meatibus, sicque indurescere.

PARS AFFECTA, est ipse lien, quod ex dolore cum positu intelligitur, & grauitate.

SIGNA. In loco splenis tumor percipitur ob co- piam materiei, & dolor grauians. Subinde quidem tu- mor latus est, aliàs etiam durus, qui aliquando vniuer- sum hypochondrium implet, parsque materiei aliquan- do in omentum transfunditur; aliàs verò lienis capaci- tate concluditur. Dum se cursu vel labore exercet æger, difficilius spirat; id quod etiam accidit dum in dextrum latus decumbit, magis quàm si in sinistro quiescat, eò quòd non ita suspendatur viscus, neque diaphragma ita à visceris magnitudine premitur. Cibum malè con- coquunt; satis tamen appetunt sic laborantes. Multa fit oris saluatio. flatus multi in corpore generantur qui rugitum fluctuationemque in sinistra corporis parte excitant, ibidemque venter intenditur. Corporis magna segnities concurrit. Insomnia fiunt turbulenta, capitif- que fit grauitas; hinc tumiditas, rerumque contemptus concurrit. Alium adstrictam magna ex parte habent. Cum autem materia mali magis corrumpitur, furereq; quasi in corpore incipit, tunc prædicta omnia grauiora, manifestioraque fiunt, faciei color vitari incipit, totum- que corpus inuadit & vitiat; hinc os malè olet, gingiuae exeduntur, à dentibusque discedunt, intumescit locus

sub inferiori palpebra, eruptio fit sanguinis, sub noctem pedes intumescunt, sanguis è naribus quoque profunditur sæpè, magis prauo colore facies imbitur, macule multæ subnigræ, aliàs etiam vlcerà mala & quæ difficulter sanântur, in manibus tibiisque efflorescunt: præsertim si sanguis per nares non fundatur: tandem somnus admodum fit grauis atque turbulentus, & spiritum maxima cum molestia, & grunntu quodam atque stertore tunc sæpe ducit æger, potissimum prima noctis parte.

CAUSA. magna ex parte ex melancholico humore, qui fex ipsius est sanguinis, hoc malum nascitur, dum in liene magna copia è venis ipsius corporis raptus, ibi diutius subsistit, quod alioqui fit propterea quòd vniuersæ corporis venæ huiusmodi sanguine melancholico abundant. Hoc enim viscus à natura destinatum est, vt illum excipiat: aliàs vberius in liene colligitur quàm par est, eò quòd meatus obstructi sunt, per quos hoc excrementum è liene in ventriculum aut aluum deturbari solet. Tantæque subinde eius coaceruatur copia, vt vniuersum lienem distendat. Cùm itaque eius copia magna in liene colligitur, tumor laxus primum generatur: vbi autem diutius subsistit in viscere, ob debilitatē virtutis expultricis, vel aliam aliquam ob causam, tempore vi caloris crassescit & indurescit, vnde obstructions venarum meatuūque per quos expurgari solebat, oriuntur maiores, temporeque in duritiem abit materia, vnde scirrhus nascitur lienis. Hoc quoque in inflammatione lienis fit, cum medicamenta nimium astringentia, aut nimium quoque dissoluentia adhibentur. Aliquando etiam fit ab aquoso pituitosoque humore, qui aliunde eò deriuatur, vti videre sæpe licet in illis qui longos morbos, frigidos humidosque euaserunt.

PROGNOSTICA. Per initia dum tumor increscit, non ita difficilis est curatio: at si is aliquantulum absoluitur, nunquam quasi medicamentis tollitur. Minus autē periculi est in lienis tumore quàm si iecori inhaereat,

varij

variis tamen eius euentus sunt, aliquibus enim modo minuitur, modò increfcit, qui prædictis moleſtiis etiam perturbantur; aliis verò durus permanet tumor, & id quidem aliquando fit abſque incommodis, permultos etiam annos durans, dum non ita in magnam extuberat molem. Frequenter autem in hydropem, inteſtinarum leuitatem, corporis liquationem, quartanâque febrem tranſire ſolet: quæ malâ medicamentis difficulter ſanantur. Item aliquando hinc phthiſis, cancer, hæmitritæi, ſcabiæſque enaſcuntur.



Methodus pro curatione

TUMORIS SPLENIS
INSERVIENS.

Perſcitur autem ſubſequentibus remediorum generibus.

VICTVS RATIONE.

A Er ſit clarus atque lucidus. Cibus qui aperiendi aliqualem vim habet, & qui facile concoquitur, bonûmque ſanguinem generare poſſit, conuenit; ea verò quæ craſſum ſuccum atque glutinoſum generare poſſunt, vitentur; vti ſunt carnes porcine, leporine, bouine. Tenui quoque vtatur diætâ. Flores autem capparum plurimùm hîc laudantur.

Potus ſit vinum ſubtile, quod aqua in qua ferrum candens ſæpius extinctum ſit, dilui poterit. ab aqua omninò abſtineat.

Exercitium plurimùm prodeſt moderatum, antequam alimenta ſumantur. frictiones quoque, necnon ſudorum prouocationes fiant.

V iiij

Somnus sit mediocris, nequaquam autem admittetur statim post sumptum alimentum.

Alui excrementa respondeant.

Animi pathemata vitentur, cum offendere soleant concoctionem.

PRAEPARANTIBVS.

Syr. de epithymo, fumaria, scolopendria.

Oxymel simplex, compositum, squilliticum,

Syr. acetosus simplex, de calamintha.

Syr. de duabus & quinque radicibus, syr. de pomis.

Aqua intubi, scolopendriae, tamarisci, asplenij.

Decoctum sarsaparillae.

Decoctum corticum & radicum genistae, tamarisci, caparorum, cichorei, endiviae, ebuli, roris marini, seminis agni casti, portulacae, centaurei minoris.

Pluribus diebus utetur tum praesentibus, tum subiectis medicamentis, eo quod difficulter admodum humor iste melancholicus expurgetur.

VACVANTIBVS.

Venae basilicae sectio fiet partitis vicibus sinistri lateris, modo vires ferant, alioqui vena quae ad medium digitum est, vel minimum, secabitur, si tamen antiquum sit malum, a venae sectione abstinebimus, cum inde magis induresceret.

Pillulae aggregatae, aureae, de agarico, de fumaria.

Pillulae de lapide armeno, cyaneo.

Confectio hamech, hiera picta, hiera diacolocynthidos.

Diaphoenicum, diacatholicum, diasena N.

Sena, epithymus, polypodium quercinum, myrobalani Indi.

Clysteres, iis utendum potius si in inferiori visceris parte obstructio constiterit, tumorve haereat.

Subinde aliis atque aliis utendum est medicamentis, ne vni natura assuescat, frequenter enim in hoc morbo repetenda sunt medicamenta purgantia ob mali pernaciam.

MOL-

MOLLIENTIBVS *duritiem tumoris obstru-*
ctionemque tollentibus.

Decoctum farsæparillæ.

Fomentatio ex foliis maluæ, tamarisci, scolopendriæ, aspleni, radicibus capparorum, seminibus lini, fœnugræci, floribus genistæ.

Vnguentum althææ, Agrippæ, de arthanitha.

Vnguentum ex oleo liliorum, capparorum, amygdalorum dulcium, adipe anserino, gallinæ, butyro, medulla cruris vituli, aut cerui, succo cyclaminis, bryoniæ, gummi ammoniaco in aceto dissoluto, præstans admodum est remedium.

Vnguentum ex oleo capparorum, adipe camelorum, multum quoque emolumenti adfert.

Squilla cocta in oleo capparorum, addendo radices liliorum.

Ceratum hyssopi, ceratum ex oleo de lateribus, capparorum, amygdalorum dulcium.

Cataplasma ex foliis ebuli, maluæ, acantho, ficubus pinguibus, rad. liliorum alborum, ebuli, squilla in vino austero & oleo cocta.

Vnguentum ex gummi ammoniaco dissoluto in aceto squillitico, medulla vitulina, ceruina, pinguedine anatis, adipe struthionis, cameli, cera, butyro, aceto.

Emplastrum de meliloto compositum, diachylum simplex, magnum, de mucilaginibus.

Emplastrum ex oleo de lateribus, & gummi ammoniaco, præstantissimum est medicamentum.

CORROBORANTIBVS, *reliquiasque resolu-*
tibus, intemperiemque relictam emen-
dantibus.

Diarhodon abbatis, trochis. de eupatorio, de capparibus, de lacca.

Theriaca, diamuscum dulce & amarum.

Aromaticum rosatum, diacapparum.

Electuarium de baccis lauri.

Decoctum tamarisci, foliorum salicis, florum genistæ, scolopendriæ, radicum capparorum, ebuli, seminum genistæ, endiuæ, rorismarini, epithymi.

Sarsaparillæ 3 j. cum pul. myricæ.

Cappares plurimum valent, scolopendriumque.

Fomentum ex floribus camomillæ, seminibus cumini, rutæ, anisi, foliis pulegii, rutæ, lupulorum, anethi, calaminthæ.

Lapis coctilis aut molaris candens sæpius acerrimo aceto extinguetur, qui adhuc fumans frequenter splenis regioni superponetur lintcolis.

Vnguentum ex oleo capparorum, rutaceo, mastichino.

Emplastrum de fermento.

Emplastrum ex gummi ammoniaco, opopanace, oleo cucumeris asinini, capparorum, aceto.

Cucurbitulæ cum scarificatione venis quæ ad lienem nigricant admouendæ, aut harum loco sanguisugæ, aut earundem venarum sectio fiet.

Cauterium actuale.

Vbi priorum medicamentorum ope durities splenis emollita erit, præsentibus discutientibus utemur aliquamdiu, paulò post rursus ad emollientia transibimus, sicque alternatim hisce utemur medicamentis. Validè autem resoluentia medicamenta hic non admittantur.

THEORICA ET EMPIRICA MEDICAMENTA nobilia in TVMORE SPLENIS sæpius cum summa salute plurimorum egrotorum à Gualtero Bruel experta.

CVRATIO TVMORIS SPLENIS.

R_x syrupi Byzantini, fumaricæ, oxymellis simplicis ana 3 j. de calamintha 3 j. s. aquarum fumaricæ, lupulorum, petroseliniana 3 iiii j. fiat *Haustus*.

R_x ra-

℞ radicū cyclaminis ʒ ss. radicū filicis ʒ j. corticū radicū capparorum, tamarisci ana ʒ iiij. cuscutæ m. j. senæ ʒ iiij. glycyrrhizæ ʒ ss. seminum anisi, fœniculi ana ʒ iiij. coquantur in aqua q. s. ad lb j. ss. colaturæ adde syrupi acetosi compositi ʒ iiij. fiat *Potio*.

℞ corticū radicū capparorum, tamarisci, radicū ebuli ana ʒ j. fumarizæ, cichorei, lupulorum ana m. j. ss. capillorum Veneris, thymi, ceterach ana m. j. epithymi m. ss. glycyrrhizæ rasæ ʒ iiij. seminum anisi ʒ ss. fœniculi ʒ ij. senæ Alexandrinæ, polypodii quercini ana ʒ j ss. agarici albi & levis ʒ iiij. zinziberis ʒ j. florum boraginis, genistæ ana m. j. coquantur in aqua q. s. ad lb j. ss. colaturæ adde syrupi acetosi compositi ʒ iiij. fiat *Potio*.

℞ confectionis hamech ʒ iiij. diasenæ ʒ j. diacatholiconis ʒ j. ss. syrupi de epithymo ʒ j. aquarū scolopendriæ ʒ iiij. fiat *Hauftus*.

℞ pillularū Indarū, fœtidarū, agarici trochiscati ana ʒ j. pillularū de rhabarbaro ʒ ss. de lapide lazuli gr. vj. syrupi de epithymo q. s. fiant *Pillule* sex aut septem numero. sumat bis in mense.

℞ pulueris sancti ʒ j. ss. diacatholiconis ʒ iiij. decocti communis ʒ iiij. fiat *Hauftus*.

℞ trochiscorum de cappare ʒ ss. florum genistæ m. ij. corticū tamarisci ʒ j. infundantur in vini albi lb j. ss. viginti quatuor horarū spatio. Huius colaturæ bibat haustum duabus horis postquam sumpserit electuarium subiectum.

℞ diacurcumæ ʒ ss. dianisi, diacastorei ana ʒ j. ss. theriacæ veteris ʒ ij. fiat *Electuarium* molle.

℞ corticū & radicū capparorum, genistæ, tamarisci ana ʒ j. ss. epithymi, ceterach ana ʒ ij. cinnamomi ʒ ij. conseruæ boraginis ʒ j. aromatici rosati Gabrielis, mithridati ana ʒ j. ss. syrupi de fumaria q. s. fiat *Electuarium* ad opiati consistentiam.

℞ trochiscorum de cappare, trochiscorum de eupatorio ana ʒ ss. corticū radicū tamarisci, sarsaparillæ

ana ʒ ij. radicum rusci ʒ j. rhabarbari electissimi ʒ j. β. sacchari albissimi dissoluti in decocto farsę parillę q. s. fiat *Electuarium* in tabulis, sumat rotulam aliquoties in die.

℞ radicum asari, cyclaminis ana ʒ j. corticum tamarisci, radicum capparorum ana ʒ iij. menthastri, absinthii, origani, centaurei minoris, scolopendrię, fumarizę, mercurialis ana p. j. florum camomillę, meliloti ana m. j. seminum cumini, carui ana ʒ β. seminum lini, fœnugręci ana ʒ j. coquantur in vini & aceti quantitate sufficienti ad mollitudinem, fiat *Fomentatio* lienis cum spongia, aut vesica.

℞ olei lateritii, rutę, capparorum, iuniperi ana ʒ ij. olei camomelini ʒ β. medullę vituli ʒ iij. bryonię, cyclaminis ana ʒ β. gummi ammoniaci in aceto dissoluti ʒ j. β. fiat *Vnguentum* arte.

℞ vnguenti arthanitę maioris ʒ j. β. gummi ammoniaci in aceto dissoluti ʒ β. olei capparorum, liliorum alborum ana q. s. fiat *Vnguentum* molle.

℞ vnguenti Agrippę, arthanitę maioris ana ʒ j. ammoniaci, opopanacis in aceto dissolutorum ana ʒ β. olei cucumeris asinini ʒ β. fiat *Vnguentum* molle, quo ab exordio mali nequaquam vtendum est, sed vbi iam materia mali vnā cum viscere emollita fuerit.

℞ salis communis seminisq; cumini parum torrefacti ana m. j. β. florum meliloti m. j. radicum ebuli ʒ j. seminum rutę ʒ v. misceantur contusa, integulęque siccata, lindeolo rariori intertextentur, fiat *Sacculus* ad splenis formam concinnatus, qui tempore vsus acerrimo aceto, in quo lapidis molaris portio candens extincta sit, irroretur. Duo autem fiant, alternatimq; applicentur: emollit, exiccat & resoluit.

℞ corticum tamarisci ʒ β. radicum liliorum alborum ʒ j. radicum ebuli ʒ j. s. florum camomillę, meliloti, absinthii, rutę ana m. j. seminum lupinorum, lini, fœnugręci ana ʒ s. ficuum pinguium numero octo, coquantur in aqua q. s. ad mollitudinem, hinc pistentur, addatur

tur farinę hordei, fimi caprarum ana ʒ j. gummi ammoniaci, sagapeni ana ʒ ss. olei lateritii, capparorum ana q. s. fiat *Cataplasma*, post forum adhibebitur maximo cum comodo.

R̄ diachyli magni, emplastrum de mucilaginibus, de meliloto composito ana ʒ ss. vnguenti dialthęę, Agrippę ana ʒ iiij. corticum tamarisci ʒ j. seminum rutę ʒ ss. fiat *Emplastrum molle*.

R̄ sagapeni, gummi ammoniaci ana ʒ j. olei l. liorum ʒ ij. radicum ireos ʒ ij. salis gemmę ʒ j. ss. fiat *Emplastrum*, Gummi dissoluantur cum aceto.

APPENDIX

ad prædicta pro curatione TUMORIS SPLENIS
inferuens.

Omniū primò materiam obstruentem, extenuantibus incidentibusque medicamentis naturę obedientem reddemus: primò tamen lenientia alium medicamenta dabimus, ut melius ad splenem vires medicamentorum deduci possint. Pluribus autem diebus præparantibus medicamentis uti debet æger. Hoc cum consecuti fuerimus, purgante medicamento eandem e corpore eduçemus. Hinc quę visceris duritiem, humoresque viscosos atque congelatos emollire possunt, præscribantur, quibus ea quoque permiscebimus quę obstructionem tollere possunt. Demum quę corroborare, reliquiasque consumere valent, admittantur. Quę omnia, nunc anteaquę dictis medicamentis felicissimo cum successu consequi poterimus, modò uniuersalia particularibus debita ratione adhibeamur. Hæmorrhoides autem in hoc malo aperire consultissimum erit, cum plurimum leuāminis afferre soleant. Quiescere quoque in latere sinistro postquàm medicamentum sumpserit æger, debet; magnopere equidem ad curam huius mali necdum confirmati, adiumenti affert.



Methodus pro cognitione

ICTERITIÆ INSE-
VIENS.

ICTERITIA est effusio bilis modò flauæ, modò atræ, subinde vtriusque (quod in puellis sepe accidit) per vniuersum corpus. Contingit autem hunc biliosum humorem per vniuersum corpus diffundi cum sanguine, eo quod excrementorum separatio, aut omnino non, aut non ritè fuerit peracta. id autem ob has causas potissimum fieri solet, aut vitio totius corporis, aut iecoris, aut propter vitium aliquod viarum, per quas expurgari debet; aut denique vitio ipsius excrementi. Contingit autem hunc colorem maximè in oculorum albo & circum tempora efflorescere & apparere.

PARS AFFECTA: In morbo regio non perpetuò eadem pars, idemque locus affectus est. Interdum enim iecur in causa est, cum scilicet calidius est, vel apostemate afficitur; tunc alui vrinq̃ue excrementa plurimum flaua bile colorata erunt; nonnunquam febris concurrit cum dolore obscuro in loco iecoris, variè faciei color mutatur. Sepe quoque folliculus bilis afficitur, tuncque in dextera præcordiorum parte grauitatis sensus percipitur. alba plerumque sunt quæ per aluum excernuntur, vrinq̃ vero biliosissimæ sunt, à febre immunis est. aliàs etiam vniuersi corporis vitio prouenit, tuncque paulatim fit, paucaque ex commemoratis signis aderunt; cutis vero magis fit arida, prurigneque molestat, atque tunc ipsæ solidæ corporis partes nimio calore distemperantur. cit autem symptoma perti- nens ad genus mutatæ qualitatis vniuersi corporis.

SIGNA. Sensu manifestum fit hoc malum; omnium autem maximè oculorum color hominem icteritia labo-


laborare testatur, lutei cuius coloris esse conspicitur, id quod albo solet esse praeditum colore. prostratio fit appetitus, & increfcit fitis, orisque amaritudo propter caliditatem, absque febre tamen est magna ex parte, capitis concurret dolor, membrorumque laxitas, vrina impense crocea est, turbida denique atque crassa, interdum etiam supprimitur, alui excrementa albescunt si meatus folliculi fellis obstruatur, & pauca sunt quae redduntur, quae quoque paulatim & crebro expelluntur. grauitas absque tumore in iecoris loco ferè percipitur, vrina quandoque vsque ad nigredinem ferè rubra crassaque est. Si verò ictcritia ex copia bilis fiat, ab intemperie calida iecoris facta, meatusque ad folliculum fellis pertinentes aperti sint, alui excrementa tunc quidem biliosa erunt, eo quod portio bilis profundatur in aluum, vix febricitat aeger. Ictcritia verò, si lienis vitio fiat, corpus non tam graue est, uti dum à flauabile fit, sinistro tamen hypochondrio grauitas inest: aliquando etiam subdurus tumor, magis fit cogitabundus atque subnigro. Astrictam plerumque aluum habent, & plerumque subnigra sunt alui excrementa, necnon vrinae. Ictericus magnà ex parte pruritu tentatur, vix sudat, tempore longo si durauerit, corpus cum pallore inalbescit tandem.

CAUSA. accidit aliquando propter cholerae multiplicationem, à nimia iecoris intemperie calida; tanta enim aliquando copia bilis sic gignitur, ut à fellis folliculo vix recipi possit, tunc plerumque absque febre, in dextero hypochondrio feruor circa iecoris locum percipitur, alui excrementa bile perfusa videntur; vrinae crassae, crocaeque profunduntur; segnities spirandique difficultas concurret tum potissimum perceptibilis cum mouetur. frequenter quoque accidit, propterea quod iecur aut meatus illi qui à iecore in vesicam fellis, & inde in intestina demittuntur, obstructi sunt; tunc enim excernere per loca conuenientia iecur biliosum humorem non potest; vnde necessum est sanguinem impurum, fieri.

in venasque tunc regurgitat, sanguini que permiscetur, atque inde in totum corpus diffunditur. In dextra hypochondriorum parte grauitas percipitur, aluique excrementa sunt alba. Fit quoque totius aliquando corporis vitio, dum calor singulis insitus partibus, nimium fit acris atque mordax, propter intemperiem partium nimis calidam; tunc equidem humores potius in bilem abeunt in magna etiam aliquando copia, qui tandem sanguini etiam communicantur venis concluso, vnde totum quoque corpus bile sepe perfunditur, auræque quasi tingitur colore, solétque cum pruritu magno per cutem erumpere, mentis sensuumque concurrit hebetudo, corporisque debilitas atque segnities. Subinde etiam in febrium biliosarum indicationibus contingit morbum hunc oriri; eò quod à virtute naturali noxia materia in extremas corporis partes protrudatur, sicque cuti suum imprimit colorem, tuncque vrina aluique excrementa naturaliter se habent, & frequenter homo à febre sic liberatur; subito autem nascitur hoc modo icteritia procreata. frequenter quoque propter iecoris inflammationem hoc malum accidit, quo casu totum quoque corpus biliosis excrementis perfunditur, propter magnum sanguinis incendium; tunc vrinæ quoque & alui excrementa plurimum flaua bile colorata sunt. febris etiam concurrit vehemens, variè faciei color mutatur, sitiunt egri, in iecoris regione sensum grauitatis percipiunt. Venenata denique qualitas sanguinem corrumpendo, hunc morbum efficere potest; id quod indicatur si subito hominis color mutetur, absque concursu febris.

PROGNOSTICA. Icteritia si fuerit diuturna, periculum hydropis minatur; & potissimum si vrina diu etiam fuerit aquosa: tunc equidem obstructio magna à visceris frigiditate prouenit. perniciosissimum autem est morbo regio laborantibus, durum fieri hepar, malum etiam est prostratum esse appetitum, & vigiliis molestari, delirioque affici, sermonemque cum labore formare.

formare. E splenis autem vitio nata icteritia, plerumque magis est diuturna, quàm ea quæ à iecore originem habet. vti icteritia flaua, sic etiam nigra aliquando etiam originem à iecore habet; lien verò flauum icterum numquam facit. Graue est post natam auriginem, febrem sequi: In morbis acutis si superueniat, vti ambiguum est malum, sic satis difficulter discutitur: si tamen in die critico fiat, signis concoctionis appareñibus, nulla duritie in iecore existente, bonum est; facultas enim expultrix superat; si verò ante diem criticum fiat, malum est. Hæmorrhoides verò in morbo fluere, bonum est. Periculo quoque obnoxius est homo, si icteritia confirmata labore, & non curetur, neque materia expellatur; subitò equidem tandem cor aliãve aliqua nobilis pars opprimitur.



Methodus pro curatione

ICTERITIÆ INSE-
VIENS.

Perficitur autem subsequentibus remediorum generibus.

VICTVS RATIONE.

A Er temperatus conuenit. Cibus sit qui humectare refrigerareque modicè humoresque extenuare possit, & qui facile concoqui solet, vt sunt auiculæ montanæ, pulli, gallinæ, pisces petrosi. Admittuntur pruna, poma, cerasa, melones; modicè interim. Condiuntur alimenta cum succo limonum, aurantiorum. Alimenta quæ succum crassum aut melancholicum generare, & quæ astringere choleramque multiplicare possunt, vitentur, vt sunt

X

dulcia, amara, falsa.

Potus. Conuenit vinum dilutum aqua graminis aut petroselinis; ptisana.

Exercitium sit mediocre, balneo vtatur hiemali tempore, atque frictionibus.

Somnus sit moderatus.

Excrementa alui arte aut natura respondeant indies.

Animi perturbationes quæ spiritus inflammare possunt, euitentur; quæ autem oblectare possunt admittantur.

PRAEPARANTIBVS.

Syr. violarum, endiuia, limonum.

Rosarum, acetosæ, granatorum.

De cichoreo cum rhabarbaro.

Aqua acetosæ, cichorei, endiuia, solani, lactucæ, plantaginis.

Syrup. de duabus & quinque radicibus, oxymel simplex.

Syr. de eupatorio, de absinthio, syr. de cichoreo cum rhabarbaro.

Mel rosatum, syr. Byzantinus.

Aqua eupatorii, lupulorum, cuscute, asparagi, fœniculi, cichorei, endiuia, raphani, rusci.

Decoctum radicum angelicæ, gentianæ, rubiæ tinctorum, asparagi, apij, asari, fœniculi, aristolochiæ, fumariæ, adianthi, serpylli, hypericonis, calaminthæ, chamæpityos, acetosæ, roris mari, prasi, endiuia, cichorei, cinnamomi, sacchari.

Quoniam plerumque bili permisceri solent humores pituitosi crassique, aperientia detergentiâque insigniter hîc locum habent, perque interualla iis vtemur; continuè enim absque noxia non feruntur. Prioribus autem solum locus erit, cum solummodo à calidis fieri humoribus augurabimur malum, id quod in purgantium materia etiam obseruabitur: posterioribus, cum frigidi permisti erunt.

VACVANT

VACVANTIBVS.

Electuarium ē psyllio, de succo rosarum, diaprunum solutium.

Diaphœnicum, hiera picra.

Pillulæ aggregatiuæ, de rhabarbaro, de eupatorio.

Manna, cassia, rhabarbarum: eius infusio fiat in aqua endiuivæ.

Diaphœnicum, pillulæ alephanginæ, auræ, hiera simplex.

Agaricustrochiscatus, agarici infusum cum rhabarbaro, cassia, manna.

Vomitum cum elleboro.

Clystere, primò lene vtilissimum est, si adstricta sit alvus: retrahit enim humores ad cutim deuolutos: hinc magis validum paretur, & per intervalla ministretur: fiet autem ex radicibus fœniculi, apij, absinthio, eupatorio, prasio, adiantho, origano, seminibus, anisi, fœniculi, elect. de succo rosarum, cassia fistula.

Venæ sectio fiat ipsius basilicæ in principio mali, si sanguinis copia oneretur ægrotus: alioqui periculum est nē hydrops accersatur. Maximè autem vena prædicta secabitur, si ictcritia ab obstructione fiat meatus, per quem fel in folliculum transmittitur.

Si excrementorum copiam circa aluum primasque venas consistere intelligamus, leuiore aliquo medicamento purgante hæc propellenda erunt antequam offerantur prædicta præparantia medicamenta: aperientium enim vi faciliè humores prauis in venas maiores prauis in venas maiores iecoris rapiuntur, obstructionemque magis generabunt. Copia autem excrementorum circa aluum primasque venas hærentium excisa, humores obstruentes naturæ obdientes reddemus: hinc præsentibus remediis eosdem è corpore deturbabimus, idque per intervalla repetere sæpius debemus.

AVERTENTIBVS.

Clystere.

Errhina.

Sternutatoria medicamenta.

Hæmorrhoides si fluere consueverint, aperiantur.

Mensium fluxus.

CORROBORANTIBVS *intemperiemque in hepate relictam emendantibus.*

Conserua rosarum, violarum, conserua magna nostræ descriptionis.

Syr. de succo limonum, granatorum.

Guaiaci decoctum cum oxymelite.

Succus cuscutæ, radicum raphani.

Radix cyclaminis, rhabarbarum, prasium, fumaria.

**Epithema fiat hepati è rosis rubris, spica, spodio, sanda-
dalis, croco, aqua rosacea, buglossi, intubi, aceto; si cor-
di destinetur, addatur been album & rubrum, lignum
aloës, caryophylli.**

Balneum ex violis, lactuca, endiuia, cichoreo.

**Diacurcuma, dialacca, diacalamintha, diatrium sandali,
diarhodon abbatis.**

**Theriaca, mithridatum, trochisci de eupatorio, de rha-
barbaro, cum aqua decoctionis cicerum.**

**Serum caprinum, lac capræ enutritæ asparago, eupato-
rio, foeniculo, petroselino, apio.**

**Lumbrici exiccati in furno, & sumpti cum vino albo &
faccharo.**

**Decoctum prasij, cicerum rubrorum, asparagi, raphani,
ex vino albo tenui matutinis aliquot horis.**

**Stercus canis ossibus magna ex parte pasti, stercus an-
ferinum.**

CORRIGENTIBVS *accidentia.*

**Scobs eboris infusa in vino aut aqua aliqua aperiente,
vermes terrestres exiccati, cum vino dati.**

Fumariæ radix in vino coquantur, propinerurque.

Potus ex radice cyclaminis, sudor eo excitetur.

**Odor ex aceto acerrimo calido, cuius portionem ali-
quam**

quam balneo infidens naribus attrahat æger, & aliquamdiu nares comprimat.

Errhina ex succo cyclaminis, nigellæ, betæ, anagallidis.

Aqua rosacea instilletur oculis, in mali exordio, minori equidem impetu humores ad oculos deriuabuntur.

Fomentum oculorum cum aqua hordei, succo acetosæ, granatorum, aceto.

Balnea ficca, balneum ex aqua dulci & aceto pro oculis, aut balneum sulfureum, aut ex decocto florum camomillæ, meliloti, calaminthæ, rorismarini, parietariæ, anethi, furfurum.

Sternutamenta prouocantia.

Colorem oculorum flauum hæc emendant, iecorisque duritiem emolliunt.



THEORICA ET EMPIRICA MEDICAMENTA nobilia in ICTERITIA, sæpius cum summa salute plurimorum egrotorum à Gualtero Bruele experta.

CVRATIO ICTERITIAE.

℞ radicum fœniculi, petroseliniana ʒ j. scolopendriæ m. j. se. foliorum maluæ, caulium ana m. j. cuscute m. se. senæ Alexandrinæ, polypodij quereini ana ʒ j. se. epithymi ʒ j. colocynthidis ʒ se. coquantur in aqua q. s. ad ℥ j. se. colaturę addatur diacatholiconis ʒ j. se. olei rutacei ʒ i. camomelini ʒ ii. salis communis ʒ i. fiat *Clystère*.

℞ syrupi Byzantini, oxymellis compositi ana ʒ ii. aquarum endiuivæ, cichorei, alkekengi ana ʒ ii. miscantur, fiat *Iuleb*.

℞ electuarii de psyllio ʒ vi. diacatholiconis ʒ iii. rhabarbari electissimi, agarici trochiscati ana ʒ i. fiat *Bolus*: detur in aurora, aut si æger potius in liquida forma expetat, dissoluatur cum decocto raphani, asari, aristolochiæ rotundæ, eupatorii, cuscute.

X iiij

℞ radicū asari, aristolochiæ rotundæ ana ꝥ se. scæniculi, petroselini ana ꝥ i. seminum anisi, iuniperi, cicerum rubrorum ana ꝥ iii. se. polypodii quercini ꝥ i. se. rhabarbari electissimi ꝥ ii. se. zinziberis, spicę ana ꝥ ii. coquantur in aqua q. s. ad ℥ i. colaturę addatur syrupi de epithymo, Byzantini ana ꝥ i. fiat *Potio*.

℞ radicū petroselini ꝥ ii. prassii, scariole, agrimonix ana m. i. se. seminum asparagi, melonum, anisi ana ꝥ se. foliorum senę ꝥ vi. zinziberis albi ꝥ ii. se. coquantur in sufficienti quantitate aque ad ℥ i. colaturę adde sacchari albissimi ꝥ ii. aceti ꝥ i. fiat *Potio*.

℞ electuarii de succo rosarum ꝥ ii. diacatholiconis ꝥ i. se. diaphoeniconis ꝥ ii. sem. rhabarbari electissimi ꝥ se. spicę gr. v. syrupi de cichoreo cum rhabarbaro ꝥ se. aquarum cichoreo ꝥ iii. fiat *Haustus*.

℞ pillularū de rhabarbaro, hierę simplicis Galeni, pillularum aggregatiuarum ana ꝥ i. diagridii gr. iii. syrupi de absinthio q. s. fiant *Pillule* septem.

℞ rhabarbari electi ꝥ i. aloës ꝥ ii. agarici trochiscati ꝥ ii. se. radicū rubię tinctorum, cyclaminis ana ꝥ i. diagridii gr. xii. syrupi de eupatorio q. s. fiant *Pillule*, detur ꝥ i. post primum somnum.

℞ aquarum endiuie ꝥ vi. in ea maceretur per noctem cinnamomi ꝥ se. rhabarbari electissimi ꝥ i. colatura detur manē cum vncia vna oxymellis compositi. reliquiis addatur rhabarbari recentis dragma alia, cinnamomi gr. xii. & aque endiuie q. s. pro *Haustis*, iterūque omnia macerentur in cineribus calētibz viginti quatuor horis: colatura propinetur vt prius: hoc medicamentum sepius repetat.

℞ radicū asari, raphani ana ꝥ i. se. coquantur in aqua q. s. ad tercię partis consumptionem: huius decocti bonam quantitatem sumat vna vice, additis olei communis vnciis duabus, fiat *Vomitum* medicamentum.

℞ trochiscorum de rhabarbaro ꝥ iii. diarhodonis abbat, diacurcumę ana ꝥ ii. diatriasand. ꝥ i. succi cuscute, prassii ana ꝥ se. syrupi endiuie, de succo acetosę ana q. s. ad

q. s. ad *Electuarij* mollis consistentiam.

℞ florum sambuci m. iij. cuscute m. j. β. eboris vsti 3 j. radicum asari 3 ij. rhabarbari electi 3 j. β. infundantur viginti quatuor horarum spatio in vini electi lb j. β. colaturę addatur sacchari albissimi q. s. fiat *Potus*: huius haustum duabus horis post sumptum electuarius bibat.

℞ trochiscorum de rhabarbaro 3 β. diacurcumę 3 β. vermium terrestrium præparatorum vt decet 3 ij. β. radicum cyclaminis 3 ij. syrupi Byzantini, de eupatorio ana q. s. fiat *Mixtura* mollis consistentię.

℞ diarhodonis abbatis, diacurcumę ana 3 ij. trochiscorum de rhabarbaro 3 j. sacchari albissimi in aqua cuscute q. s. est, dissoluti, fiat *Electuarius* in tabulis. A splene autem si fiat hoc malum, subsequētib; curabitur medicamentis.

℞ radicum fœniculi, petroselinī ana 3 j. radicum cyclaminis, corticum radicum tamarisci, capparorum ana 3 ij. cuscute m. j. β. scolopendrię m. j. farsæparillę 3 ss. radicum rusci, seminum anisi ana 3 j. coquantur in aqua q. s. ad lb j. β. colaturę addantur oxymellis simplicis 3 iiij. fiat *Potio*, detur haustus in balneo.

℞ radicum cyclaminis 3 v. raphani 3 j. radicum aconi, glycyrrhizę rasę ana 3 vj. coquantur in vini albi lb ij. non nihil, post macerationem aliqualem, colaturę adde oxymellis simplicis 3 iiij. fiat *Potio*, dentur 3 iiij. in aurora, seque ad sudandum componat, prius tamen purgetur sequentibus.

℞ diacatholiconis 3 iiij. cassię recentē extractę, manne Calabrinę ana 3 β. cum sero lactis fiat *Haustus*, detur omnium primò.

℞ radicum althęę, enulę campanę ana 3 iiij. hordei mundi m. v. cichorei, fumarizę ana m. ij. β. foliorum acetosę, florum camomillę, meliloti, violarum, buglossę ana m. j. volubilis, centaurei minoris ana m. j. β. coquantur in aqua q. s. aliquantulum: quo cum humorem cuti incumbētem discutere animus est, octo dierum spacio vtetur.

X iiij

ad prædicta pro curatione ICTERITIA
inseruiens.

Magna ex parte hic morbus oritur propter obstructionem meatuum illius vasculi per quem bilis è iecore atque liene ad intestina deriuatur, quæ à crassis humoribus plerumq; initium sumit, unde iecur nonnihil incalescit, copiamque bilis coacervat. Clysterio aluum tunc primò subducemus, eò quòd astrictam aluum plerumque habeant, propterea quòd bilis non descendat, quæ intestina irritare solet. Deinde humores crassos obstructiones facientes, naturæ obediētes reddemus incidentibus, aperientibus, tenuantibusque medicamentis; qui postquàm concocti fuerint, è corpore vacuandi sunt. Deinde viscera roborantibus medicamentis confirmabuntur, meatūsque aperientur. Quæ omnia nunc anteaque dictis medicamentis felicissimo cum successu consequi poterimus, modò uniuersalia particularibus debita ratione applicentur. Si à iecoris inflammatione fiat, ea primùm curetur. Si sit suspicio ne iecur intumescat, emplastro de meliloto addetur ammoniaci nonnihil. Fomentatio fiet cum decocto radicum liliorum, althææ, ficuum, passularum. Unguentum fiat cum oleo amygdalorum dulcium, unguento dialthææ. Si à venenosa aliqua materia fiat, vomitu educatur in mali principio. Clysterio verò id fiat, si ad intestina descenderit. Si in habitum corporis traducta fuerit, theriacæ conuenit cum decocto corticum citri, limonum, endiuie, cardui benedicti, angelicæ, buglossæ, melissæ. Si propter obstructionem vesicæ sellis fiat, tunc maxima duo remedia principatum obtinebunt, venæ sectio & purgatio. Agaricus autem cum rhabarbaro præstans medicamentum hic est. Corporis autem habitum seu cutem detergemus balneo, nec non iis quæ sudorem prouocare possunt; sic equidem ea quæ in habitu corporis latent, euocanda atque discutienda sunt. Faciem & oculos aqua eiusdem balnei lauabit æger, aut cum aqua destillata peponum.

Metho-



Methodus pro cognitione

VERMIVM INSER-
VIENS.

VERMES in variis corporis partibus posse generari experientia comprobatum habemus. In ulceribus enim putridis, in dentibus, in auribus, adde quod in renibus quoque nascantur. In hoc tamen loco de iis tantum agimus vermibus, qui in intestinis generantur, quos lumbricos communiter nominamus. Horum autem alij longi sunt teretesque, qui aliis longè frequentiores existunt, suntque similes quasi vermibus in terra ortis. Alij sunt longi & ad speciem seminum cucurbitæ lati, illud quoque nomen inde servantes, & hi per tota intestina subinde extenduntur; incredibilis enim longitudinis sæpius fuere visi. Sunt admodum exigui si superioribus conferantur, qui Ascarides tenuesque vocantur, suntque vermibus qui in caseo putrefacto nascuntur, persimiles.

PARS AFFECTA. Intestina hîc afficiuntur; in iis enim omnes lumbricorum species, de quibus hîc agimus, gignuntur. Et quidem intestinum rectum ab ascaridibus subtilibusque afficitur. Teretes verò seu rotundi, in gracilibus, necnon in superioribus generantur, vnde in ventriculum aliquando deoluuntur, sæpe quoque per os, aliquando etiam per nares reiiciuntur. Lati verò lumbrici qui reliquis multo sunt longiores ratioreque, per tota quasi intestina extenduntur, tam enim tenuia quàm crassa sua longitudine attingunt. Est autem hîc affectus de quo præsens sermo est, morbus in numero, tota substantia præter naturam.

SIGNA. Ex præsentia tenuium, pruritus satis molestus in ano rectoque intestino generatur, frequentes

irritationes ad alui deiectiones fiunt. Subinde quoque intestinum rectum in hoc malo prolabitur, post solutam quoque aluum minus molestantur, frequentes in stercore excreto quoque cernuntur. Ex præsentia verò teretum seu rotundorum, qui mirabili sæpe serie in intestinorum itineribus implicati hærent, multò graviora accidentia excitantur, per inediam enim sæpe sursum ascendunt, stomachumque moribus admodum acerbis affligunt, & subinde ita acerbos dolores excitant, ut corporis dissolutio, præfocatio, corporisque tremor, aliàs etiam animi defectio subsequatur, magnaque fit angustia & cordis palpitatio, frigidusque concurrit sudor, sæpe quoque nausea, tandem etiam vomitus, singultus, tussisque sicca excitatur, facies multis subito incallescit, rubescitque, diu tamen non perdurat. Hinc contingit nonnullos tempore somni edito clamore expergisci & exurgere, rursusque collabi, adde quòd è lecto interdum exiliant; alij verò dentibus strident, & variè corpus iactant, nocte enim molestiores quàm interdiu esse solent. Pruritus narium plerumque adest etiam vigilantibus tantus, ut scalpere frequentius, dulce sit: nocturno quoque tempore os salivam madescit, venter hydropicorum more sæpe inflatur atque distenditur, idque cum torsione multa. Subinde lyenteria, aut diarrhœa concurrit, pallorque faciei. magna autem ex parte corpus imminuitur, cum scilicet ita frequens est lumbricorum numerus, ut alimentum absumatur ab iis; quo si destituantur, sæpe ad ventriculum ascendunt, & continuis moribus, aliisque symptomatibus dictis ægrum affligunt; magnum sæpe cibi appetitum excitant, aliquando etiam caninam appetentiam: macilenti tamen plerumque sunt qui iis affliguntur. sitiunt multum, febres sæpe excitantur inordinatæ quoque quotidianis similes, horrorem inducentes. uti autem appetitus aliquando admodum intēditur, sic aliàs quoque omninò prostermitur. Verùm hæc omnia accidentia non in omnibus expectare oportet, sed plurima tantum, aut nonnulla

nulla illorum. Latus verò lumbricus cum præsens fuerit in intestinis, ut multa signa communia cum teretibus habet, sic corporis concurrit gracilitas, alimenta multa expetuntur, quæ digesta citò etiam excernuntur; unde sæpe cogitur alimenta nova sumere, alioqui intestinorum rosio fiet. Firmum autem admodum huius latilumbrici in excrementis signum observatur, contingit enim alui excrementis quædam corpuscula permisceri, quæ semini cucurbitæ seu cucumeris assimulantur, estque proprium excrementum huius speciei lumbricorum.

CAUSA communis lumbricorum est putredo seu materia crassa, phlegmatica, viscosa, putredini accommodata, concurrente calore non omnino putrido, qui in materia crassa putridaque existit, & eandem quasi præparat, quique natiui caloris perfusione quasi perficitur, principiumque vitæ vermibus confert. Ab humoribus falsis, amaris, aut acris vermes non generantur, cum ab iis potius interimantur; sed potius ab iis quæ facile putrescunt; ut sunt fructus fugaces, dulcesque.

PROGNOSTICA. Multi nulla lumbricorum, tere-tum præsertim, cura habita, exesi ab ipsis sunt, & conuulsi iuterierunt; & frequenter quidem ita rodunt intestina, ut hominem in mortis periculum præcipitent. Deteriores maiores minoribus, paucis multi, & albis rubri, viuentes mortuis. Versicolores autem lumbrici omnibus aliis sunt deteriores, putredinem enim indicant deteriorem maioremque. Omnium minus periculosi sunt ascarides, tum quia tenues & exigui sunt; tum quia in loco generantur à principibus partibus remotissimo, in intestino nimirum recto. Sæpe alij graues ab iis introducuntur morbi, aliquando enim subitanæ mortem accersunt, nonnunquam syncopen inducunt, subinde verò etiam epilepsiam, aliàs etiam caninam appetentiam, nonnunquam colicum etiam dolorem, aliàs quoque febrem maximè inordinatam

accerfunt, viginti quatuor equidē horarum ſpatio cum maximo frigore ter aut etiam quater affligit. Omnium autem maximè pueros infeſtare ſolent, & illos qui ad pubertatem accedunt. Lumbrici in februm initiis eie-
cti plerumque malum ſignificant, putridæ enim mate-
riei multitudinem perniciemque indicant. idem iudi-
cium ſi in vigore ſymptomaticè expellantur, ſanitatis
autem ſpem promittunt in declinatione, cū critica
comitatur excretio.



Methodus pro curatione

**V E R M I V M I N S E R -
V I E N S .**

*Perficitur autem ſubſequentibus remediorum ge-
neribus.*

V I C T V S R A T I O N E .

A Er ſit temperatus.
Cibus à quo bonus ſuccus elici poſſit, præſcriba-
tur, ſatisq; liberaliter alatur, alioqui punſiones fiunt
intestinatorum, à lumbricis ob inedia; quæ cū fiunt,
dulcia offerantur; iis enim placari ſolent lumbrici. Vi-
tentur caſeus, lac, piſces, omniâque quæ pituitolos
humores generare poſſunt.

Potus: vinum conuenit aquoſum.

Somno pro conſuetudine vtatur; nocturno potiùs
quàm diurno.

Excrementa alui reſpondeant.

Animi perturbationes magnæ vitentur.

P R Æ P A R A N T I B V S .

Syr. de abſinthio.

Syr. de endiuia.

De

De cichoreo cum rhabarbaro.

De acetositate citri.

Aqua graminis, absinthii, portulacæ.

VACVANTIBVS.

Agaricus trochiscatus, agarici infusio in oxymelite multum conuenit.

Hiera diacolocynthidos, hiera picra.

Pill. communes seu pestilenciales sumptæ vmbilicó que admotæ, præstantes sunt admodum.

Pill. ex aloë, myrrha, rhabarbaro, sale gemmæ.

Diaturbith cum rhabarbaro, præstans est medicamentum ad enecandum & ad excludendum vermes.

Diacarthamus vermes enecat, & excludit optimè.

Rhabarbarum.

Aloë, turbith.

Decoctum radicum zedoariæ, angelicæ, graminis, filiginis, corticum & radicum capparorum, boraginis, buglossæ, violarum, seminis sanctonici, diaturbith cum rhabarbaro addito.

Suppositorium ex aloë, semine sanctonici, coriandri, cornu ceruino, myrrha, melle, felléque bouino inungetur.

Hisce medicamentis materia expurganda est, ex qua vermes generantur, quorum nonnulla generatos etiam enecare possunt, nec non è corpore propellere.

NECANTIBVS *vermes.*

Conserua magna nostræ descript. mirificè operatur in hoc malo.

Mithridatum, theriaca Andromachi vermibus enecandis accommodatissima est.

Hiera picra, zedoaria.

Sanctonici semen, corallina, radix graminis, filicis masculæ, acetum, efficacissima sunt ad vermes enecandum omnia.

Centaurea minor generosum quoque est medicamentum cum semine sanctonici.

Aristolochia rotunda, abrotanum vtrumque, absin-

thium omne, gentiana, allium.

Aloë etiam præstantissimum est medicamentum.

Semen lupinorum, portulacæ, citri, folia persicorum, menthastrum, scordium.

Tormentilla, diptamus cum decocto sauinæ, coloquintida, agaricus, cornu ceruinum.

Succus ellebori nigri, plantaginis, absinthii.

Aqua absinthii, rutæ, agrimonix, valerianæ, artemisix.

Syrupus de portulaca, cum semine citri.

Oleum violatum cum euphorbio.

Vnguentum de arthanita maius tam educit quàm enecat vermes.

Vnguentum pro ventriculo, ventræque ex oleo rutaceo, absinthii, menthæ, semine sanctonici, aloë, aceto, felle suillo, lacte, melle aut saccharo.

Emplastrum pro umbilico ex aloë, felle bouino, ouino, suillo, absinthio, zedoaria, tormentilla, theriaca, ol. menthæ, absinthii, persicorum succo, absinthii, pane tosto, in optimoque aceto macerato.

Medicamenta hæc variè ad vsum accommodare possumus, per os equidem ea assumere licet, aut clysterio iniicere possumus, aut exterius umbilico admouere licebit. Si per os offerantur, diutius ieiunet antequàm enecantia medicamenta exhibeantur; interim si nimis torsionibus mordicando vrgeant ob alimenti penuriam, aut si ventriculum ascendere tentent, grata exhibebimus pro tempore alimenta, ne dicta accidant incommoda.

EXPELLENTIBVS enecatos.

Vacuantia prædicta.

Pillulæ Rufi præstantissimæ sunt tam ad enecandum quàm ad educendum vermes.

Theriaca, mithridatum.

Oleum omphacinum in maiori copia potatum.

Clystere ex decocto pulli, hordei, sebesten, saccharo, butyro non salito.

Va.

Unguentum ex oleo rutaceo, absinthii, succo absinthii, rutæ, pul. diptami, tormentillæ, cornu ceruino.

Emplastrum ex foliis abrotani, rutæ, nasturtii, farina lupinorum, foliis prasii, mercurialis, saluæ, absinthii, felle bouino, aloë.

Fomentatio ex iisdem iam dictis rebus.

Suppositorium fiat pro vermibus in recto intestino inhærentibus cum oleo rutaceo, in quo aloës & felis vaccini quantitas soluatur, bombyce excipiatur aut ex melle cum aloës bona quantitate fiat; Suppositorium quoque si fiat cum lardo pingui, anóque si immittatur, & filo suspendatur, feliciter operari solet.

Postquam lumbrici iam enecatæ erunt, ne grauiæ subsequantur incommoda, statim erunt expellendi è corpore; periculum enim est, ne febres putridæ generentur ex malignis vaporibus, aut alia grauiæ symptomata inde efflorescant.

THEORICA ET EMPIRICA MEDICAMENTA nobilia in curatione VERMIVM sæpius cùm summa salute plurimorum ægrotorum à Gualtero Bruel experta.

CURATIO VERMIVM.

℞ syrupi de cichoreo cum rhabarbaro, Byzantini ana ℥ ij. aquarum fœniculi, petroselini ana ℥ v. fiat *Iuleb*; detur tribus aut quatuor vicibus matutinis.

℞ radicum graminis, filiginis ana ℥ j. corticum & radicum capparorum ana ℥ j. β. tormentillæ ℥ ss. florum boraginis, buglossæ, violarum ana m. ss. coquantur in aqua q. s. ad medietatis consumptionem, colaturæ lb j. ss. addatur diaturbith cum rhabarbaro ℥ j. ss. fiat *Potio*.

℞ seminis plantaginis, lumbricorum, zedoariæ, lupinorum, centaurei minoris ana 3 j. aloës, myrrhæ ana 3 β. cornu cerui vsti, rasuræ eboris ana 3 j β. radicum tormentillæ, diptami ana 3 iiij. rasuræ vnicornu 3 ij. fiat *Pulvis*.

℞ cornu ceruini vsti 3 β. rhabarbari electi, seminis endiuie, radicum tormentillæ, diptami ana 3 β. seminis sanctonici gr. x. sacchari albissimi 3 ij. misceantur, fiat *Pulvis*, dosis 3 j.

℞ seminis sanctonici 3 j. β. radicum filicis, tormentillæ, diptami ana 3 β. centaurei minoris m. β. in vino optimo macerentur calentibus cineribus horis sexdecim, sumat 3 iiij. huius colaturæ, addendo 3 j. theriacæ præstantioris, fiat *Haustus*.

℞ catapotiorum pestilentialium Rufi 3 j. theriacæ optimæ 3 β. decocti seminum sanctonici 3 iiij. detur in aurora.

℞ theriacæ præstantissimæ 3 j. scordii, corallinæ ana 3 ij. detur cum decocto seminis sanctonici.

℞ radicum graminis 3 iiij. seminum sanctonici 3 β. centaurei minoris m. j. β. glycyrrhizæ rasæ 3 j. zedoariæ, rhabarbari ana 3 iiij. coquantur in aqua q. s. ad lb j. fiat *Potio*, dentur 3 iiij. addendo dragmam vnam cornu ceruini modicè vsti & sacchari q. s.

℞ radicum diptami, enulæ campanæ ana 3 j. fauinæ 3 j. β. capitum alliorum 3 j. β. coquantur in aqua q. s. ad medietatis consumptionem; colaturæ addatur tantundem lactis vaccini recenter mulcti, farinæ triticeæ tantum vt puls fieri possit medioeris consistentiæ, addendo croci atque sacchari parum.

℞ corallinæ, seminis sanctonici, anisi ana 3 j. piperis, si non febricitet, pulpæ colocynthidos ana 3 j. salis nigri gr. vj. mellis despumati 3 j. aquarum portulacæ 3 vj. detur duabus vicibus, expellit vermes, atque enecat.

℞ seminis sanctonici 3 ij. ponantur in aqua vitæ viginti quatuor horis ad macerandum, colaturæ vncius

ciis duabus adde theriacæ præstantissimæ 3 j.

℞ olei lateritij 3 j. se. aloës 3 iij. se. pulpæ colocyn-
thidos 3 j. fellis taurini 3 j. farinæ lupinorum 3 j. succi
ellebori nigri 3 vj. cum cera q. s. fiat *Unguentum*.

℞ radicū aristolochiæ rotundæ, diptami, enulæ
campanæ ana 3 j. centaurei minoris m. iij. foliorum ab-
sinthij, persicariæ, abrotani ana m. j. se. coquantur in a-
qua q. s. ad mollitudinem, hinc adde aloës 3 j. myrrhæ 3
iij. farinæ seminum portulacæ, sanctonici, lupinorum
ana 3 iij. fellis bouini, olei rutacei, absinthij, ana q. s. fiat
Cataplasma pro ventris regione; antequam autem appo-
natur, dentur 3 j. cornu ceruini cum aqua mellis.

℞ radicū diptami, tormentillæ ana 3 j. filicis 3 sem.
centaurei minoris, abrotani, marrubij ana m. ij. farinæ
lupinorum, fellis bouini ana 3 j. se. olei de absinthio q.
s. fiat *Cataplasma*.

℞ centaurei minoris, seminum lupinorum ana 3 j. se.
nigellæ, aloës, absinthij ana 3 ij. abrotani, cornu ceruini
vsti ana 3 j. corallinæ 3 se. radicū diptami, zedoariæ,
calaminthæ, origani ana 3 ij. sem. myrrhæ, aloës, farinæ
lupinorum ana 3 j. se. succi absinthij, rutæ, fellis taurini
ana 3 se. olei lateritij 3 j. se. ceræ & terebinthinæ q. s. fiat
Emplastrum pro ventre.

℞ radicū diptami, enulæ campanæ ana 3 j. sauinæ
3 j. sem. coquantur in aqua q. s. ad tertiæ partis consum-
ptionem; fiat *Fomentatio* ventris.

℞ rhabarbari, turbith, hieræ pictæ Galeni ana 3 j.
zinziberis, myrrhæ ana 3 se. croci, salis gemmæ ana gr.
vj. succi ellebori nigri domesticati q. s. fiant *Pillule* nu-
mero octo.

℞ diaturbith cum rhabarbaro 3 vj. agarici trochiscati
3 j. theriacæ electæ 3 se. sacchari albisissimi q. s. fiat *Bolus*.

℞ diaturbith cum rhabarbaro 3 iij. aloës, myrrhæ, a-
garici trochiscati ana 3 j. salis gemmæ gr. v. syrupi de ci-
choreo cum rhabarbaro 3 j. aquatum portulacæ 3 iij.
fiat *Hausus*; vermes interficit, pariterque expellit.

℞ lactis caprini aut vaccini vncias duodecim, saccha-

Y


ri rubri ꝓ j. mellis ꝓ se. duo vitella ouorum, fiat Clystere, ministretur aliquandiu postquam ea quæ enecant vermes, administrata fuerint, ad inferiora enim alliciuntur, faciliusque exturbantur.

APPENDIX

ad prædicta pro curatione VERMIUM
inseruiens.

Omniū primò ne generentur in corpore vermes, materia maligna unde generari solent, naturæ obediens reddatur; demùm purgante medicamento è corpore educatur, quod fieri optimè poterit agarico trochiscato, diaturbiih cū rhabarbaro aliisque superius in Methodo curandi dictis. Si autem vermes adesse intelligamus aliquibus signis peculiaribus, quæ eos necare possint, præscribemus medicamenta. Quando autem per os necantia vermes medicamenta proponantur, tunc emplastrum quoque ventri exterius applicabimus, quod idem efficere possit; sic equidē duplici ratione opprimuntur, aut fugā per inferna instituent. Antequam autem medicamentum ullū sumat quod vermes necare possit, bibat per quatuor aut quinque dies lac recenter mulctum, hinc medicamentum vermes necans, in lacte calēte dissoluatur; sicque offeratur; id quoque cum melle fieri poterit aut saccharo. Pueri autem si amara non admittant ultrò, cum fistula incuruata, aut clysterio, iniicere licebit dentibus diductis; utque commodius fiat, cum fasciæ contineantur, postea quæ eosdem enecatos expellere possunt, præscribantur. Vermium quoque generatio inhibebitur, imò geniti enecabuntur atque expellentur, si æger per plures dies utatur rebus acetosis, amaris, acris & salsis. Pro paruis autem vermibus in ano hærentibus clysteriscur cum decocto absinthij persicariæ, hiera picra, oleo amygdalorū amarorū: aut suppositorium ex prædictis fiat, super-spargēdo aloē, inuoluaturque visco cum quo capiuntur aues, eī enim adhærebūt vermes. Sunt autem glandes præstantiores aliis medicamentis ad necandum ascarides. Notandum hic, quod quamuis aliquando in ægotantibus videamus vermes excludi per superiora, aut inferiora non tamen statim curandi rationem instituimus ut medicamentis vermes quoque excludamus, cūm
hoc

hoc sæpe in morbis accidat acutis, in quibus magna putredo latet in intimis penetralibus, eam itaque potiùs materiam malignam, naturæ obediens reddere atque expellere debemus, quàm vermes, alioquin periculum erit ne morbum augeamus, ægrorumque sic occidamus.



Methodus pro cognitione

DYSENTERIÆ INSER-
VIENS.

DYSENTERIA propriè dicta, est fluxus ventris cum intestinorum exulceratione aut exco-
riatione, cui dolor, torsioque semper coniungitur. Contingit autem hinc primò corpora pingua abradi ab acris humoribus, hinc tempore non solummodò pingua corpora, sed etiam fibræ, pelliculæque interioris tuni-
cæ intestinorum cum excrementis deliciuntur, cum sci-
licet altius malū imprimitur ipsis intestinis. Tertiùs ve-
rò gradus erit cum iam sanies profūdatur, atque hi gra-
dus magnitudinem vlcis indicāt. Sordidum autem vl-
cus esse significatur nobis, si sanies multa sine dolore
exeat, quæ si quoque foeteat, putridum indicat vlcus; vti
laudabilis sanies mundum vlcus designat. Contingit au-
tem aliquādo cruorem per aluum excludi absq. dysen-
teria, primo quidē in æcoris imbecillitate, tuncq. aquæ
in qua carnes recēter mactatæ lotæ sūt, simili est id quod
excernitur. Hoc quoque fit in obstructione superiorum
vasorum, tuncque ea quæ deliciuntur, nihil abradi ha-
bent sibi permixtum, solentque aliquando supprimi per
duos aut tres dies, tandēniq. deteriora plerūque supe-
rioribus excrementa protruduntur, solentque sæpe post
tenuem sanguinis saniem tandē humor quidem crassus,
vini fecibus non multum dissimilis, expelli. aliàs etiam
absque vllò intestinorū vlcere, aut superiorū venarum

obstructione, iecorisve imbecillitate, sanguis liquidus atque rutilus profunditur; & hoc quidem in magna quantitate & per intervalla, ex hæmorrhoidibus nimirum internis apertis, necnon mensibus suppressis.

PARS AFFECTA. Intestina in hoc malo laborant, cuius signa sunt dolor cum positu, ea denique quæ excernuntur, intestinorum functionem oblæsam esse testantur. Crassa verò intestina affecta esse ostendit stercus densum, sincerum, aliquibus pinguibus, cruentisque guttis perfusum, spumosum, quod aliquando etiam prodit cum flatu; cruor autem hic stercorei supernatare magis consuevit, quàm dum in tenuibus hæret vlcus intestinis. Si autem circa umbecillum aut etiam altius dolore consistant, stercoreique sanguinis portio omnino permista atque immerfa sit, maleque sint olentia, biliosa, porrique colorem habentia atque variegata, torminaque quàm maxima excitentur, mordacitateque validiores, nec non deliquiũ atque exolutiones animi inducāt, in tenuioribus intestinis malum est; tunc quoque pingua rariùs excludi cum excrementis solent. Ieiunum autem intestinũ dum afficitur, dolor supra umbilicum est: tanta quoque nausea oritur, vt etiam vomitus subsequatur frequenter, maior quoque sitis cibi que fastidium excitatur, excrementa magis cruda sunt, quibus sanguis magis nigricans vndique permiscetur; mala hic plerumque febris oritur, vnde graues virium exolutiones accidunt, tandemque etiam mors. Est autem dysenteria morbus in soluta continuitate consistens.

SIGNA. Magna ex parte in principio mali propelluntur excrementa muccosa, mordacia, biliosa, variæque, quibus tandem etiam cruoris aliqua portio vnà cum doloribus intestinorum mordacibus permiscetur, & excernitur paulatim cum stercore liquido, pauloque post etiam adeps & hinc successu temporis ramenta, particulæque interioris tunicae intestinorum, vnà cum excrementis cruentis, purulentisve per aluum deiciuntur, præcedentibus quasi semper mordacibus intestinorum do-

rum doloribus. unde frequentes quoque concurrunt desiderandi cupiditates, anique dolores, ita ut æger etiam aliquando quiete careat, & à somno etiam interpelletur; frequentur quoque sitiunt, febricitantque ægrotautes, potissimum si in superioribus intestinis vlcus existat, & humor sit acer admodum, quo tempore etiam cruor ipse excrementis magis permiscetur, quam dum in crassioribus exulceratio hæret.

CAUSA. Humores acres mordacesque putrefacti; in intestinis geniti, aut aliunde, è venis nimirum maioribus è iecore, liene, mesenterio, aliisque partibus circumstantibus, influentes, anfractibusque intestinorum inhaerentes, frequenter dysenteriam excitant, quales sunt, pituita falsa, bilis flava, unde frequentius quidem excitatur, nec non adusta atque atra, qui originem habent frequenter à cruditatibus frequentibus, ab acris denique vitiosisque cibis, à fructibus quoque malis, à pharmacis denique venenatis excoriantibusque, ab intenso denique frigore caloreve. Subinde quoque inflammatione fit dysenteria; id autem innotescit ex signis inflammationem significantibus.

PROGNOSTICA. Periculum haud parum ostendunt appetitus magna prostratio, sitis incrementum, continuus alui fluxus, si urina poculis non respondeat, si corpore macilento subito nigra aluus profluat; si carunculæ magnæque intestinorum partes excernantur, ipseque æger inualidus sit, lethalis esse consuevit dysenteria, eo quod neque caro concreescere, neque vlcus obduci cicatrice potest. In longis dysenteris cibi fastidium malum, & peius si febris adsit; neque enim semper febricitat dysentericus. Pessimæ sunt dysenteriae, in quibus quæ excernuntur porri aspectum habent, & quæ sunt nigra graueolentiaque. Lienosis superueniens dysenteria, bonum est, cum sic humores melancholici qui in liene erant, euacuentur. Difficile quoque curatur dysenteria in tenuibus intestinis existens, facilius verò quæ in crassioribus. Ab atra bile si fiat, difficillimè

sanatur dysenteria, quia cancro coniungitur plerumque. Quævis autem tormina, longa & difficilia esse consueverunt: quæ si à profundo veterique ulcere dependeant, viriûmque imbecillitas concurret magna, vix quicquam sperare licebit: contingit autem in huiusmodi casu, excrementa alui gravissimè olere, cruda leuiâque esse & subnigri etiam coloris. Magno cum periculo in lenteriam dysenteria mutatur. Multoties colica vehemens succedit fluxui, eò quòd expellatur tenue, & relinquatur crassum. Omnis fluxus ventris qui ducit ad hydropem, est mortalis, cum hydrops curari debeat per fluxum ventris.



Methodus pro curatione

**DYSENTERIÆ INSER-
VIENS.**

*Perficitur autem subsequen-
tibus remedium
generibus.*

VICTVS RATIONE.

A Er sit temperatus.
Cibus qui facile concoquitur, & qui bonum sanguinem generare possit, offeratur: imbecillis enim est coctrix retentrixque facultas. Conueniunt carnes pullorum, gallinarum, caponum, perdicum, turturum, merularum, phasianorum, ova asfata. Oryza, amylo, panico crustâque panis fiat puls, & lacte, cui semina plantaginis, parûmque cinnamomi addetur. Prædicta quoque carnum iusculis coqui poterunt, ut puls inde fiat. Vitentur diligenter mordacia, acetosa, salsaque, propter vlcus in intestinis existens.

Potus

Potus. Vinum conuenit rubellum astringendi vim habens; cui saccharum rosatum addetur.

Exercitium motusque vitentur, quiesque imperetur.

Somnus conciliandus est; plurimum enim dysentericos iuuat; vigiliæque malum irritant.

Animi perturbationes immodicæ ablegentur.

PRÆPARANTIBVS.

Syr. rosatus.

Violarum.

Intubi.

Endiuia.

Cydoniorum.

Aqua plantaginis, buglossæ, absinthii.

Vbi aliquali euacuatione vti fuerimus in principio, tunc demum præsentibus materiam digerere, naturæque obedientem reddere poterimus; præsertim vbi periculum nullum imminebit, & si excrementa non ita copiose excernantur.

VACVANTIBVS *materiam redundantem, obstructionemque facientem.*

Myrobalani citrini, kebuli.

Tamarindi.

Rhabarbarum.

Agaricus, cum pituitosa sunt quæ deiciuntur.

Diacatholicum.

Syr. rosatus, violatus.

Clystere.

Acres, biliosos, prauosque humores qui ad partem affectam ruunt, educere debemus medicamentis quæ aliquantulum laxant; & per fluxum fluxui implicemus, iis addere debemus quæ aliquali virtute astringendi prædita sunt, etiam non præcedente digestionem; via equidem ipsis humoribus malignis sic aperitur, ut redundantes euacuentur, obstructionesque tollantur. sæpius autem repetenda erit euacuatio, eo quod noua continuo suggeratur vitiosa materia. Quare astringentibus

in initio locus non erit, id enim frequenter magno ægrotorum fit detrimento; febris equidem, necnon inflammatio, vlceraque intestinorum, necnon spasmi hinc excitantur, eò quòd materia maligna in superiores partes regurgitet, cum prohibetur euacuari. Clysteri autem melius quàm potione educetur materia quæ intestina exulcerat atque vellicat, modò in crassis intestinis hæreat; vti contrà, potione, dum in tenuibus exulcerationem molitur. Scammoniata autem acriaque omnia medicamenta vitanda quàm maximè hîc sunt, vt est electrosatum, diaprunum solutium.

AVERTENTIBVS.

Venæ sectionem instituemus ipsius humerariæ in principio mali, antequàm vlcus aliquod præsens fuerit, modò vires validæ sint, & potissimum si dolor adfirmus, aut magna inflammatio, aut si consueta aliqua vacuatio suppressa fuerit, hæmorrhoidum nimirum mensiumve; reuellit enim sanguinis impetum, eiusque acrimoniam remittit. Hoc quoque fiet, si ex subita alui suppressione æger laboret, periculum enim est ne viscus aliquod nobile obruat excrementa vitata, excernique solita; vlcere autem presente nequaquam fiet venæ sectio, neque enim vlcus curat; adde etiam quòd vires deiciat.

Vomitorium leue, vt est aqua tepida.

Vrinam ducentia.

Frictiones brachiorum, spatularum.

Ligationes dolorificæ partium prædictarum.

Lotiones pedum manuumque in vino astringente.

Balneum siccum sudorem promouens, quod lateribus calentibus, pannisque inuolutis fiet, vino autem conspergentur, pedibusque accommodabuntur.

SISTENTIBVS *fluorem & corroborantibus* *ventriculum & intestina.*

Trochisci de terra sigillata cum succo bursæ pastoris,
trochisci de spodio Mesuæ cum semine oxalidis.

Elect.

Elect. diatrium sandalorum, diarhodonis abbatis. syr. cydoniorum, de rosis siccis, violarum, papauerinus, myrtilorum.

Saccharum rosatum, conserua rosarum, cydoniorum, aqua rosacea aut plantaginis, in qua mastis prius decoquetur; hinc addatur saccharum rosatum.

Arthanasia, phylonium Persicum cum succo plantaginis, diacodium Actuarii cum aqua caelesti, in qua spodium ferbuerit.

Succus ribes, berberorum, mespilorum, cydoniorum, prunorum siluestrium.

Cornu cerui vstum elotumque, si virulentæ materiei suspicio adsit: coagulum hædi, leporis, hepar lapi.

Lac & aqua commisceantur. chartam albam in lacte dissoluunt nonnulli; hinc cum farina fabarum contundunt peroptime, additoque saccharo & cinnamomi aliqua portione, puliculam conficiunt.

Vuæ passæ enucleatæ tritæ cum melle saccharo spodioque. rhabarbarum est saluberrimum hîc medicamentum pistatæ, cubebæ, hepatica.

Potus ex aqua in qua saluia, balauſtia, sumach, consolidamajor, radix symphyti, rosæ, plantago, necnon mastix decoquantur.

Fomentum ex aqua in qua decoquantur radices plantaginis, rosæ, sandali, intubus, spodium.

Vnguentum ex oleo cydoniorum, rosaceo.

Vnguentum ex oleo cydoniorum, carabe, mastiche, puluere rosarum, bolo Armeno, corallis, sanguine draconis, pro ventre.

Cataplasma ex pane cocto, mastiche, oleo cydoniorum, rosarum, vino austero; pro stomacho.

Emplastrum diaphœniconis in frigida causa est efficacissimum ad dysenteriam hepaticam.

Cum bona ex parte vitiosa materia vacuata erit, hisce utemur medicamentis astringentibus; nequaquam autem à principio, cum tunc febrem, pleuritidem, peripneumoniam, intestinorum inflammationem, ipas-

mum, aliâque grauiora symptomata generare possit materia maligna; periculum enim est ne in superiores partes regurgitet materia feruida ante tempus suppressa. Vtemur autem primò iis quæ leuius astringunt; hinc à leuioribus ad fortiora progrediemur: hisce interim semper addemus quæ hepar ventriculûmque corroborare possunt.

MUNDIFICANTIBVS & glutinantibus.

Potus ex aqua hordei ad ptisanę formam compositus, multo saccharo rosato addito.

Clystere ex aqua hordei, saccharo, vitellis ouorum, aut ex vino rubro astringente, sero lactis caprini, hydromelite, melle rosato, aut ex decocto furfurum, frumenti, ciceribus rubris, ligno guaiaco, rosis, plantagine, lupinis.

Clystere ex decocto rosarum, plantaginis, lupinorum, boli Armeni, sanguinis draconis, gummi Arabici, thuris, myrtilorum, polygonii, bursę pastoris, hordei torrefacti, tutiæ, lithargyri, trochis, de terra Lemnia, aqua chalybeata. olea omitemus, quia consolidationem impediunt.

Mundificantibus, abluentibusque acrem materiam exulcerantem, primo loco positis, vtemur, si multum puris excerni ab vlcere videamus, & profundum esse vlcus intelligamus: quod vbi optimè mundatum erit, secundo loco positis consolidantibus medicamentis locus erit. Singularissima autem sunt clysteria in hoc morbo medicamenta.

CORRIGENTIBVS accidentia.

Clystere ex decocto rosarum, oleo rosato, mucilagine seminis psyllii plurimum valet. Vel ex solo lacte ouino, vel vaccino, in quo lapis ignitus aliquoties extinctus sit, & rosę sint decoctę, additis vitellis ouorum, vt diutius adhæreat.

Micleta N. Triphera magna, athanasia, phylonium Romanum, pillulę de cynoglossa.

Syr. de papauere, saccharum rosatum.

Deco-

Decoctum seminum papaveris in aqua rosata.

Clystere ex lacte ouino, gummi tragacanthæ, adipe caprino, butyro, oleo rosaceo, pillulis de cynoglossa.

Dolorem qui aliquando crudelissimus est in hoc morbo; sedant priora; posteriora autem etiam somnum conciliant, & materiam ineptiorem ad fluendum reddunt.

THEORICA ET EMPIRICA MEDICAMENTA nobilia in DYSENTERIÆ sæpius cum summa salute plurimorum egrotorum à Gualtero Bruel experta.

CURATIO DYSENTERIÆ.

℞ hordei mundi m. iiii. coquantur in aqua q. s. ad ℥ j. colaturę adde sacchari rubri ℥ j. ꝑ. s. duo vitella ouorum; fiat *Clystere*, quod sæpius iniicietur ad lauandum intestina ab acribus excrementis subsistentibus.

℞ iuris decocti plantaginis, rosarum, hordei aliquantulum cum corticibus torrefacti ℥ j. mellis rosacei, sacchari rubei ana ℥ j. olei rosacei ℥ j. ꝑ. s. vitella ouorum duo; fiat *Clystere*, iniiciatur ante cibum; mundificat atque detergit. Cum vrina humana quoque, & aqua mellis in eundem finem *Clystere* parabitur; præsertim si vlcus adsit.

℞ iuris decocti hordei ℥ j. mucilaginis psyllii cum aqua rosacea extracta ℥ ij. adipis caprini ℥ j. ꝑ. s. mellis rosacei ℥ j. phylonii Persi ℥ j. ꝑ. s. olei rosacei ℥ ij. fiat *Clystere* dolorem leniens. Aut

℞ radicum & foliorum althææ, anethi ana m. j. ꝑ. s. foliorum maluæ, florum camomille, meliloti, rosarum ana m. j. seminum cydoniorum ℥ ꝑ. s. seminum lini, fœnugreci ana ℥ j. coquantur in aqua q. s. ad ℥ ꝑ. s. colaturę adde

olei rosacei 3 viij. fiat *Clystere*:dolorem feliciter remittit ab acrimonia humorum ortum.

℞ foliorum absinthii, parietariæ, centaurei minoris, betæ ana m. ss. rosarum rubrarum m. j. seminum lupinorum, cicerum rubrorum ana 3 iiij. furfurum, hordei ana m. j. ss. coquantur in sero lactis ad tb j. colaturæ addantur mellis rosacei 3 iiij. fiat *Clystere* deterforium.

℞ hordei excorticati, plantaginis, polygonii, bursæ pastoris ana m. j. coquantur in aqua q. s. ad tb j. colaturæ addatur boli Armeni, sanguinis draconis, thuris, mastiches ana 3 j. succi plantaginis 3 j. gummi Arabici, tragacanthi ana 3 iiij. oui vitellum, fiat *Clystere*, hic minor quantitas iniicitur, vt diutius retineatur, idque semper cum astringere consolidareque volumus, maior autem erit, cum detergere decreuerimus.

℞ rhabarbari optimi parum tosti 3 j. ss. corticum myrobalanorum citrinorum 3 iiij. paululum macerentur in vino rubro, radicum plantaginis 3 j. glycyrrhizæ rasæ 3 ss. coquantur in aqua q. l. ad vncias decem, colaturæ adde mellis despumati 3 ss. fiat *Potis* duorum haustum.

℞ rhabarbari leuiter torrefacti 3 iiij. cornu ceruini cremati & eloti in aqua plantaginis, cinnamomi ana 3 j. aquarum endiuivæ 3 iiij. fiat *Haustus*.

℞ corticum myrobalanorum citrinorum 3 iiij. kebulorum 3 ij. contendantur, addatur passularum mundatarum 3 j. spice 3 ss. bulliant simul in aqua plantaginis q. s. ad 3 iiij. exprimantur fortiter, addantur rhabarbari electi 3 ij. ss. sacchari parum, fiat *Haustus*.

℞ rhabarbari, myrobalanorum citrinorum ana 3 j. ss. kebulorum 3 j. tempore vsus detur 3 j. cum syrapi rosati 3 ss. aquarum plantaginis, bursæ pastoris ana 3 j. ss. fiat *Haustus*.

℞ rosarum rubrarum m. ij. violarum m. j. seminum plantaginis, cydoniorum ana 3 iiij. coquantur in aqua q. s. ad tb j. colaturæ adde syrapi cydoniorum 3 iiij. fiat

fiat *Potio*. Si consolidare vlcus etiam quis velit, adde-
mus prædictis thuris 3 ij. boli Armeni 3 j. terre sigilla-
tæ 3 ss.

℞ syrupi myrtilorum, rosarum, cydoniorum ana 3 j.
ß: vini rubri stiptici vncias decem, fiat *Tuleb*.

℞ syrupi cydoniorum, de rosis siccis ana 3 ij. ß. deco-
cti prædicti 3 iiij. detur duabus vicibus.

℞ syrupi rosati, rob berberorum, miuæ cydoniorum
ana 3 j. boli Armeni, terræ sigillatæ, sanguinis draconis,
cornu cerui vsti ana 3 ß. conferuæ rosarum antiquarum
q. s. fiat *Conditum*, capiat sæpe.

℞ cornu cerui vsti, boli Armeni, trochiscorum de
spodio, sanguinis draconis ana 3 j. concharum vsta-
rum 3 ij. seminis plantaginis 3 ss. gummi tragacanthi
3 j. coralli rubri 3 j. radicum tormentillæ 3 ij. myr-
rhæ 3 j. ss. fiat *Puluis*, dosis 3 j. cum aqua plantagi-
nis.

℞ seminum plantaginis 3 ij. cinnamomi 3 ij. contu-
sa dentur in papyro pro *Pulicula*.

℞ conferuæ rosarum antiquarum 3 j. cornu cerui vsti
& loti in aqua plantaginis 3 j. specierum diatriosandali,
trochiscorum de carabe ana 3 ß. miuæ cydoniorum 3
vj. syrupi rosati de rosis siccis q. s. fiat *Conditum*. Deco-
ctum hordei cum melle rosato dari per os poterit dum
abstergere volumus.

℞ aque plantaginis, cichorei, acetosæ, rosarum ana 3
ij. sacchari rosati tabellati 3 vj. specierum diarhodonis
abbatis sine moscho, diatrium sandalorum ana 3 ß. ca-
ryophyllorum, macis ana 3 ß. rob de berberis 3 j. ß. sac-
chari albissimi 3 ij. traiciatur per saccum hypocrati-
cum, fiat *Nectar*.

℞ diacydonites sine speciebus 3 j. ß. gummi traga-
canthi 3 ij. trochiscorum de spodio, de terra Lemnia a-
na 3 j. ss. seminum oxalidis, plantaginis, antheræ a-
na 3 j. balaustiorum, malicorii, ana 3 ij. cornu cer-
ui vsti, corallorum rubrorum, amyli ana 3 ij. ss. syru-
pi myrtini, cydoniorum ana q. s. fiat *Electuarium*.

mollis consistentiæ.

℞ radicū althææ, verbasci ana ℥ β. florum rosarum, camomillæ ana m. j. seminum myrtilorum, granorum sumach, plantaginis ana 3 ij. malicorii, balaustiorum ana 3 j. ss. mediocriter comminuantur, & coquantur in vino rubro astringente nonnihil, fiat ventris *Fomentatio*.

℞ olei cydoniorum, myrtilorum, rosarum, anethi ana ℥ j. trochiscorum de spodio 3 j. β. boli Armeni, seminum myrtilorum ana 3 j. mastiches 3 β. ceræ parum, fiat *Unguentum* molle, quo paulò post principium vitemur ubi natura aliquàliter expurgata fuerit, à principio enim virulentam materiam intro cohiberet. Idem de aliis iudicandum medicamentis astringentibus.


℞ emplastri diaphœnici ℥ j. rosarum rubrarum, balaustiorum, sanguinis draconis ana 3 j. farinæ hordei, fœnugræci ana 3 j. ss. seminum plantaginis, myrtilorum ana 3 iij. boli Armeni, mastiches ana 3 ij. olei mastichini, myrtini, rosacei ana 3 ss. ceræ & resinæ q. s. fiat *Emplastrum*.

APPENDIX

ad prædicta pro curatione DYSENTERIÆ
inferuiens.

A principio fluxus inhibendus non est. sed omnium primò, etiam ante corporis purgationem, clysterio ipsa intestina lauanda sunt; debet autem hoc clystere sæpius repeti. Si coniecturæ consequi liceat materiam esse crassam viscidamque, aut acrem, ita ut ulcus excitare possit, clysterio prædicto permiscenda erunt medicamenta quæ abstergendi, acriūque humorum vim, unde ulcus fieri posset, remittendi vires habent. Dictis quoque adii-
cientur ea quæ dolorem lenire possunt, si multum doleat æger ob
usum abstergentium medicamentorum. Demum clysteria astringentia, & quæ sistere possunt fluxum dysentericum, imperabi-
mus;

mus; quibus tandem etiam addemus quæ consolidare, cicatricemque inducere, nec non corroborare valent viscera. Debent autem diutius retinere huiusmodi clysteres sistentes, consolidantesque. Purgantibus quoque medicamentis interea temporis per os sumptis vacuanda erit materia prædicta, sistendisque interim etiam aliqua ratione fluxus. Diuersionum quoque instrumentis remora inuit ipsum fluxum. Potius autem potionibus utemur si in superioribus intestinis hæreat ulcus, & primò quidem lenientibus dolorem, ardorem, inflammationemque. Secundò detergentibus ulcus à materia acri. Tertiò astringentibus, quibus permiscebimus quæ consolidare possunt, carnemque generare. In inferioribus autem intestinis si sit ulcus, clysteribus potius utemur. Quæ omnia nunc anteaque dictis medicamentis felicissimo cum successu consequi poterimus, modò uniuersalia particularibus debita ratione accommodentur. Ad hepatis intemperie calida si humores acres dysenteriam excitantes generentur, hanc intemperiem dicti visceris mitigabimus oleo rosato, cerato sandalino, similibusque medicamentis aliis.



Methodus pro cognitione

COLICÆ ATQVE ILIACÆ PASSIONIS INSERVIENS.

COLICVS AFFECTVS, passio est diuturna intestini quod colon dicitur, quam sequitur difficilis exitus stercoris, flatuumque per inferiora, dolorque per interualla admodum seuus, puncturaque multum grauantur, excitantur, eò quòd intestinum prædictum crassum est & neruosum, vnde non facile si quid noxii eius tunicis se in sinuet, expellitur. A parte autem affecta, colo nimirum intestino, appellationem sumpsit; in quo intestino flatus cumulari solent; est enim proprium eorundem quasi receptaculum. Affinitatem magnam ha-

bet hoc malum cum iliaca passione; tam enim colica laborantes quàm iliaca oppressi, acutissimis doloribus torquentur, aluum astrictam habent, vomitu denique molestantur; in iliaca tamen dolor magis est intensus, eò quòd tenue intestinum, in quo hoc malum latet, magis sentiat ipso colo intestino: magis hìc quoque vomitus molestus est sua frequentia, ventriculus omninò subvertitur, aliquando etiam syncope, aliàs quoq; delirium concurrit in hoc malo, sæpiùsque frigidi sudores mouètur. dolor quoque hic ab umbilici regione magis sursum vagatur, èstque magis fixus. In lateribus verò iuxta eam partem ventriculi, vbi colon eundem præterlabitur, colicus dolor potius vrget.

PARS AFFECTA est intestinum laxius quod colon dicitur. Signa autem partis affectæ ex sequentibus patebunt; permixta enim sunt cum signis ipsius affectus.

SIGNA affectus, dolor vehementissimus, sæpèque terebro perforanti similis excitatur in intima abdominis parte vbi colon situm est, & magna ex parte est instabilis, circuire enim videtur, & modò in hac, modò in illa parte validius vrget; nunc enim hepatis regionem subire videtur, nunc splenis, nunc ventriculi, & frequenter quoque renum perambulat loca, sæpiùsque in sinistro inguine plus vrget, eo quòd colon ibidem magis sit angustum. Dicta quoque ratione à nephriticis doloribus, qui magis sunt frequentes colicis cruciatibus, discernitur: cùm hi dolores eodem quasi loco, in dextro nimirum aut sinistro latere iuxta renis situm, permanentes, ægrotum iugiter affligant. Lenientibus quoque clysteribus atque fomentationibus mitigantur dolores colici magis quàm nephritici. Urina in doloribus nephriticis sæpè fit aquosa, pauca quoque redditur, quæ aliquando etiam supprimitur: tandem verò maiori redditur copia, quæ aliquando etiam crassa est dum profunditur. Dolores colici magnam sæpè ventris partem occupant, nisi à vitrea fiant pituita; tunc enim quasi

quasi stabiles sunt; magis quoque dolores colici dextram perturbant partem, unde in sinistram quoque diffunduntur, & iuxta renes dorsumque vestigia etiam aliqua imprimunt. Certius etiam colici doloris indicium est, si dolor altiori loco percipiatur quam renum regio est posita. Concurrit flatuum multitudo in colico malo. Ita quoque astrictam aluum habent saepe, ut nihil ferè excludatur, etiam ne ventus quidem; & si aliquid excludatur, id flatibus prodire multis, & aquae supernatare consuevit. In nephritide verò frequenter arenosa quaedam corpuscula, subinde quoque lapis, & nonnunquam sanguinolenta subsidere inveniuntur, lapide verò excluso à dolore laborantur, nihilque dictorum cum urina excernitur in colico dolore, sed aliquando humor crassus & pituitosus. Vomitus aliquando, sed magis frequenter nausea moueatur in doloribus colicis, magisque haec molestare solent, diuturnioraq. esse consueuerunt quam in nephritico dolore. appetitus atque concoctio labefactatur, propterque magnos dolores contingit saepe urinae colorem admodum, bilescere, tingi, & ut ita dicam, igniri, biliosamque naturam falsò repraesentare: propterea autem hoc fit, quòd bilis ad renes deferatur, cum ita viæ intestinorum per quas excludi solebat bilis, sint interceptae, ut neque ructus, neq. vètris flatus, exire possit.

CAUSA. Doloris colici causae plures sunt; variae equidem materiae ad intestina ruunt, propter eorum amplitudinem, praecipue tamen quatuor existunt, aliquando enim excitatur ab inflammatione eiusdem partis, tuncque dolor magis est stabilis & acerbus; adest tunc quoque ardor, sitis, nausea, bilisque vomitus fit, necnon stercoris, aliquando etiam urinae fit retentio, feruor quidam est interiùs, febrisque molesta. Aliàs verò ab acrimordacique excitatur humore, tunc quoque experientur ardorem, sitim, vigilias, febrem, sed non ita validè urgebunt, quemadmodum si ab inflammatione ipsius coli fiat malum: ab usu frigidorum leuabuntur, uti à contrariis calidis nimirum deterius se habebunt; quae per

aluum excluduntur, biliosa sunt; vrina dum fluit, percipitur acris. Aliàs fit ab humoribus lentis, crassis, atque à vitrea pituita in coli membranis subsistentibus, tunc quoque magis est stabilis ipse dolor, vixque curatur ante eiusdem materiei vacationem, intestinumque quasi perforari videtur: vomitus fit humoris potissimum pituitosi, nausea, ructusque concurrit, aluus ita astricta est, vt nihil ferè transmittatur, & si aliquando flatus aut ructus emittantur, parum aut nihil inde leuatur æger, à calidis mitescit malum, à contrariis verò irritatur, præcessit satietas, cruditas, otium, ciborum frigidorum vsus. Cum autem colon intestinum proprium quasi sit receptaculum flatuum, ab iisdem quoque frequentissimè contingit colicum dolorem excitari, cum videlicet nimia eorundem illis in locis cumulatur copia. Hi aliquando arctè concluduntur atque colliguntur in colo vel eiusdem membranis à fecibus multum induratis: aliàs etiam hoc fit à viscida crassaque pituita viis communibus impacta; subinde quoque hoc prouenit à tumore aliquo circumstante, aut in intestinis existente, à quo intestina ita fortiter comprimuntur, vt exitus perquam difficilis fiat ipsis spiritibus; tuncque contingit maximos dolores excitari, eò quòd intestinum maxima vi sic sæpe distendatur: tunc præcessit vsus ciborum qui flatus generant, ægri quoque ventris torsiones rugitusque maiores experiuntur. Quotiescumque autem tanta est obstructio, vt excrementis nullus exitus pateat, iliaca passio oritur.

PROGNOSTICA. Sæpe coli dolor in resolutionem neruorum, vel in morbum articulare, vel in iliacam passionem, nonnunquam etiam in hydropem transit. Inter omnes colicas affectiones, ea quæ ex inflammatione ortum ducit, est grauissima: in ilion enim transitionem minatur. Minus periculosus erit coli dolor, vbi non omnino excrementa retinentur, neque in vna ipsius coli parte fixus dolor sentitur, vehementissimi enim

COLICAE ATQVE ILIACAE PASSIONIS. 355
enim colici dolores periculosiores sunt quàm mitiores,
vtpote qui à leuioribus causis fiunt.



Methodus pro curatione

COLICAE ATQVE ILIA-
CAE PASSIONIS IN-
SERVIENS.

*Perficitur autem subsequētibz remēdiorū
generibz.*

VICTVS RATIONE.

A Er temperatè caleat, potiùsque ad ficcum vergat:
melius tamen pannis calētibz natiuus calor
partium abdominis conseruabitur.

Cibus sit facilis digestionis, & qui paucas superfluitates
generet: sit liquidus, minimèque flatuosus aut vis-
cosus. Carnes conueniunt volucrum in aqua non de-
gentium, pullorum, gallinarum, caponum, auicula-
rum montanarum, hœdinæ, vitulinæ, elixenturque
potius quàm assentur. Plurimum hîc iuscula pingua
conueniunt caponum, pullorum: melius enim per in-
testinorum ductus transferuntur. Incoquemus thy-
mum, sampuchum, origanum, satureiam, hyssopum,
fœniculum, asparagum, apium. addemus iusculis
commodè nonnihil vini maluatici. parcè autem
prandeat æger, parcùsque cœnet.

Potus. Vinum conuenit generosum, interim parcè bi-
bat: aquosum autem atque aqua omninò vitentur, si-
militer & ptisana.

Exercitiū conuenit antequàm alimentum sumpserit:
eo equidem sumpto, quies imperanda.

Somnus si necessitas dicet, admittatur etiam solito

Z. ij

diutius, quo etiam interdiu frui poterit.
 Excrementa alui respondeant, diligentérque euitentur
 omnia ea quæ aluum astringere possunt.
 Animi perturbationes euitentur, non omninò tamen
 inutilis ira brevis est.

P R A E P A R A N T I B V S.

Mel rosatum colatum, oxýmel simplex potiùs obest
 quàm iuuat.

Syr. de duabus vel quinque radicibus.

Aqua foeniculi, melissæ, absinthij.

Decoctum radicum asparagi, enulæ campanæ, asari, ga-
 langæ, zedoariæ, pæoniæ, foliorum menthæ, maiora-
 næ, origani, præsij, thymi, hyssopi, florum rorismarini,
 camomillæ, seminum anisi, carui, anethi, ficuum; in
 vino odorifero fiet.

Magna ex parte in hoc malo materia plurimùm con-
 tumax est, & propterea concoquentibus incidentibús-
 que medicamentis naturæ obediens reddetur peccans
 materia. qui acutum recipiunt, reiiciendi sunt syrupi.

V A C V A N T I B V S.

Clystere ex floribus camomillæ, meliloti, rad. althææ,
 seminibus lini, anisi, anethi, centaurea minori, cala-
 mintha, origano, maluis, ficubus, carthamo contuso,
 agarico, colocynthide, cassia, electuario de baccis lau-
 ri, hiera picra, hiera logodij, hiera diacolocynthidos,
 benedicta laxatiua, oleo camomillæ, rutaceo, nucum,
 butyro recenti: decoquantur decoquenda in iusculo
 carniū pinguium, eritque sæpe infundendum hoc
 enema: vsque ad perfectam curationem videlicet.

Electuarium eleuscopi, diaphœnicum, electuarium In-
 dum, hiera picra, benedicta laxatiua, diaturbith cum
 rhabarbo.

Pill. alephanginæ, aggregatiuæ, foetidæ, ante cibum.

Trochisci alhandal.

Rhabarbarum, myrobalani: cassia verò & sena cum
 flatus

flatus generent nequaquam hîc admittantur.

Terebinthina.

Suppositorium longum hîc subiiciatur.

Vomitus ante cibum si quis facîle vomat, in mali principio potissimum fiet. iuuari autem commodè poterit cum decocto raphani, asari, aut cum oleo & vino maluatico inuicem permixtis.

Venæ sectio, si ab apostemate fiat, omnino necessaria est, si nihil aliud obstat.

A leuioribus medicamentis purgantibus ad fortiora progrediendum est, si malum ipsum admodum fuerit contumax, postquam incidentibus detergentibusque medicamentis vsi fuerimus prius.

AVERTENTIBVS.

Venæ sectio efficax sæpe remedium in dolore admodum graui deprehenditur.

Cucurbitula magna vmbilico affigatur atque loco affecto: maximi enim sæpe est iuuamenti.

Clysteria.

Suppositoria.

Frictiones brachiorum, spatularum.

Balneum.

SEDANTIBVS *dolorem, dissipantibusque flatus.*

Iusculum caponis vel gallinæ addito croco. Cornu cerui vstum, decoctum florum camomillæ, radicum althææ in vino, aut aqua camomillæ.

Clystere ex pinguibus iusculis, oleo lini, camomillæ, vel ex decocto florum camomillæ, meliloti, vel ex oleo rutaceo, laurino, hiera picra, vino generoso, aut ex solo oleo, aut vino generoso, aut ex oleo rutæ, & electuario de baccis lauri; quod admodum est præstans.

Balneum ex decocto florum camomillæ, meliloti, foliorum lauri, rutæ.

Z iiij

Oleum amygdalorum dulcium cum vino hypocratico bibatur.

Vesica magna impleatur ex parte oleo camomelino, lini, anethino, vel communi, ventrisque regioni admoveatur.

Filorum quantitas, lixiuio cineribusque cocta, ventri apponatur calens.

Sacculus ex milio, saleque tostis, floribus camomillæ, seminibus fœnugræci, foliis maluæ, fœniculi, althææ.

Unguentum ex oleo camomelino, liliorum, lini, petrolei, anethino, rutaceo, castorei, vino maluatico, aut aquæ vitæ parum addito, idque fiat tempore inunctionis. Unguentum ex oleo laurino, rutaccóque.

Theriaca recens, athanasia Nicolai, phylonium Romanum, Andromachi, cū decoctione camomillæ & rutæ.

Opium castoreo permisceatur. Pillulæ de cynoglossa.

Clystere ex iusculis pinguibus; addendó ex nunc dictis narcoticis medicamentis portionem aliquam.

Potus ex diaphœnicone, hiera Galeni, electuario electrophi, phylonio Romano.

Horum aliqua dolorem leniunt, aut propterea quòd causam auferant, aut propterea quòd partis vel humorum intemperiem emendent, aut qui stuporem parti inducant. Narcotica quidem, dū calida est materia, conveniunt ita in frigida; periculum enim est ne humores frigidi magis frigidentur, & ne tum flatus, tum humores crassi magis crassescant, magisque contumaces ad expellendum reddantur, obstructionesque augeantur; cogimur tamen aliquando illis uti, cū scilicet nihil aliorum medicamentorum ope proficimus: clysteribus autem id melius quàm potionibus consequemur. solemus tamen subinde purgantibus medicamentis dragmam horum medicamentorum permiscere, si coacti fuerimus per os propinare; sæpe enim ea ratione malum leuatur: estque efficax tutaque medicandi ratio: simul enim sic & causa tollitur, & dolor mitigatur.

ROBORANTIBVS *intemperiemque corrigentibus, reliquiásque resoluentibus.*

Conserua nostra magna præstans hîc est medicamentum.

Mithridatum, theriaca, diacuminum, diatrium pipe-
reon, aromaticum rosatum, diagalanga, rosata no-
uella.

Electuarium de baccis lauri, diamoschus, vinum ab-
sinthites cui cumini dragma vna infundatur, cola-
turâque bibatur; vel foliis eiusdem modicè siccatis
aqua ardens superfundatur, & tantundem vini mal-
uatici.

Castoreum præstantissimum est medicamentum, cum
aquæ mulsæ dragma vna, si bibatur.

Cornu cerui, ossa mespilorum, lumbrici terræ, stercus
lupi, & intestinum.

Cucurbitula magna loco affecto admoueatur.

Vnguentum ex oleo rutæ, anethi, camomille, petrolei,
lauri, castorei, liliorum, seminibus anisi, cumini, fœni-
culi, galbano, sagapeno, castoreo.

Fotus ex floribus camomille, meliloti, foliis rutæ, cala-
minthæ, origani, lauri, roris marini.

THEORICA ET EMPIRICA MEDI-
camenta nobilia, in COLICA atque ILIACA
PASSIONE *sæpius cum summa salute plurimorum*
agrotorum à Gualtero Bruel experta.

CVRATIO COLICAE PASSIONIS AT-
QVE ILIACAE.

R^z radicum liliorum ʒ j. β. angelicæ ʒ j. florum ca-
momille, meliloti ana m. j. β. foliorum calaminthæ ab-
sinthii, rutæ, centaurei minoris, abrotani ana m. j. semi-
ni. m. lini, fœnugræci ana ʒ β. nigelle, cumini, anisi a-
na ʒ iij. coquantur in iusculo pingui carniū q. s. ad

Z iij

℞ j. β. colaturæ addatur benedictæ laxatiuæ, electuarii elefcopi ana 3 iiij. olei rutacei, camomelini ana 3 j. butyri recentis 3 ij. electuarii de baccis lauri 3 iiij. falis communis 3 j. vitellum vnum oui, fiat *Clystere*.

℞ syrupi de quinque radicibus 3 iiij. oxymellis compositi 3 j. β. decoctionis camomille, menthe, marthubii 3 vj. iusculi pullorum 3 iiij. misceantur, detur tribus vicibus, modò morbus inducias concedat.

℞ electuarii elefcopi 3 iiij. β. benedictæ laxatiuæ 3 ij. ss. diaphœniconis 3 ij. sacchari albissimi q. s. fiat *Bolus*.

℞ radicum fœniculi, petroselini ana 3 j. seminum anisi, rutæ, cumini, fœniculi ana 3 iiij. polypodii quercini, agarici albi & leuis ana 3 iiij. seminum carui, dauci, ameos ana 3 vj. coquantur in aqua q. s. ad ℞ j. β. colaturæ addatur benedictæ laxatiuæ, electuarii elefcopi ana 3 iiij. fiat *Potio*, bibat haustum manè & vespèri.

℞ hieræ diacolocynthidos 3 ij. rhabarbari 3 j. diagridii gr. iiij. syrupi de absinthio q. s. fiant *Pillule*.

℞ pillularum sine quibus esse nolo, pillularum foetidarum ana 3 j. β. castorei gr. xij. trochiscorum alhandal gr. iiij. fiat *Bolus*: vna eademque opera dolorem leuamus, causamque mali expellimus.

℞ hieræ Galeni 3 j. opii gr. j. croci gr. iiij. syrupi de quinque radicibus q. s. fiant *Pillule*, quæ dabuntur maxime sæuiente malo.

℞ phylonii Romani 3 j. diagalange 3 j. β. electuarii elefcopi 3 iiij. ss. fiat *Haustus* cum vino generoso.

℞ electuarii de baccis lauri 3 j. diacumini 3 ss. vini generosi 3 iiij. detur calidum.

℞ olei rutacei 3 viij. camomelini, liliorum ana 3 j. gummi ferapini, opopanax, castorei ana 3 j. electuarii de baccis lauri 3 ss. opii gr. ij. vini generosi q. s. fiat *Clystere*.

℞ olei communis 3 x. olei liliorum 3 iiij. butyri non sali-

saliti 3 iij. fiat *Clystere*, dum ex siccitate & retentione fecum fit colica.

R^x seminum anethi 3 j. ss. radicum raphani 3 j. coquantur in aqua q. s. ad medietatis consumptionem. Vnciis quinque huius colaturę addatur 3 j. ss. olei liliorum alborum, misceantur, fiat *Vomitorium* medicamentum, tepidum bibat.

R^x specierum diacumini, dianisi ana 3 iij. electuarii de baccis lauri, diagalangę ana 3 j. ss. detur 3 j. cum vino hypocratico, cui tempore vsus permiscebitur dragma vna theriacę veteris.

R^x electuarii de baccis lauri, phylonii Romani ana 3 ij. diagalangę 3 j. electuarii eleescopi 3 iij. ss. detur tempore vsus 3 j. ss. cum haustu vini potentis.

R^x radicum althęę 3 j. foliorum malęę m. ij. ss. florum camomillę, meliloti ana m. j. ss. seminum lini, cumini, fœnugręci, fœniculi, apii ana 3 ss. nigellę 3 iij. ss. coquantur in hydrelęo ad tertias, fiat *Fomentatio* abdominis cum vesicis semiplenis.

R^x florum camomillę, meliloti, mentastri, pulegii, origani ana m. j. seminum fœniculi, anisi, ameos, anethi ana 3 j. coquantur in aqua q. s. ad tertię partis consumptionem, fiat *Balneum*. Potius tamen loco balnei sequenti sacculo vtemur, plus enim inde leuaminis sentiet æger.

R^x florum camomillę, meliloti ana m. j. pulegii, furfurum panici ana m. ij. nigellę Romanę 3 iij. seminum anisi, cumini, fœniculi ana 3 ij. ss. salis communis 3 v. calefiant aliquo vase aliquo sine aqua tamen, floribus exceptis; quę omnia *Sacculo* concludantur, vinoque calido irrorentur, calentięque ventri apponantur.

R^x vnguenti dialthęę, olei camomelini ana 3 vj. olei amygdalorum dulcium, anethini, liliorum, ana 3 iij. olei spicę 3 ss. butyri recentis, pinguedinis capi, axungię humanę ana 3 v. misceantur, fiat *Vnguentum*, si ex siccitate & excrementorum retentione fiat.

R^x olei liliorum alborum 3 j. β. de castoreo 3 j. olei petrolei, rutæ ana 3 β. radicum galangæ 3 j. galbani 3 iij. ceræ q. s. fiat *Vnguentum*.

R^x emplastri de baccis lauri 3 ij. β. olei liliorum, rutæ ana q. s. fiat *Emplastrum*.


R^x emplastri de baccis lauri 3 ij. vnguenti Agrippæ 3 j. olei liliacei q. s. fiat *Emplastrum*.

APPENDIX

ad prædicta pro curatione COLICAE PASSIONIS
inferuiens.

Omniū primò dolorem sedabimus si immodicus fuerit, curatioque vera quæ causæ debetur, ad tempus differetur. Lenientibus autem medicamentis dolorem leuabimus, quibus si nihil profecerimus, ad stupefacientia & narcotica transcendendum est: & aliquando quidem à principio oportet admittere narcotica, periculum enim alioqui erit si expectemus donec causa præsentis morbi auferatur (quæ plerumque admodum pertinax est) ne vires opprimantur. Ad narcotica interim non transibimus nisi in casu desperato, sed omniū primò, si fieri aliqua ratione possit, causam mali auferemus, sic equidem dolor verè mitigabitur. Magna autem ex parte à pituitosis fit humoribus, flatibusque hoc malum. In hunc finem, omniū primò alui excrementa emolliantur clysterio blando, hinc materiam quæ dolorem excitat in colica, enemate conuenienti educemus potius quàm per os sumpto medicamento. In iliaca autem magis conueniunt quæ per os sumuntur medicamenta, iis enim magis iuuantur ægri: omniū tamen primò etiam clystere leniens hic uti in colica præscribetur, curabimisque iliacam uti colicam à simili causa dependentem, cum maximam inter se affinitatem habeant hæc mala, cum non differant in alio, quàm quòd iliaca fiat ab obstructione in gracilibus intestinis facta; colica verò fit ab obstructione inferiorum intestinorum. In iliaca itaque primò proderit purgatorium per os propinare medicamentum, hinc post horam clystere iniiciemus, ut ad inferiora melius proliciatur medicamentum per os sumptum.

ptum. Clysteribus autem in colica viemur sæpius, donec conualeseat. Prædictis autem addemus semper quæ flatu discentore possunt, nec non dolorem lenire. Hinc quæ intestina, viscera principalia roborare, intemperiemque emendare possunt, admittentur; in qua re magni momenti erit clystere ex vino hypocratico paratum, iniectumque. Vbi vomitu clysteribusque utrumque vacuata erit materia mali ab intestinis, si ab aliis partibus corporis in ventrem materia aliqua morbum fouens ruat, medicamentis tum demum per os sumptis uniuersum corpus purgandum erit, præparantibus interim medicamentis convenientibus præmissis. In valida obstructione, maximo cum successu propinare poterimus olei communis ℥ v. cum iuseculo pullorum in quo flores camomillæ cocti sint, tuncque quatuor aut quinque horarum spacio nihil aliud offeretur alimenti. Aquæ potus omnino interdicitur. A fortiori quoque purgantibus medicamentis omnino abstinemus in principio potissimum mali; periculum enim est ne materiæ astantes ad intestina sic præcipitentur, unde malum ingeminari poterit. Præstantissimum autem medicamentum in hoc malo est castorium, si sæpius bibatur.



Methodus pro cognitione

HYDROPS INSERVIENS.

HYDROPS passio est quam aquosi humoris copia comitatur, propter sanguificandi facultatem vitiatam: est autem morbus diuturnus, ex frigidity hepatis magna ex parte ortum habens. Sunt autem tres hydropis species, anasarca, ascites, & tympanites, quæ distinguuntur tum ratione materiæ, tum ratione loci. Anasarca est pituitosi aquosique humoris in toto corpore disseminatio. In hoc morbo tota corporis moles incrementum sumit præter naturam; totum enim intus

aluum excluduntur, biliosa sunt; vrina dum fluit, percipitur acris. Aliàs fit ab humoribus lentis, crassis, atque à vitrea pituita in coli membranis subsistentibus, tunc quoque magis est stabilis ipse dolor, vixque curatur ante eiusdem materiei vacuationem, intestinumque quasi perforari videtur: vomitus fit humoris potissimum pituitosi, nausea, ructusque concurrit, aluus ita astricta est, vt nihil ferè transmittatur, & si aliquando flatus aut ructus emittantur, parum aut nihil inde leuatur æger, à calidis mitescit malum, à contrariis verò irritatur, præcessit satietas, cruditas, otium, ciborum frigidorum vsus. Cum autem colon intestinum proprium quasi sit receptaculum flatuum, ab iisdem quoque frequentissimè contingit colicum dolorem excitari, cum videlicet nimia eorundem illis in locis cumulatur copia. Hi aliquando arctè concluduntur atque colliguntur in colo vel eiusdem membranis à fecibus multum induratis: aliàs etiam hoc fit à viscida crassaque pituita viis communibus impacta; subinde quoque hoc provenit à tumore aliquo circumstante, aut in intestinis existente, à quo intestina ita fortiter comprimuntur, vt exitus perquam difficilis fiat ipsis spiritibus; tuncque contingit maximos dolores excitari, eò quòd intestinum maxima vi sic sæpe distendatur: tunc præcessit vsus ciborum qui flatus generant, ægri quoque ventris torsiones ructusque maiores experiuntur. Quotiescumque autem tanta est obstructio, vt excrementis nullus exitus pateat, iliaca passio oritur.

PROGNOSTICA. Sæpe coli dolor in resolutionem neruorum, vel in morbum articulare, vel in iliacam passionem, nonnunquam etiam in hydropem transit. Inter omnes colicas affectiones, ea quæ ex inflammatione ortum ducit, est grauissima: in ilion enim transitionem minatur. Minus periculosus erit coli dolor, vbi non omninò excrementa retinentur, neque in vna ipsius coli parte fixus dolor sentitur, vehementissimi enim

COLICAE ATQVE ILIACAE PASSIONIS. 355
enim colici dolores periculosiores sunt quàm mitiores,
vtpote qui à leuioribus causis fiunt.



Methodus pro curatione

COLICAE ATQVE ILIA-
CAE PASSIONIS IN-
SERVIENS.

*Perficitur autem subsequētibz remēdiorū
generibz.*

VICTVS RATIONE.

A Er temperatè caleat, potiùsque ad ficcum vergat:
melius tamen pannis calētibz natiuus calor
partium abdominis conseruabitur.

Cibus sit facilis digestionis, & qui paucas superfluitates
generet: sit liquidus, minimèque flatuosus aut vis-
cosus. Carnes conueniunt volūcrum in aqua non de-
gentium, pullorum, gallinarum, caponum, auicula-
rum montanarum, hædinæ, vitulinæ, elixenturque
potius quàm assentur. Plurimum hîc iuscula pingua
conueniunt caponum, pullorum: melius enim per in-
testinorum ductus transferuntur. Incoquemus thy-
mum, sampsuchum, origanum, satureiam, hyssopum,
fœniculum, asparagum, apium. addemus iusculis
commodè nonnihil vini maluatici. parcè autem
prandeat æger, parciùsque cœnet.

Potus. Vinum conuenit generosum, interim parcè bi-
bat: aquosum autem atque aqua omninò vitentur, si-
militer & ptisana.

Exercitiâ conuenit antequàm alimentum sumpserit:
eo equidem sumpto, quies imperanda.

Somnus si necessitas dicet, admittatur etiam solito

Z. ij

diutius, quo etiam interdiu frui poterit.

Excrementa alui respondeant, diligentérque euitentur omnia ea quæ aluum astringere possunt.

Animi perturbationes euitentur, non omninò tamen inutilis ira brevis est.

P R A E P A R A N T I B V S.

Mel rosatum colatum, oxymel simplex potius obest quàm iuuat.

Syr. de duabus vel quinque radicibus.

Aqua fœniculi, melissæ, absinthij.

Decoctum radicum asparagi, enulæ campanæ, asari, galangæ, zedoariæ, pæoniæ, foliorum menthæ, maioranæ, origani, præsij, thymi, hyssopi, florum rorismarini, camomillæ, seminum anisi, carui, anethi, ficuum; in vino odorifero fiet.

Magna ex parte in hoc malo materia plurimùm contumax est, & propterea concoquentibus incidentibúsq; medicamentis naturæ obediens reddetur peccans materia. qui acetum recipiunt, reiiciendi sunt syrapi.

V A C V A N T I B V S.

Clystere ex floribus camomillæ, meliloti, rad. althææ, feminibus lini, anisi, anethi, centaurea minori, calamintha, origano, maluis, ficubus, carthamo contuso, agarico, colocynthide, cassia, electuario de baccis lauri, hiera picra, hiera logodij, hiera diacolocynthidos, benedicta laxatiua, oleo camomillæ, rutaceo, nucum, butyro recenti: decoquantur decoquenda in iusculo carniū pinguium, eritque sæpe infundendum hoc enema: vsque ad perfectam curationem videlicet.

Electuariū eleuscopi, diaphœnicum, electuariū Indum, hiera picra, benedicta laxatiua, diaturbith cum rhabarbo.

Pill. alephanginæ, aggregatiuæ, fœtidæ, ante cibum. Trochisci alhandal.

Rhabarbarum, myrobalani: cassia verò & sena cùm
flatus

flatus generent nequaquam hîc admittantur.

Terebinthina.

Suppositorium longum hîc subiiciatur.

Vomitibus ante cibum si quis facîle vomat, in mali principio potissimum fiet. iuuari autem commodè poterit cum decocto raphani, asari, aut cum oleo & vino maluatico inuicem permixtis.

Venæ sectio, si ab apostemate fiat, omnino necessaria est, si nihil aliud obstat.

A leuioribus medicamentis purgantibus ad fortiora progrediendum est, si malum ipsum admodum fuerit contumax, postquam incidentibus detergentibusque medicamentis vti fuerimus prius.

AVERTENTIBVS.

Venæ sectio efficax sæpe remedium in dolore admodum graui deprehenditur.

Cucurbitula magna vmbilico affigatur atque loco affecto: maximi enim sæpe est iuuamenti.

Clysteria.

Suppositoria.

Frictiones brachiorum, spatularum.

Balneum.

SEDANTIBVS *dolorem, dissipantibusque flatus.*

Iusculum caponis vel gallinæ addito croco. Cornu cerui vstum, decoctum florum camomillæ, radicum althææ in vino, aut aqua camomillæ.

Clystere ex pinguibus iusculis, oleo lini, camomillæ, vel ex decocto florum camomillæ, meliloti, vel ex oleo rutaceo, laurino, hiera picra, vino generoso, aut ex solo oleo, aut vino generoso, aut ex oleo rutæ, & electuario de baccis lauri; quod admodum est præstans.

Balneum ex decocto florum camomillæ, meliloti, foliorum lauri, rutæ.

Z iiij

Oleum amygdalorum dulcium cum vino hypocratico bibatur.

Vesica magna impleatur ex parte oleo camomelino, lini, anethino, vel communi, ventrisque regioni admoveatur.

Filorum quantitas, lixiuio cineribusque cocta, ventri apponatur calens.

Sacculus ex milio, saleque tostis, floribus camomillæ, seminibus fœnugræci, foliis maluæ, fœniculi, althææ.

Vnguentum ex oleo camomelino, liliorum, lini, petrolei, anethino, rutaceo, castorei, vino maluatico, aut aquæ vitæ parum addito, idque fiat tempore inunctionis. Vnguentum ex oleo laurino, rutaceoque.

Theriaca recens, athanasia Nicolai, phylonium Romanum, Andromachi, cū decoctione camomillæ & rutæ.

Opium castoreo permisceatur. Pillulæ de cynoglossa.

Clystere ex iusculis pinguibus; addendo ex nunc dictis narcoticis medicamentis portionem aliquam.

Potus ex diaphœnicone, hiera Galeni, electuario electrophi, phylonio Romano.

Horum aliqua dolorem leniunt, aut propterea quòd causam auferant; aut propterea quòd partis vel humorum intemperiem emendent, aut qui stuporem parti inducant. Narcotica quidem, dū calida est materia, conueniunt ita in frigida; periculum enim est ne humores frigidi magis frigidentur, & ne tum flatus, tum humores crassi magis crassescant, magisque contumaces ad expellendum reddantur, obstructionesque augeantur; cogimur tamen aliquando illis vti, cū scilicet nihil aliorum medicamentorum ope proficimus: clysteribus autem id melius quàm potionibus consequemur. solemus tamen subinde purgantibus medicamentis dragmam horum medicamentorum permiscere, si coacti fuerimus per os propinare; sæpe enim ea ratione malum leuatur: estque efficax tutaque medicandi ratio: simul enim sic & causa tollitur, & dolor mitigatur.

ROBORANTIBVS *intemperiemque corrigentibus, reliquiasque resolventibus.*

Conserua nostra magna præstans hic est medicamentum.

Mithridatum, theriaca, diacuminum, diatrium pipe-
reon, aromaticum rosatum, diagalanga, rosata no-
uella.

Electuarium de baccis lauri, diamoschus, vinum ab-
sinthites cui cumini dragma vna infundatur, cola-
turâque bibatur; vel foliis eiusdem modicè siccatis
aqua ardens superfundatur, & tantundem vini mal-
uatici.

Castoreum præstantissimum est medicamentum, cum
aquæ mulsæ dragma vna, si bibatur.

Cornu cerui, ossa mespilorum, lumbrici terræ, stercus
lupi, & intestinum.

Cucurbitula magna loco affecto admoueatur.

Vnguentum ex oleo rutæ, anethi, camomillæ, petrolei,
lauri, castorei, liliorum, seminibus anisi, cumini, fœni-
culi, galbano, sagapeno, castoreo.

Fotus ex floribus camomillæ, meliloti, foliis rutæ, cala-
minthæ, origani, lauri, roris marini.

**THEORICA ET EMPIRICA MEDI-
camenta nobilia, in COLICA atque ILIACA
PASSIONE sæpius cum summa salute plurimorum
egrotorum à Gualtero Bruel experta.**

**CVRATIO COLICAE PASSIONIS AT-
QVE ILIACAE.**

R^x radicum liliorum ʒ j. β. angelicæ ʒ j. florum ca-
momillæ, meliloti ana m. j. β. foliorum calaminthæ ab-
sinthii, rutæ, centaurei minoris, abrotani ana m. j. semi-
num lini, fœnugræci ana ʒ β. nigellæ, cumini, anisi a-
na ʒ iiij. coquantur in iulculo pingui carniū q. s. ad
Z iiij.

℞ j. ℞. colaturæ addatur benedictæ laxatiuæ, electuarii eleſcopi ana 3 iiij. olei rutacei, camomelini ana 3 j. butyri recentis 3 ij. electuarii de baccis lauri 3 iiij. ſalis communis 3 j. vitellum vnum oui, fiat *Clyſtere*.

℞ ſyrupi de quinque radicibus 3 iiij. oxymellis compositi 3 j. ℞. decoctionis camomille, menthe, marthubii 3 vj. iuſculi pulloꝝ 3 iiij. miſceantur, detur tribus vicibus, modò morbus inducias concedat.

℞ electuarii eleſcopi 3 iiij. ℞. benedictæ laxatiuæ 3 ij. ℞. diaphœniconis 3 ij. ſacchari albiſſimi q. ſ. fiat *Bolus*.

℞ radicem fœniculi, petroſelini ana 3 j. ſeminum aniſi, rutæ, cumini, fœniculi ana 3 iiij. polypodii quercini, agarici albi & leuis ana 3 iiij. ſeminum carui, dauci, ameos ana 3 vj. coquantur in aqua q. ſ. ad ℞ j. ℞. colaturæ addatur benedictæ laxatiuæ, electuarii eleſcopi ana 3 iiij. fiat *Potio*, bibat hauſtum manè & veſperi.

℞ hieræ diacolocynthidos 3 ij. rhabarbari 3 j. diagridii gr. iiij. ſyrupi de abſinthio q. ſ. fiant *Pillule*.

℞ pillularum ſine quibus eſſe nolo, pillularum foetidarum ana 3 j. ℞. caſtorei gr. xij. trochiſcorum alhandal gr. iiij. fiat *Bolus*: vna eademque opera dolorem leuamus, cauſamque mali expellimus.

℞ hierę Galeni 3 j. opii gr. j. croci gr. iiij. ſyrupi de quinque radicibus q. ſ. fiant *Pillule*, quę dabuntur maxime ſæuiente malo.

℞ phylonii Romani 3 j. diagalange 3 j. ℞. electuarii eleſcopi 3 iiij. ℞. fiat *Hauſtus* cum vino generoſo.

℞ electuarii de baccis lauri 3 j. diacumini 3 ℞. vini generoſi 3 iiij. detur calidum.

℞ olei rutacei 3 viij. camomelini, liliorum ana 3 j. gummi ſerapini, opopanacis, caſtorei ana 3 j. electuarii de baccis lauri 3 ℞. opii gr. ij. vini generoſi q. ſ. fiat *Clyſtere*.

℞ olei communis 3 x. olei liliorum 3 iiij. butyri non ſali-

saliti ℥ iij. fiat *Clystere*, dum ex siccitate & retentione fecum fit colica.

℞ seminum anethi ℥ j. ꝑ. radicum raphani ℥ j. coquantur in aqua q. s. ad medietatis consumptionem. Vnicuique quinque huius colaturę addatur ℥ j. ꝑ. olei liliorum alborum, misceantur, fiat *Vomitorium* medicamentum, tepidum bibat.

℞ specierum diacumini, dianisi ana 3 iij. electuarii de baccis lauri, diagalange ana 3 j. ꝑ. detur 3 j. cum vino hypocratico, cui tempore vsus permiscebitur dragma vna theriacę veteris.

℞ electuarii de baccis lauri, phylonii Romani ana 3 ij. diagalange 3 j. electuarii eleescopi 3 iij. ꝑ. detur tempore vsus 3 j. ꝑ. cum haustu vini potentis.


℞ radicum althęę ℥ j. foliorum malue m. ij. ꝑ. florum camomille, meliloti ana m. j. ꝑ. seminum lini, cumini, fœnugręci, fœniculi, apii ana 3 ꝑ. nigelle 3 iij. ꝑ. coquantur in hydrelęo ad tertias, fiat *Fomentatio* abdominis cum vesicis semiplenis.

℞ florum camomille, meliloti, mentastri, pulegii, origani ana m. j. seminum fœniculi, anisi, ameos, anethi ana 3 j. coquantur in aqua q. s. ad tertię partis consumptionem, fiat *Balneum*. Potius tamen loco balnei sequenti sacculo vtemur, plus enim inde leuaminis sentiet æger.

℞ florum camomillę, meliloti ana m. j. pulegii, furfurum panici ana m. ij. nigellę Romanę 3 iij. seminum anisi, cumini, fœniculi ana 3 ij. ꝑ. salis communis 3 v. calefiant aliqualiter vase aliquo sine aqua tamen, floribus exceptis; quę omnia *Sacculo* concludantur, vinoque calido irrorentur, calentięque ventri apponantur.

℞ vnguenti dialthęę, olei camomelini ana 3 vj. olei amygdalorum dulcium, anethini, liliorum, ana 3 iij. olei spicę 3 ꝑ. butyri recentis, pinguedinis capi, axungię humanę ana 3 v. misceantur, fiat *Vnguentum*, si ex siccitate & excrementorum retentione fiat.

ptum. Clysteribus autem in colica utemur sæpius, donec conualescat. Prædictis autem addemus semper quæ flatum discutere possunt, nec non dolorem lenire. Hinc quæ intestina, viscera principalia roborare, intemperiemque emendare possunt, admittentur; in qua re magni momenti erit clystere ex vino hypocratico paratum, iniectumque. Vbi vomitu clysteribusque utrumque vacuata erit materia mali ab intestinis, si ab aliis partibus corporis in ventrem materia aliqua morbum fovens ruat, medicamentis tum demum per os sumptis uniuersum corpus purgandum erit, præparantibus interim medicamentis convenientibus præmissis. In valida obstructione, maximo cum successu propinare poterimus olei communis ℥ v. cum iusculo pullorum in quo flores camomillæ cocti sint, tuncque quatuor aut quinque horarum spacio nihil aliud offeretur alimenti. Aquæ potus omnino interdicitur. A fortiori quoque purgantibus medicamentis omnino abstinemus in principio potissimum mali; periculum enim est ne materiæ astantes ad intestina sic præcipitentur, unde malum ingeminari poterit. Præstantissimum autem medicamentum in hoc malo est castorium, si sæpius bibatur.



Methodus pro cognitione

HYDROPS INSER- VIENS.

HYDROPS passio est quam aquosi humoris copia comitatur, propter sanguificandi facultatem vitiatam: est autem morbus diuturnus, ex frigiditye hepatis magna ex parte ortum habens. Sunt autem tres hydropis species, anasarca, ascites, & tympanites, quæ distinguuntur tum ratione materiæ, tum ratione loci. Anasarca est pituitosi aquosique humoris in toto corpore diffeminatio. In hoc morbo tota corporis moles incrementum sumit præter naturam; totum enim intus

mescit & humore oblinitur, qui è flegmatico sanguine mixtus est. Hic materia pituitosa effunditur inter cutem & carnosum genus totius corporis, spongiarumque instar imbibitur in toto corpore, contingitque ab eius copia in vniuerso corpore malum colorem nasci. Ascites verò est, cum in totum illud spatium, quod inter peritonæum & intestina vacuum est, spatiumque abdominis dicitur, flatuum quidem copia, maior tamen aquæ quantitas quàm vaporum colligitur. In hoc malo primò venter abdomenque sensim, & tandem etiam crura distenduntur & intumescunt, reliquæ verò corporis partes extenuantur. Cum verò maior est copia flatuum quàm aquæ, à quibus abdomen præter rationem distenditur, tympanites dicitur, tunc flatuum potius percipimus sonum quàm humoris ex abdominis percussione, sonum enim tympani percipiet, vnde etiam nomen habet; naturalis quoque color faciei magis est hic constans. In ascite verò sonus talis non percipitur, sed dum de latere in latus deuoluitur æger, venter fluctuat, uti vesica media repleta.

PARS AFFECTA est maiori ex parte ipsum iecur; hoc enim instrumentum est sanguinis generatiuum. Hydrops autem non generatur, nisi vbi sanguificationis officina deficit, necessarium est ergo in hoc morbo ipsum iecur affici. Contingit autem hydropem sæpissimè excitari, ob primariam iecoris affectionem, tunc semper ferè exigua tussis comitatur, propterea quòd iecoris moles circa pulmones angustiam aliqualem facit; alui quoque excrementa minimè erunt liquida: contingit quoque iecur subinde affici per consensum, aliquando quidem mesenterij, lienis, ventriculi, ieiuni intestini, venarum mezaraicarum, vnde venarum etiam consequitur debilitas, quibus ad iecur alimenta transferuntur, sicque cumulantur in inferioribus partibus excrementa, donec corrumpantur & grauare incipiant, tuncque profluuio alui sæpe corripitur æger.

SIGNA communia hydropis, febricitant magna
ex

ex parte, multumque sitiunt hydropici, potissimum qui ascite laborant propter humores putrefactos & salso, cibum fastidiunt, concurrit color ex virore quasi albicans, adest spirandi difficultas corporisque grauitas, pedum tumefactio concurrit, propter distantiam à corde. In anasarca totum corpus quasi eneruatum languet, & æqualiter quasi intumescit, maximè tamen in pedibus atque tibiis sub noctem vestigium impressi digiti aliquandiu remanet, manè bona ex parte euanescit, venter hinc minimè inflatur vt in ascite, tactus tamen magis crassum experitur, carnes emortuo corpori persimiles habet æger, molles enim, laxæ, pallidæque efficiuntur, febris ferè lenta concurrit, vrinæ tenues albæque funduntur, spiritus quouis tempore impeditè trahitur, & potissimum post alimenta; in ascite autem contingit ventrem intumescere magis, & aliàs corporis partes contabescere, spiritus difficulter trahitur, eo quòd diaphragma à tumore comprimitur, morboque crescente, paulatim incipiunt tumere pedes, femora, scrotum, fluctuationes excitantur in ventre dum de latere in latus mouetur æger, ex humore aquoso in abdominis capacitate conclusio: nec mirum, cum intestina quasi in aqua natent, multum quoque vrinæ reddere solent in principio; paulò verò post, paulatim eius copia imminuitur, magisque fit rubicunda & crassa, multum quoque fit siticulosus æger, postea verò etiam febricitat. In tympanite autem facies non ita de naturali habitu recedit, ex ventrisque percussione, tympani quasi strepitum audiri contingit: non hinc moles tanta neque tam molesta adest atque in ascite, frequenter hinc intestina rugitu obmurmurant, multaue flatuum indicia concurrunt.

CAUSA. Iecoris venarumque refrigeratio magna, huius grauissimi diuturnique morbi causa est; quàm sequitur nimia humoris abundantia. Id autem iecori accidit aliàs per se. Subinde verò ita immutatur ex refrigeratione splenis, intestinorū, mesenterij, septi

transuersi,renum,qui aliquando propter eorum obstru-
tionem, aliàs quoque ob eorundem imbecillitatem,
serosam sanguinis substantiam non attrahunt; item ex
immodico sanguinis profluvio ex naribus, nec non ex
immodica mensium hemorrhoidumve vacuatione aut
suppressione; sic enim calor natiuus strangulatur, ob
spirituum vnà cum sanguine iacturam factam. Ex dy-
senteria quoque nec non lyenteria idem malum acci-
dit diutius si persistant; spiritus enim naturalis insituf-
que calor nimium dissipantur. Ictericitia denique, aut
articulari morbo, podagra nimirum, coxendicumve do-
lore laborantes, sæpe in hydropem transeunt; sic qui
longis consumuntur febribus, vnde insitus calor atque
spiritus nimium dissipatur, sanguificationisque offici-
na intercidit. eiusdem quoque mali causa est subinde a-
que frigide immodica potatio post æstum, corporisve
exercitationem, & vt summam dicam, quicquid san-
guificationis virtutem infringere potest, efficeréve ne
iecur chymum in sanguinem transmutare possit, hy-
dropem efficere potest; ascites tamen non tantum ex
partium nimia refrigeratione aut cruditate vt anasarca
ortum habet, sed frequenter quoque fit ob solutionem
continuitatis alicuius visceris, aut vasculi quo humores
contineri solent, eaque ratione causæ omnes quæ iecur
vehementer exiccant, vt ardentes febres, potentium vi-
norum immodicus vsus: alimenta quoque multum ca-
lentia, hydropem sæpe excitant, eò quòd viscera, & fre-
quentius quidem iecur ex occurso siccitatis nimie qua-
si exarescant atque rumpantur, necnon dehiscant, vt in
terra ex nimia siccitate fieri solet; vnde humores in ab-
domen facile per fissuram illabuntur in ascite quasi e-
xudando atque destillando. Ex tumore duro ieco-
ris, lienis aut alterius partis quoque fit frequenter;
contingit enim viscera sic quoque frequenter frangi
propter nimiam eorum siccitatem atque humoris ino-
piam, vnde tempore etiam ipsa membrana ambiens
frangitur, sicque sensim serosa excrementa in abdomi-
nis

nis capacitatem decidunt.

PROGNOSTICA. Aqua inter cutem laborantibus, ulcera in corpore facta, difficulter sanantur, propter nimiam humorum abundantiam. Quicumque suppurati, aut aquam inter cutem habentes vruntur, aut secantur, si aqua, aut pus vniuersum effluerit, omnes moriuntur. Aqua inter cutem laborans si à tussi habeatur, aut si postquam sectus est malum redeat, desperatus est. Omnium periculosissima tympanites est, secundum locum obtinet ascites, anasarca verò ceteris facilius est curatu, significatur enim robur naturæ, cum ad omnes partes diffunditur id quod noxium est. Omnes autem inueteratæ hydropes, & quæ iam habitum corrumpunt, sunt periculosissimæ, neque nisi cum magna molestia discutiuntur. A tumore duro iecoris vel lienis si fiat hydrops, insanabile fit malum. Phthisici hydropem incurrunt magna ex parte, eò quod iecori malum communicetur; eluuius enim saniosa atque virulenta viam inueniens, in iecoris substantiam diffusa aliquando obhæret, eiusque substantiam corrumpit.



Methodus pro curatione

HYDROPS INSERVIENS.

Perficitur autem subsequentibus remediorum generibus.

VICTVS RATIONE.

A Er lucidus sit in quo æger versatur, modicæque ad calidum atque siccum declinet; morbum enim auget humidus ventosusque aër.

Cibus. Carnes conueniunt leporinæ, cuniculorum, phasianorum, perdicum, pullorum, auicularum, gallinarum. Oua forbilia atque gallinarum hepata plurimum laudantur. Tempore cœnæ potius conueniunt assæ quàm elixæ carnes. Carnes bouinæ cum difficulter concoquantur, vitentur. Iuscula carniū vix admittantur, nisi deiectorium sumpserit medicamentum. Cinnamomo atque caryophyllis condiantur alimenta: vti pisces, sic lacticia vitentur. Nullo quoque modo legumina admittantur.

Potus sit vinum tenue, nequaquam dulce; cum hoc sitim nequaquam ita sedet. ab aquæ autem potu omninò abstineat. Vti autem tolerare famem magnum in hoc malo remedium, sic sitim perferre omnium maximè prodest.

Exercitium moderatum quamplurimum prodest ante alimentorum assumptionem. Commendatur autem inter alia, equitatio, nauigatio, ambulatio, frictio, balneum siccum.

Somnus sit nocturnus, non multus.

Excrementa alui respondeant. à Venere abstineat.

Tristitia atque timor quemadmodum obsunt eò quòd digestionem impediānt, sic non nihil iuuat ira, sollicitudoque.

PRAEPARANTIBVS.

Syr. de eupatorio, absinthio, de succo endiuia, cichorei.

Acetosus simplex, oxymel simplex.

Aqua cuscute, absinthij, prasi, radices ebuli, raphani, asparagi, foeniculi, api, alkekengi, cuscute.

Decoctio absinthij, marrubij, eupatorij, cuscute, asparagi, radicum graminis, foeniculi, asari, petroselini, seminum anisi, foeniculi, cicerum rubrorum, glycyrrhizæ in vino albo.

Syr. Byzantinus, de endiuia, granatorum.

Oxysaccharum.

Aqua capillorum Veneris, endiuia, lupulorum, absinthij, prasi, foeniculi.

Quan-

Quandoquidem frequenter iccoris aliqualis durities concurrit in hoc morbo , ea ratione aperientibus urinamque prouocantibus utemur medicamentis aliquamdiu.

VACVANTIBVS.

Diaturbith cum rhabarbaro , hiera diacolocynthidos, hiera logodij, electuarium Indum.

Pill. de euphorbio, mezereo, de rhabarbaro, de eupatorio cum succo ireos, de agarico, de sagapeno.

Decoctum radicum ebuli aut sambuci in vino. Sagapenum in pill. redigatur, nam vt brassica marina iuuat.

Succus cucumeris agrestis siccatus seu elaterium, succus brassicæ marinæ seu soldanellæ. Succus radicum ireos siluestris , aut decoctum eius per aliquot dies in in aurora propinetur , taleolæ quoque huius radicis sectæ, vinóque albo maceratæ xij. horarum spatio, exprimi poterunt , colaturaque bibatur. hoc remedio plerumque malum extirpari solet, modò curam admittat.

Rhabarbarum hepar roborat , agaricus. Senæ decoctum.

Thymelæa & ex ea elect. Mes. magnam quidem aquarum copiam euacuat; verum id fit cum magna molestia, hepatique nocet , eaque ratione nequaquam in hoc affectu utemur. idem quoque sentiendum de laureola.

Aqua destillata corticis sambuci, florum ireos.

Serum lactis caprini in quo per aliquot horas in cineribus calidis infundantur grana alkekengi aliquot, folia fumaricæ, cuscutæ, absinthij, semina anisi, fœniculi.

Vomitum instituetur hîc etiam magno cum commodo.

Venam autem hîc nullo modo secabimus, vt nec in tympanite, etiamsi vrina rubra fuerit, eò quòd intemperiem humidam augeat sanguinis vacuatio , nisi à suppressis mensibus aut hæmorrhoidibus periculum impendeat , ne in hepar sanguis irruat , eiusque naturæ calorem opprimat ob maligna aliquam qualita-

Aa

tem, aut eiusdem copiam.

Clystera vtilia multum hîc sunt, ex superiorum autem materia fient modiocriter fortia, aliquando verò leuia, potissimû tamen in ascite succû ireos ponemus.

Vnguentum de arthanita.

Ventris sectio fiet, si prædictis nihil profecerimus, ægêrque iuuenis sit & robustus, incisio autem fiet quatuor quas digitis sub vmbilico, idque splenis, iecorisque tumore scirrôque absente pulmonûmque vlcere, paulûmque reducatur phlebotome in latus dextrum aut sinistrum; neque enim multum refert quodnam latus pertundatur; deorsum autem externa cutis reuelletur; sic equidem melius oscula vulneris occludentur, locum naturalem repetente externa cuticula; cauendum enim maximè hîc est, ne magna aquæ copia vno tempore effluat; poterit autem mediante siphone bis terve in die educi mediocris quantitas; pluribus enim vicibus euacuatio instituetur, non enim nisi maximo cum periculo vniuersam aquam vna vel duabus vicibus eduxerimus, vnde præstat insumere in educatione aquæ decem vel duodecim dies. Sectionis loco, cauterium potentiale etiam adhibebimus, viamque aperiemus, deinde actuali locus erit, hinc foramen exiguum facilè scalpello tenuiori cuspide prædito, moliemur. Vesicatoria quoque medicamenta, scrotique scarificationes, fontanellæque in cruribus excitatæ hîc locum habent.

Magnæ vacuationes nequaquam fiant, ne virtus prosternatur ipsius iecoris, sed frequenter atque parcè vacuabimus, intercerdentibûsque diebus aliquot, roborabimus stomachum atque hepar iis quæ subiiciuntur medicamentis.

ROBORANTIBVS *hepar, & resoluentibus materiei reliquias.*

Troschisci de rhabarbaro, diacurcuma, dilacca, diarrhodon abbatis, diatrion sandali, theriaca vetus.

Syred.

Syr. de absinthio, eupatorio, cepillorum Veneris, de prasio.

Succus eupatorii, cuscute, absinthij, aqua cuscute, eupatorii, prasij, absinthij.

Conserua magna N. in principio mali mirificè opitulatur.

Decoctum guaiaci, radicum cynæ, sarsæparillæ.

Rhabarbarum, eupatorium, cuscuta.

Fomentatio ventris fiat ex decocto florum camomillæ, meliloti, foliorum lauri, origani, rorismarini, saluiæ, calamiuthæ, maioranæ, anethi, pulegii, sulfuris, aluminis, fiatque decoctio patim in lixiuo, partim in vino albo; ne autem refrigescat, subinde lapides ignitos impones, dolium autem aliquod ita commode aptabis, ut ventri applicari possit.

Sacculus paretur ex sulfure, sale atque arena, baccis foliisque lauri, seminibus aniû, ventrique applicetur.

Balnea naturalia, sulfurata, salsa, vel artificialia, ex aqua in qua decocta sint radices ireos, bryoniæ, hyssopus, maiorana, pulegium, calaminthum, rosmarinus, feniculum, ruta, camomilla, anethum, bacca lauri, iuniperi, sulfur, sal. hisce resoluendi facultas inest satis quidem valida.

Thermæ siccæ. Cochleæ tritæ ventri accommodentur emplastri modo.

Vesicatoria fiant in diuersis locis ipsius ventris ex fermento, cantharidibus, aceto forti, & per decem horas supraponantur, vesiculæque ubi excitatæ fuerint, aperiantur, & conseruentur apertæ per quadraginta vel sexaginta dies, superponendo folia brassicæ, quæ inungentur butyro vel oleo, grano ciceris, aut ceræ momento foramini imposito. scarificabimus quoque scrotum atque femur tumefactum audacter, vulnusculæque faciemus parua. fontanellam quoque in tibia quatuor digitos supra talum excitare poterimus, ad modum quo venæ aperti solent.

Unguentum Agrippæ, oleo anethino liliorumque addito.

A a ij

Emplastrum de baccis lauri, radice cyperi, stercoréque caprino aut vaccino sicco addito.

THEORICA ET EMPIRICA MEDICAMENTA nobilia in ASCITE, sæpius cum summa salute plurimorum egrotorum à Gualtero Bruele experta.

CVRATIO ASCITIS.

℞ radicum cyclaminis, ebuli, asari ana ʒ se. foliorum mercurialis, brassicæ marinæ, eupatorij, absinthij, pullegij, ana m. j. seminum carui, petroselini, genistæ, anisi ana ʒ iiij. polypodij quercini, senæ Alexandrinæ ana ʒ se. florum genistæ m. j. coquantur in aqua q. s. ad lb j. colaturæ addatur diaturbith cum rhabarbaro ʒ v. benedictæ laxatiuæ ʒ iiij. olei rutacei, irini ana ʒ j. se. salis communis ʒ j. fiat *Clystère*. eo sæpius vtetur.

℞ syrupi de quinque radicibus, de eupatorio ana ʒ j. endiuia, acetosi compositi ana ʒ se. aquarum cuscutæ, cichorei, raphani, vini clari ana ʒ iiij. fiat *Iuleb*.

℞ radicum ebuli, rubiæ tinctorum, asari ana ʒ j. fœniculi, petroselini ana ʒ se. cuscutæ, eupatorij, endiuia, betonica, scolopendriæ, absinthij ana m. j. glycyrrhizæ rasæ ʒ v. passularum enucleatarum ʒ ij. seminis carthami contusi ʒ j. senæ Alexandrinæ ʒ j. se. polypodij quercini ʒ v. agarici albi & leuis ʒ ij. se. seminis fœniculi, dauci, melonum ana ʒ j. florum genistæ m. se. zinziberis, cinnamomi ana ʒ j. coquantur in aqua q. s. ad lb j. se. colaturæ adde syrupi Byzantini ʒ iiij. aceti squillitici ʒ ij. sacchari albissimi ʒ j. fiat *Potio*.

℞ diacatholiconis ʒ iiij. diaturbith cum rhabarbaro ʒ se. agarici trochiscati ʒ se. aquarum eupatorij ʒ iiij. fiat *Hausus*.

℞ pillularum de rhabarbaro ʒ ij. aggregatiuarum ʒ j. sem. elaterij gr. iiij. succi radicum ireos q. s. fiant
Pillule

Pillule octo numero.

℞ hieræ diacolocynthydos 3 j. pillularum de rhabarbaro ꝓ se. oxymellis compositi q. s. fiant *Pillule*.

℞ pillularum de euphorbio, aut de mezereo ꝓ ij. se. de rhabarbaro ꝓ j. syrupi de eupatorio 3 j. aquarum eupatorii 3 iiij. hat *Haustus*: hic syrupum & aquarum addimus vt citius operationem perficiat.

℞ dialaccæ, diacurcumæ ana 3 iiij. nucis muscatæ, seminum petroselini ana ꝓ ij. glycyrrhizæ rasæ ꝓ j. syrupi de absinthio, de eupatorio ana q. s. ad *Electuarij* mollis consistentiam.

℞ specierum diarhodonis abbatis, trochiscorum de eupatorio ana ꝓ ij. succi radicum ireos 3 vj. aquæ mellis 3 iiij. fiat *Haustus*.

℞ rhabarbari electi ꝓ ij. mastiches, spicæ, rosarum, laccæ ana ꝓ j. foliorum laureolæ siccatorum, & infusorum in aceto 3 j. agarici albi & leuis, turbith ana 3 sem. euphorbij pistati gr. vj. lumbricorum terræ exiccatorum ꝓ j. puluerisentur omnia subtiliter, addendo elaterij ꝓ se. succi radicum ireos 3 j. sem. sacchari albissimi in aqua endiuizæ & cichorei ana q. s. dissoluti, fiat arte *Electuarium* in tabulis.

℞ diarhodonis abbatis sine moscho, dialaccæ, rosatæ nouellæ, trochiscorum de rhabarbaro ana 3 sem. sacchari albissimi dissoluti in aqua cichorei & eupatorii ana q. s. fiat *Electuarium* in tabulis.

℞ trochiscorum alkekengi ꝓ j. carnis erinacei in sole exsiccatæ ꝓ ij. se. radicum asari ꝓ se. oxymellis squillicici 3 j. decocti radicum raphani, ebuli, glycyrrhizæ 3 iiij. fiat *Potus* diureticus.

Vomitus in principio mali si prouocetur, plurimum iuuabit; ab eo tamen abstinendum erit vbi morbus multum increuerit.

℞ radicum asari, aristolochiæ rotundæ ana 3 j. sem. rutæ, lupinorum, petroselini, cumini ana 3 ij. cicerum rubrorum 3 j. succi panis porcini, brassicæ marinæ ana 3 sem. laureolæ, thymelææ ana 3 iiij. olei scorpionū 3 j.

Aa iiij

ceræ q.s. fiat *Linimentum* pro regione renum, umbilici, atque vesicæ.

℞ vnguenti Agrippæ ℥ j. se. arthanitæ ℥ j. martiatī, olei nardini, scorpionum ana ℥ se. succi rutæ 3 iiij. aquæ vitæ ℥ se. aceti guttas aliquot, fiat *Vnguentum* arte.

℞ radicū ebuli ℥ j. se. bryoniæ, ireos ana ℥ j. baccharum lauri 3 vj. florum camomillæ m. ij. seminum anisi ℥ j. coquantur in aqua & vino q.s. ad mollitudinem, addendo rebus pistatis farinæ lupinorum, cumini ana ℥ j. se. sulfuris ℥ j. stercoris vaccini vel caprini 3 vij. mellis q.s. fiat *Cataplasma* molle pro ventris regione.

℞ emplastri de baccis lauri 3 j. se. vnguenti Agrippæ, radicū ebuli ana ℥ se. stercoris vaccini, columbini ana 3 ij. sulfuris vini 3 iiij. se. cum vrina infantis & melle q.s. fiat pro ventris regione vt prius *Cataplasma*.

APPENDIX

ad prædicta pro curatione ASCITIS
inseruiens.

Omniū primò humores hîc bene concoquantur. Denum quæ aquosos potius quàm alios humores, absumere è corporeque propellere possunt, præscribantur, quibus ea addentur quæ iecur confortare, eiûsque intemperiem emendare possunt, id quod fieri poterit tam sumptis quàm admodis medicamentis. Quæ omnia nunc anteaquæ dictis medicamentis felicissimo cum successu consequi poterimus, modò universalialia particularibus debita ratione applicentur. Deinde symptomata emendanda sunt, vt sunt sitis, partium corporis tumores, urine difficultates, aliæque si quæ urgeant accidentia grania. Cataplasmata autem atque vnguenta ventri cautè sunt applicanda; iecoris enim regionem ne attingant diligenter cauendum est. Pro tibiis inflatis, balneum fiat cum lixiuio factò de cineribus caulium, vitis, ficus, radicū asphodellī, alumine sale communi. Hinc fiat *Cataplasma* cum stercore caprino, vaccino, ficubus, vino. In tympanite, quæ flatibus validè distendere possunt, præscribantur, eaque ratione emplastra multum calefa-

calefacientia atque exsiccantia imperentur, ut est emplastrum de baccis lauri, de stercore caprino, vaccino, sulfure, oleo rutaceo, baccis lauri. Anasarca, purgantibus medicamentis, vomitumque cientibus, curabitur. Hinc balneis, stuphisque siccis, ii, que que sudorem mouere possunt, curabitur. Si vires quoque constant, & si malum fiat à mensium hæmorrhoidumve suppressione, venam secare licebit in anasarca; nequaquam autem admittetur in tympanite, nec in ascite etiam si urina maximè intensum colorem habeat, cum si hepatis intemperies frigida magis augeatur. Si verò ascites periculum impendeat ob mensium, hæmorrhoidumve suppressionem, tunc secanda erit vena, ne ad iecur regurgitet materia noxia, unde iecur tandem obrueretur.



Methodus pro cognitione

CALCVLI INSER- VIENS.

CALCVLVUS renum, est substantia quædam dura toto genere præter naturam, instar lapidis vel tophi in substantia finibusve ipsorum renum genita, unde urinæ impetu sæpe per angustos vieteres in vesicam defertur, si non nimium magnus fuerit, qui maximo cum dolore meatus urinarios dilatando & quasi dilacerando excruciat, si subsistere propter magnitudinem contingat & inæqualis existat: quemadmodum autem illi non semper vnus est color formaque vna, sic nec vna semper magnitudo, aliquando enim in renibus lapides gignuntur parui, subinde maiores, aliquando numero plurimi, nonnunquam pauci, qui frequenter multum variant tum forma, tum asperitate, tum colore. A colico dolore hoc differt malum, cum ille plerumque per omnem ventris regionem euagetur. In hoc

A iiij

verò malo, dolor quasi fixus est. A materia autem efficiente hoc malum nomen habet.

PARS AFFECTA. Renes affectos esse indicabit ipse dolor cum positu, in renum enim loco quasi stabilis dolor, iugiter sæpe affligit, in dextro quidem latere aut sinistro, aut utroque, prout ren dexter vel sinister vel uterque affectus erit. Generantur autem calculi, aut in renum stomacho sinibusve, vel in carne eorundem, substantiave. Aliquando etiam generantur calculi in iecore, pulmone, intestinis, iuncturis, aliisque corporis partibus, sed frequentius multo generantur in vesica atque renibus, de quibus potissimum hîc sermo est.

SIGNA. Magnum concurrit sæpe cibi fastidium, frequentes etiam eduntur ructus, dolor vrget in loco renum sæpe acerbissimus, cum in urinarios meatus illabitur calculus, vel cum ita sedem mutat intra renem, ut membranam attingere possit, dolorque tunc potissimum intenditur, cum motibus vehementioribus corpus exercetur, spinamque crebrius inflectit æger, dolor autem hic tactus haudquaquam exacerbatur, uti fit dolor à catarrho decumbente fiat. sæpe quoque ita vrget lapis cum sibi exitum parat, ut infixi aculei sensum exhibeat, quamdiu verò quiescit, dolor grauans potius quam punctorius sentitur in rene incumbens, qui magna ex parte stabilis & fixus est, qui subinde etiam ad testem proximum & aliquando etiam ad coxendicem excurrit, excrementa alui magna ex parte detinentur, unde dolor in renibus augetur, eò quod tunc etiam à facibus vel flatibus comprimantur renes: nausea quoque concurrit, & ad vomitum irritatio, doloribusque incrementibus, nausea maior oritur, tandem etiam vomitus pituitæ, hinc bilis flauæ, subinde etiam æruginosæ sequitur, unde dolores mitescunt, renes equidẽ ventriculo copulantur mediante peritoneo. Dolores quoque ex decubitu in partem aduersam & ex sumpto alimento in-

increſcunt, vti acceſſiones minuuntur, ſi cibo vacuus ſit æger, etiam ſi per inediaſ affectus non tollatur. ægrè ſpina inflectitur, nulluſque circa locum affectum tumor eſt perſpicuus. crus atque femur quòd è directo lateris affecti eſt, ſæpe obtorpeſcit propter compreſſionem neruorum, eiſdemque lateris teſticulus quaſi retrahitur; contingit equidem quòd teſtes atque crura renibus conſentiant mediantibus venis, arteriis atque neruis, qui dorſo iucumbunt, & per dictas corporis partes transfunduntur. Vrina tempore paroxyſmi tenuis & pauca eſt, ſæpe quoque hinc fit ſanguinolenta, potiffimum tamen poſt equitationem & laborem, & dum calculus è renibus transfertur. Et ſi lapis vrinarios meatus obſtruat, maximus dolor, potiffimum ſi aſper ſit, excitatur. Remeante autem in renem calculo, aut ſi ex meatu vrinario in veſicam protrudatur, craſſa magnaque copia profluit vrina, cum qua aliquando arenulæ inæqualésque calculi educuntur. Contingit autem frequenter, quòd ij qui diu obnoxii fuerunt huic malo, craſſam ſubrubrâque vrinam reddant, quæ aliquando etiam turbida permanet, aliàs verò ſedimentum arenolum, rubrum atque viſcoſum deponit. talis vrina ſæpe redditur per plures meſes & annos abſque aliquo vitæ incommodo: nec mirum, cum etiam calculi mediocriter magni in renibus mortuorum frequenter inuenti ſint, abſque vlla moleſtia in dorſo habita antè. Cum in veſica lapis obhæret, dolor in pubis regione, & pruritus in canali virgæ percipitur, commune vtrique malo, eſt vrinæ retentio, quam æger ſæpe profundere parturientium modo laborat, dolor quoque punctorius concurrit.

CAVSA calculi eſt arenola calculoſa que renum conſtitutio, concurrente ſæpe renum immodico calore, & maxima quoque ex parte, craſſorum viſcidorumque humorum copia.

PROGNOSTICA. Rariùs hoc malo moleſtantur qui ſolutam aluum habent, frequentérque vomunt,

Difficillimam curationem recipit in sene calculus renum; estque senibus magis frequens tormentum quam pueris, cum hi in vesica hunc potius experiantur. Corporibus quoque crassioribus rarius hoc malum insidiatur. A parentibus autem prolibus hoc malum sæpe imprimi solet. Leves rotundique calculi facilius excluduntur quam longi atque asperi. Minimo etiam calculo multum ægri cruciantur, dum per vrinarios meatus propellitur, qui antea hoc malo non laborarunt. Magna ex parte renum calculi subrubri, subinde quoque albi sunt, dum pure renes perfunduntur. In viventibus autem sæpe calculi præsentia in renibus deprehensa est, sola sanguinis mixtione, nullo alio concurrente incommodo, in quibus contingit aliquando quod præter omnem opinionem in tali casu dolor excitatur omnium acerbissimus; contingit quoque hunc dolorem redire post longa aliquando intervalla, quasi per periodos quasdam. A renum calculo, renum vlcus sæpe originem habet; ille enim suo attritu renes quasi exedit comminuitque; tunc autem magna ex parte cruenta vrina purulentam præcedit absque vlla febre, renum quoque calculus facilius comminuitur quam vesicæ; propter loci distantiam duritiemque quam in locis illis lapis ille inducere solet; ex utroque tamen periculum impendet, ne ex urinæ suppressione aut apostema, quod ex dolorum sæpe sæuitia excitari solet, aut morbus irruat; adde quod vesicæ calculus si magnus sit, non nisi sectione tollitur.

Metho-



Methodus pro curatione

**CALCVLI INSER-
VIENS.**

Perficitur autem subsequentibus remediorum generibus.

VICTVS RATIONE.

A Er lucidus atque temperatus conuenit.
Cibus. Carnes conueniunt vitulinæ, agninæ, a-
uicularum, sintque potius elixæ quàm allatæ. Mode-
ratè autem sumat alimentum; satietas equidem non
solùm exasperat malum præsens, sed etiam morbum
hunc generat frequenter. Lacticinia, omniâque vi-
scosa vitentur.

Potus. Vinum mediocre conuenit, nec non ptisana, iu-
scula carniû.

Exercitium in hoc malo conuenit admodum modera-
tum.

Somnus solito admittatur diutius.

Excrementa alui respondeant quotidie. Plurimum au-
tem præseruationis causa, proderit semel in mense su-
mere 3 x. cassiæ recenter extractæ cum iusculo car-
niû, in quo semina alkekengi decocta sint.

Animi perturbationes vitentur.

PRÆPARANTIBVS.

Syr. de duabus vel quinque radicibus.

Syr. Byzantinus.

Acetosus simplex.

Oxymel simplex.

Aqua saxifragiæ, betonicæ, pulegii, calaminthæ.

VACVANTIBVS.

Clystere ex decocto radicum althææ, seminum anisi,

foeniculi, carui, florum camomillæ, meliloti, anethi, maluæ, violarum, ficuum pinguium, benedicta laxativa, oleo anethino, camomelino, scorpionum, butyro recenti; oleo amygdalorum dulcium, cassia fistula additis.

Diacatholicum, electuarium eleuscopi, benedicta laxativa, hiera picra.

Cassia fistula alternis diebus cum decocto communi detur.

Rhabarbarum, agaricus.

Vomitorium medicamentum.

Suppositoria.

Venæ sectio fiat cubiti lateris dolentis, si corpus sit plethoricum, inflammationisque periculum ex incursu humorum cum dolore acerbissimo, virgeat.

Clysteribus potius tempore paroxysmi utemur quàm medicamentis per os sumptis, dolorem equidem citius leniunt, cum subito onere inutile intestina renesque leuent. integris quoque quasi viribus ad renes perueniunt emollientium doloremque sedantium vires; unde grauitas dolorque lumborum mitescit manifestè; parua autem sit quantitas quæ iniicitur, ne copia renes comprimantur.

RELAXANTIBVS *meatus urinarios, dolorémque mitigantibus.*

Clystere prædictum, aut ex solo oleo camomelino, addita cassia fistula.

Iuscula pingua carniū sæpe sumantur, in quibus althæa, malua, butyrum incoquantur.

Terebinthina cum nuce muscata permixta detur, postea haustum vini albi ebibat.

Fomentatio fiat cum aqua in qua folia althææ, furfures, camomilla, semina anisi, foeniculi, carui sint decocta.

Balneum ex decocto seminum lini, fœnugræci, florum camomillæ, meliloti, maluæ, radicum althææ.

Vn-

Vnguentum pro renum regione ex oleo liliorum, amygdalorum dulcium, violarum, camomillæ, axungia gallinæ, butyro recenti.

Vnguentum Agrippæ, dialthææ.

Cucurbitulæ secundum ductum vasorum diureticorum applicentur; idque vna post aliam, ad pubem descendendo oblique; adeo enim coaceruatim mouent lapidem, vt dolores repente supprimantur, lapide nimirum in vesicæ amplitudinem transuecto.

Cataplasma ex floribus camomillæ, meliloti, farina lini, fœnugræci, tritici, lupinorum.

DVCENTIBVS urinam, lapidēque comminuentibus & expellentibus.

Lithontripon cum terebinthina lota, aut cum decocto radicum graminis, fœniculi.

Elect. Iustinum, de cineribus scorpionum, dialacca.

Decoctum ligni guaiaci. Scorpionum cinis, mandibulæ lucii piscis, testæ ouorum ex quibus pulli exclusi sunt.

Conserua magna nostræ descriptionis mirabiliter in præseruatione valet.

Conserua radicum apii, raphani, nasturtii aquatici, terebinthina in latere candente vsta, persicorum nuclei & ceraforum.

Sanguis hirci adhuc calens, cui, ne in grumum concre scat in ventriculo, coaguli aliquid adiicietur.

Puluis leporis cum pelle exiccatus in furno, fructus alkekengi contusi, vinôque percolentur, lapis Iudaicus.

Motacilla auiculæ, emperum, semina saxifragiæ, pimpinellæ, rusci, fœniculi, petroselini, raphani, milii solaris, genistæ.

Decoctum raphani, cicerum rubrorum, petroselini, rusci, asparagi, malux, fœniculi, apii, artice, saxifragiæ, radicum graminis.

Cortex raphani acerrimi contusa, vinôque albo macerata.

Flores genistæ in oleo camomelino macerentur, & insolentur.

Oleum de cerasis, oleum scorpionum simplex: hisce varetur medicamentis cum sumit quod calculum frangit.

Cucurbitulæ prædicto modo applicatæ.

Balneum sulphureum.

Syringa, vrina si subsistat, educi poterit; scamino autem infideat, genuaque dilatat, cum qua quoque immitti poterit diureticum aliquod medicamentum; vt oleum scorpionum, postquam excreta erit vrina. Cum autem vrinam educere vis, filum duplicatum per syringæ concauitatem traducatur, eiusdemque fili extremitate pauxillum lanæ aut cottonis fortiter alligetur; ita vt concauitatem syringæ subire possit, dum altera fili extremitate introducitur; non poterit enim non subsequi vrina, si commodè in virgam mittatur, filumque trahatur.

Priusquam medicamenta lapidem comminuentia exhibeantur, dolor mitigari debet, corporisque sentina expurganda est; alioqui enim humores circumiacentes, cum medicamentis diureticis lapidemque comminuentibus, ad partes affectas deferentur; paulatim autem comminuere debemus lapidem inueteratum.

THEORICA ET EMPIRICA MEDICAMENTA nobilia, in CALCULO sæpius cum summa salute plurimorum egrotorum à Gualtero Bruel experta.

CVRATIO CALCULI.

℞ radicū petroselinī, althææ, aristolochiæ rotundæ ana ℥ β. foliorū betæ, maluæ, mercurialis ana m. j. fufurum ℥ j. florum camomillæ, meliloti ana m. j. β. seminum genistæ ℥ iij. fructuum alkekengi ℥ v. seminis lini, fœnugræci ana ℥ iij. ficus pingues octo numero, coquantur in aqua q. s. ad lb j. colaturæ addatur electuariū
elect

elefcoopi ꝑ j. benedictæ laxatiuæ 3ß. olei rutacei, camomelini ana 3 j. ß. olei fcorpionum 3 vj. terebinthinæ Venetæ 3ß. falis communis 3 j. fiat *Clystere*. Reddito clysteri, capiat per os olei amygdalorum dulcium 3 ij. vini maluatici 3 iiij. fiat *Haustus*.

R^z olei camomelini, olei seminum lini ana 3 v. amygdalorum dulcium 3 ij. rutæ 3 j. ß. fiat *Clystere* anodynum, sæpius autem dari debet, aut eius loco sumi poterit solum oleum oliuarum.

R^z foliorum maluæ m. ij. parietariæ m. iiij. arthemisiæ, rutæ, hypericonis ana m. ß. radicum fœniculi, petroselini ana m. iiij. ß. florum camomillæ, meliloti ana m. ij. ß. seminum lini, fœnugræci ana 3 iiij. fiat *Balneum*.

R^z radicum althææ 3 j. foliorum maluæ, althææ ana m. j. ß. furfurum, florum camomillæ, meliloti ana m. ij. ficum pinguium numero octo, seminum lini, fœnugræci, anethi ana 3 j. ß. coquantur in sufficienti quantitate aquæ ad tertiæ partis consumptionem, fiat *Fomentatio* pro renum & vesicæ regione.

R^z olei liliorum alborum, adipis humanæ ana 3ß. olei camomelini 3 j. olei de nucleis persicorum 3 vj. pro dorso fiat *Unguentum*.

R^z parietariæ m. iiij. florum camomillæ, meliloti ana m. ij. ficum pinguium numero decem, foliorum maluæ m. ij. seminum milii solis, lupinorum ana 3 v. coquantur in aqua q. s. ad mollitudinem, hinc pistentur, addendo farinæ lini, fœnugræci, hordei, tritici ana 3ß. olei camomelini, anethini, butyri recentis, adipis cuniculi ana q. s. croci 3 j. fiat *Cataplasma* doloris sedatiuum.

R^z aquæ calidæ 3 iiij. olei crudi 3 j. syrupi acetosi simplicis 3 j. ß. misceantur, fiat *Potio Vomitoria*, maxime quidem dolorem lenire solet.

R^z seminum anisi, milii solis ana 3 iiij. radicum fœniculi, petroselini, althææ ana 3 j. seminum apii 3ß. glycyrrhizæ rasæ 3 vj. ligni guaiaci 3 j. ß. foliorum maluæ,

summitatum althæe ana m. j. ꝑ. fructuum alkekengi numero quatuordecim, ficuum pinguium, prunorum damascenorum ana numero vj. vuarum passarum ab acinis mundatarum ꝥ ꝑ. foliorum maluæ, violarū, florum buglossæ, boraginis ana m. j. quatuor seminum frigidorum maiorum ana 3 j. turbith albi & gummosi, agarici albi & leuis ana 3 j. ꝑ. coquantur in aqua q. s. ad lb j. ꝑ. colaturæ addatur electuarii elefcopi, benedictæ laxatiuæ ana 3 ꝑ. fiat *Potio*.

℞ cassiæ recenter extractæ 3 j. sumat ante cibum media hora cum decocto glycyrrhizæ, prunorum damascenorum, vuarum passarum. Per biduum autem antequam medicamenta quæ lapidem comminuunt & educunt, propinetur hic *Haustus*.

℞ electuarii elefcopi, benedictæ laxatiuæ ana 3 iiij. ꝑ. diaturbith cum rhabarbaro 3 j. ꝑ. sacchari albissimi q. s. fiat *Bolus*.

℞ electuarii elefcopi 3 iiij. ꝑ. cassiæ recenter extractæ 3 ꝑ. seminis petroselini, nucis muscatæ ana 3 j. aquæ florum fabarum 3 iiij. fiat *Haustus*.

℞ radicum filipendulæ 3 ꝑ. rubiæ tinctorum 3 ij. radicū althææ 3 ꝑ. cicerum rubrorum m. j. ꝑ. seminum iuniperi 3 ꝑ. seminum anisi, foeniculi, dauci ana 3 j. seminum alkekengi 3 v. florum keiri m. j. seminis carefolii 3 ij. vuarum passarum mundatarum 3 ꝑ. glycyrrhizæ rasæ 3 iiij. fiat decoctio in aquæ & vini Rhenensis equali quantitate ad lb j. ꝑ. colaturæ addatur sacchari parum, fiat *Potio*.

℞ sanguinis hirci præparati 3 j. gummi tragacanthi 3 ꝑ. milii solis, corticum ouorum è quibus pulli egressi sunt ana 3 j. nucis muscatæ 3 j. fiat *Pulvis*, sumatur quatuor vicibus cum portione præscripta.

℞ milii solis 3 ij. seminis petroselini Macedonici 3 ij. anisi, foeniculi, leuistici, baccarum lauri ana 3 j. piperis longi, saxifragiæ, dauci ana gr. quindecim, macis 3 ij. ꝑ. fiat *Pulvis*.

℞ *Spe-*

℞ specierum electuarij dulcis ꝑ ij. pulueris reginæ, lithontripi ana ꝑ i. specierum diatrii sandali sine camphora, pulueris electuarii de baccis lauri ana ꝑ sc. seminis saxifragiæ, nucis muscatæ ana gr. v. croci gr. iii. cinnamomi 3 sem: sacchari albissimi dissoluti in aqua catdui benedicti q. s. fiat *Electuarium* in tabulis, dosis 3 i. se.

℞ cicerum rubrorum ꝑ i. se. seminum genistæ, petroselini, dauci, milii solis ana 3 ii. macis 3 i. fiat *Puluis*.

℞ seminum genistæ 3 ii. radicum saxifragiæ 3 iii. specierum lithontripi 3 se. pulueris glycyrrhiæ 3 se. fiat *Puluis*, dosis 3 i. cum succo fœniculi, petroselini, vino albo ana ꝑ i. se. fiat *Haustus*.

℞ milii solis, seminum apii, cucumeris: alkekengi ana 3 iii. chamædryos, cicerum rubrorum, saxifragiæ ana 3 i. cineris scorpionum 3 i. fiat *Puluis*, detur 3 i. cum aqua destillata ex herbis diureticis.

℞ olei keirini ꝑ i. scorpionum, camomillæ, anethi ana ꝑ sem. pinguedinis hirci ꝑ ii. ceræ parum, fiat *Lini-mentum*.

℞ olei lini, lilorum alborum, adipis humanæ ana ꝑ se. olei camomelini, scorpionum ana ꝑ i. fiat *Vnguentum*.

℞ vnguenti Agrippæ ꝑ i. olei scorpionum ꝑ se. olei de nucleis persicorum 3 iii. misceantur, fiat *Vnguentum*.
Emplastrum fiat ex materia eorum quæ in fomento ponuntur, addendo oleum lini, camomelinum, butyrum recens aut maiale, pinguedinem gallinæ.

APPENDIX

ad prædicta pro curatione CALCVLI
inseruiens.

Omniū primò clysterio conuenienti aluus subducenda est, idque bis in septimana; quibus ea etiam addemus quæ dolorem lenire, flatusque discutere possunt. Cauendum autem unicè ne validiores offerantur clysteres; iis equidem humorum copia maior ad intestina trahetur, unde meatus urinarij comprimi possent; hinc venam secabimus si ratio dicat. Interim anodynis

B b

medicamentis tam intrò quàm extra adhibitis, dolorem mulcebi-
mus, hinc quæ humores concretos emollire, meatúsque renibus
adiacentes ampliare possunt, imperabuntur omni ratione, uti est
balneorum, insculorum pinguium, necnon cataplasmatum usus;
sic equidem postea cum diureticis medicamentis arenulae nec non
calculi faciliùs expellentur. Postquam autem dolor remissus, hu-
moresque concreti, emolliti, meatúsque ex parte reserati erunt,
quæ lapidem comminuere atque expellere possunt medicamenta
administrabuntur. & non ante. Priusquam tamen hæc offeran-
tur medicamenta, consultum est offerre, modò corpus sit plethori-
cum, aliquid quod ventriculum, intestina, urinariosque meatus
purgare possit; periculum enim est alioqui, ne humores dictis lo-
cis conclusi, ad renes unà cum medicamentis lapidem commi-
nentibus, diducantur, sicque dolorem augeant. Postea institue-
tur etiam enema cum hiera picra, lithontripo, electuario ele-
scopi, benedicta laxativa, oleo rutaceo, camomelino. Tandem
per os ea propinabimus etiam medicamenta quæ calculum pro-
pellere possunt. Quæ omnia nunc anteaquæ dictis medicamen-
tis felicissimo cum successu consequi poterimus, modò universa-
lia particularibus debita ratione adhibeantur. Vti autem
calculus renum & vesicæ magnam convenientiam habent ra-
tione causarum atque generationis, sic quoque in ratione cu-
randi quasi conveniunt. Paulò tamen validiora præscriben-
tur in vesicæ calculo remedia, eò quòd magis duram plerumque
habeant substantiam, & per remotiora loca traduci debent me-
dicamenta. Ventriculus autem roborabitur cum oleo macis, men-
thæ, absinthij, rosarum. Si ardor magnus in renum regione mo-
lestus sit oleo violaceo aut rosaceo inungentur, quibus parum a-
ceti addemus. In vesicam autem calculus illapsus si sit, medica-
mentis que ob magnitudinem excludi nequeat, excindendus est.

Methodus

*Methodus pro cognitione*DIABETES INSER-
VIENS.

DIABETES est proprium renum vitium, & velox exitus per urinarios meatus, eius quod potatum est, eo à sua qualitate non mutato, siti inexhausta concurrere. Seu est affectio diuturna circa renes consistens multum potum inducens, una cum hoc, quod quicquid bibitur, simul ut acceptum est, per urinas nihil ferè immutatum, exuberanter reicitur, quasi solummodò colaretur per fenes.

PARS AFFECTA. Ren uterque hinc afficitur: id quod patet ex actione læsa; expurgant equidem venosum genus renes à sanguine seroso, imò in hoc morbo quasi vi rapiunt à partibus vicinis; venæ autem hac ratione exiccatae, ab hepate trahunt, & sic per continuum ordinem etiam à ventriculo, eaque ratione potum continuo homo expetit, cuius initium à renibus procedit, proptereaque diabetes, renum est affectus. Accidit autem renibus idem hinc quasi quod accidit ori ipsius ventriculi in canina appetentia; attractrix equidem renum facultas immoderate trahit; retentrix verò tam imbecillis est, ut retinere nequeat humorem attractum donec alteretur, unde à qualitate sua non mutata, redduntur ea quæ bibita sunt. Est ergo symptoma in genere excrementorum immodicè.

SIGNA. Manifesta sentitur in renibus caliditas, sitis hinc sæpe usque eò pertinax concurrit, ut nulla satietas ex humore assumpto contingat; imò cum clamore quandoque assidue potum assumere coguntur, nec tamen satiatur, eò quod euestigiò citissime per lotiū reddatur id quod potatum est, parum aut nihil mutatum. Si autem pertinaciter reuere urinam laboret, testes intu-


B b ij

mescunt, nec non lumbi atque coxæ magnus calor in intimis partibus percipitur, ita ut illis vri viscera videantur, eò quòd aquosa sanguinis humiditas, à qua temperari debebat sanguis, à renibus attrahatur; imò tandem etiam partium solidarum humores attrahuntur à renibus, tandemque caliditate incrementum in visceribus sumente, tabes corporis accedit; corpus enim consumitur ac veluti liquefcit.

CAUSA. Sæpius est immoderata renum intemperies calida, cui retentricis facultatis imbecillitas quoque coniungitur. Aliàs idem malum quoque fieri obseratum est ab humoribus acerrimis renibus imbibitis, bile nimirum acri, fit quoque à pituita multum salsa. Aliàs etiam fit à venenosa materia præsens hoc malum; aliquando enim perniciosa qualitas sanguini aut humoribus permista in renibus figitur. A potu quoque copiosiore vini, præsertim tenuis, frequenter vrina redditur; de eo tamen malo nihil hîc agimus, modò non concurrat sitis immodica.

PROGNOSTICA. Totius corporis ficcitas atque tabes tempore sequitur, cum non solum humores venarum, sed totius corporis attrahere renes in hoc malo contingat, ob earundem partium immodicam caliditatem. Erit in iuvene malum curabile, in sene verò difficulter curabitur. Rursus, si recens malum fuerit, curari poterit; inueteratum autem si euaserit, vix quoque curabitur. Subitò autem hoc malum increfcit, ita ut eius principium atque incrementum vix percipiatur, antequam ad statum peruenerit, vnde subitò quasi videtur aduenire. Hâcque ratione difficulter curatur; quòd non facile in initio deprehendi queat. ardenti feбри hoc malo laborans si corripitur, incurabile est; propterea quòd humor radicalis immodicè exhauriatur à duabus causis validissimis.

Methodus



Methodus pro curatione

DIABETES INSER- VIENS.

*Perficitur autem subsequenter remedium
generibus.*

VICTVS RATIONE.

A Er ad frigidum declinet atque humidum.
Cibus. Ea quæ bonum succum, interim crassum ge-
nerare, humorumque acrimoniam temperare pos-
sunt, præscribantur, iisque satis liberè alatur, ad frigi-
dumque non nihil arte declinent. Lac amygdalorum,
oua sorbilia, ptisanæ succus, pisces saxatiles, poma,
pyra, oryza, caseus recens non salitus. Caro bouina,
porcina macilenta & bene cocta, vitulina. Inter olera
conuenit intubus, lactuca, portulaca. Ab iis quæ vri-
nam incitare possunt, abstineat, & ab omnibus acri-
bus atque falsis.

Potus. Vinum astringens meracius, succus granatorum,
succus ribes cum decocto intubi, lactucæ, myrti-
lorum.

Exercitium inhibendum; quies enim humorum motum
componit.

Somnus admittatur consuetudo diutiùs.

Excrementa alui arte aut natura respondeant.

Animi pathemata immodica euitentur.

PRÆPARANTIBVS.

Syr. papauerinus, de acetositate citri, nenupharinus, bu-
glossæ.

Syr. violaceus, rosaceus, myrtinus, de succo acetosæ, de
rosis siccis.

Bb iij

Aqua portulacæ, violarum, nymphææ, intubi, acetosæ, plantaginis, buglossæ.

Decoctum radicum & florum nenupharis, plantaginis, saccharo addito.

VACVANTIBVS.

Venæ sectio fiat in cubito in mali principio, idque moderate; præter enim quàm quòd reuellat, etiam plurimum in hoc malo ardorem temperat; non autem si inueteratum malum sit, vena secabitur: eò quòd magis corpus tunc inde incendatur, adde etiam quòd vires debiles nimium imminuantur.

Manna, cassia, tamarindi.

Syr. de multiplici infusione rosarum,

Diaprunum simplex, diacatholicum.

Rhabarbarum.

Clystere ex aqua in qua decocta sint folia violarum, althææ, maluæ, pruna Damascena, addendo oleum violarum, cassiam recenter extractam.

AVERTENTIBVS.

Venæ sectio.

Vomitum cum oleo & aqua tepida procuretur.

Frictiones fiant brachiorum, capitis scapularumque.

Sudoris prouocatio.

Diuerfiones hîc admodum conuenire, experientia constat.

SISTENTIBVS motum serosæ partis ipsius sanguinis.

Elect. fiat ex cornu cerui vsto, rosis rubris, balauftiis, seminibus plantaginis, cydoniorum, portulacæ, acetosæ, intubi, hypocistide, myrobalanis citrinis, bolo Armeno, corallo, camphora, saccharo rosato, syr. myrtino, gummi Arabico, syr. violarum.

Decoctum quoque rerum prædictarum in vino rubro stipitico fieri poterit: colaturæ autem si addatur 3 j. myrobalan-

robalanorum citrinorum, præstans fiet sic medicamentum.

Trochisci de spodio, de succo polygonii, de terra Lemnia, de camphora.

Theriaca, athanasia magna, diacydonites sine sp. saccharum rosatum antiquum.

Conserua florum nymphææ, rosarum, succus ribes, succus sanguinariæ cum vino adstringente.

Myrobalani conditi, caro ericii exiccetur in furno, dosis 3 j. cum vino rubro adstringente, murium esus.

Cataplasma pro pectine, & lumbis, & hypochondriis ex lactuca, parietaria, portulaca, vitis foliis, farina hordeacea.

Vnguentum ex oleo rosaceo, myrtino, aceto rosaceo.

Vnguentum rosatum M. Ceratum refrigerans Galeni.

Lanina plumbea perforata plurimis foraminibus, renum regioni applicetur, sæpiusque mutetur.

Emplastrum pro renibus ex malicorio, semine cydoniorum, bursa pastoris, farina hordeacea, portulaca, rosis rubris, bolo Armeno, gummi Arabico, oleo myrtino, rosarum.

CORROBORANTIBVS, *calidamque renum atque iccoris intemperiem emendantibus.*

Trochisci alkekengi cum vino astringente, aut aqua nussa.

Ptiana multum prodest.

Epithema pro hepate fiat ex aqua rosarum, nymphææ, iutubi, acetosa, aceto, corallo albo & rubro, sandalis albis, seminibus portulacæ, acetosæ, spica nardi, camphora.

Vnguentum pro renibus, pectine, hypochondriis atque lumbis ex oleo rosato, nymphææ, papauerino, myrtino, spica nardi, rosis rubris. Vnguentum infrigidans Galeni, populeonis, rosatum Mesuæ.

Sacculus ex floribus violarum, nymphææ, rosarum, semine iutubi, portulacæ, acetosæ, sandalis albis rubris.

B b iij

brisque, spica nardi, plantagine, cichoreo.

Ceratum sandalinum, cui subinde succum papaveris albi addimus, si magnus sit ardor in renum regione.

Cataplasma ex portulaca, rosis, farina hordei, seminibus papaveris, balauftis, sandalis, oleo myrtino, rosaceo, cydoniorum, lumbricorum terrestrium.

Emplastrum ex farina hordeacea, plantagine, rosis rubris, balauftiis, malicorio, hypocisthide, oleo myrtillorum.

CORRIGENTIBVS *accidentia.*

Colo adaptetur vesica suilla ante oleo emollita, hac arte ut quicquid elabatur urinae vesica excipiat.

Theriaca. Syr. de succo acetosæ.

Syr. granatorum, de agresta.

Priori ingenio efficiemus ne fœtor lecti, aut braccæ oriatur, quod alioqui fieri solet, cum omnia permingant in hoc malo ægri. Sitim autem posteriora sedant.

THEORICA ET EMPIRICA MEDICAMENTA nobilia, in DIABETE sæpius cum summa salute plurimorum ægrotorum à Gudzero Bruel experta.

CVRATIO DIABETES.

℞ radicum & foliorum althææ ana m. j. β. foliorum violarum, mercurialis, betæ, maluæ ana m. j. hordei mundati m. ij, rhabarbari electi ℥ β. myrobalanorum citrinorum ℥ iiij. seminum quatuor frigidorum maiorum ℥ j. coquantur in aqua q. s. ad lb j β. colaturæ adde diacatholiconis ℥ j. β. olei violacei ℥ iiij. fiat *Clystere.*

℞ syrupi nenupharini, rosarum ana ℥ j. s. myrtini, de succo oxalidis ana ℥ s. decocti plantaginis, myrtibum, sanguinaræ, violarum lb j. misceantur, fiat *Iuleb.*

℞ diacatholiconis ℥ iiij. syrupi de multiplici infusione rosarum ℥ j. s. cassiæ recenter extractæ ℥ i myrobalanorum

balanorum citrinorum \mathfrak{z} j. β . rhabarbari \mathfrak{z} β . aquarum acetosæ, violarum ana \mathfrak{z} j. β . fiat *Haustus*. aut,

\mathcal{R} pulpe cassiæ fistulæ recenter extractæ \mathfrak{z} v. pulpe tamarindorum \mathfrak{z} iij. rhabarbari electissimi \mathfrak{z} j. β . sacchari rosacei q. s. fiat *Bolus*. detur in aurora. Dissolui quoque poterit iusculo carniū si hac ratione magis gratum fuerit ægroto medicamentum.

\mathcal{R} radicū boraginis, buglossæ ana \mathfrak{z} j. β . plantaginis \mathfrak{z} j. foliorū violarū, plantaginis ana m. j. seminum plantaginis, portulacæ ana \mathfrak{z} iij. florum boraginis, violarū, nymphææ, buglossæ ana m. j. myrobalanorum florum \mathfrak{z} vj. coquantur in aqua ad lb j. β . colaturæ adde syrupi de multiplici infusione rosarū \mathfrak{z} ij. fiat *Potio*. Vnciis quatuor huius mixturæ, adde tempore vsus rhabarbari electissimi, myrobalanorum citrinorum ana \mathfrak{z} ij. detur in aurora.

\mathcal{R} conferuæ buglossæ, mieuæ cydoniorum ana \mathfrak{z} j. gummi tragacanthi in aqua rosarū soluti \mathfrak{z} iij. sanguinis draconis, boli Armeni ana \mathfrak{z} ij. β . misceantur cum syrupo de papauere q. s. fiat *Electuarium*.

\mathcal{R} cornu cerui vsti, carnis ericii in furno exiccatæ ana \mathfrak{z} β . seminum plantaginis, portulacæ, antheræ ana \mathfrak{z} β . sacchari albiissimi in aqua plantaginis dissoluti q. s. fiat *Electuarium* in tabulis.

\mathcal{R} trochiscorum de spodio \mathfrak{z} v. cupularum glandium \mathfrak{z} j. β . seminum rosarū, portulacæ ana \mathfrak{z} j. carnis cydoniorum absque speciebus \mathfrak{z} ij. syrupi myrtilorum q. s. fiat *Electuarium* mollis consistentiæ.

\mathcal{R} carnis ericii in furno exiccatæ \mathfrak{z} iij. rosarū rubrarū \mathfrak{z} j. β . spodii \mathfrak{z} iij. boli Armeni \mathfrak{z} j. seminum coriandri præparati, lactucæ, portulacæ ana \mathfrak{z} ij. β . camphoræ \mathfrak{z} j. β . syrupi violarū q. s. fiat *Electuarium* molle.

\mathcal{R} boli Armeni \mathfrak{z} j. balaustiorum, rosarū rubrarū, spodii ana \mathfrak{z} j. β . seminis plantaginis, lactucæ, portulacæ ana \mathfrak{z} ij. gummi Arabici \mathfrak{z} β . camphoræ \mathfrak{z} β . syrupi myrtilorum q. s. fiat *Massa Pillularum*.

\mathcal{R} trochiscorum alkekengi \mathfrak{z} β . de carabe \mathfrak{z} j. β . thuris,

gummi Arabici ana 3 j. cinnamomi 3 ij. fiat *Pulvis*, aut cum miua cydoniorum q. s. fiat *Electuarium* molle.

℞ myrobalanorum citrinorum conditorum 3 ij. conseruæ florum nymphææ 3 j. ss. trochiscorum de spodio 3 j. ss. rosarum rubrarum 3 ss. sacchari rosati 3 j. ss. syrupi nymphææ q. s. fiat *Mixtura*.

℞ radicum & foliorum plantaginis ana m. ij. granorum sumach 3 iiij. rosarum rubrarum m. j. seminum portulacæ 3 j. antheræ 3 ij. sandalorum alborum & rubrorum ana 3 j. coquantur in aqua q. s. fiat *Fomentatio* ipsorum renum, decocto calente.

℞ aquæ rosacæ 3 vj. endiuix, cichorei ana 3 viij. acetii 3 j. sandalorum 3 ij. seminum plantaginis 3 j. fiat pro hepatis regione *Epithema*: solet equidem sequi ad hoc malum hepatis intemperies calida.

℞ omnium sandalorum 3 j. cornu cerui vsti 3 ss. rosarum rubrarum, seminum portulacæ ana 3 j. ss. olei rosarum, myrtiloru ana 3 j. vnguenti populeonis 3 vj. acetii rosacei guttas aliquot, ceræ q. s. fiat *Vnguentum*.

℞ vnguenti rosacei, infrigidantis Galeni, populeonis ana 3 ss. camphoræ 3 j. olei rosacei, cydoniorum ana 3 iiij. ceræ & acetii parum, fiat *Vnguentum* pro renibus; quo tota quoque spina, ab vltimis potissimum costis inungetur.

℞ foliorum plantaginis, bursæ pastoris, foliorum salicis ana m. j. ss. rosaru rubrarum m. ss. granorum sumach 3 iiij. balaustiorum, malicorii ana 3 iiij. coquantur in aqua q. s. ad mollitudinem, pistentur, addaturque farinæ hordeacæ 3 j. ss. olei violarum, myrtilorum & acetii rosacei q. s. fiat pro renibus *Cataplasma*.

℞ foliorum violarum, endiuix, maluæ, alihææ, plantaginis, nymphææ ana m. iiij. rosarum rubrarum m. iiij. ss. seminum cydoniorum 3 iiij. hordei tb j. ss. coquantur in aqua quantum satis pro *Balneo*. Tempore vsus addantur lactis recenter mulcti aliquot mensuræ.

APPEN-

APPENDIX

ad prædicta pro curatione DIABETES
inferuiens.

Omniū primò humores peccantes naturæ obediētes reddemus. Demum purgante medicamento interim leni è corpore eosdem euocabimus. Deinde reuellemus humoris impetum frictionibus brachiorum, capitis, scapularum, vomitu; plurimum enim diuersiones hîc momenti habent. Postea quoque quæ sistere aliquualiter possunt humores ad renes ruentes propinanda atque exterius admouenda sunt: quibus addemus ea quæ acrimoniam bilis nonnihil obtundere possunt, cuius semper aliqua portio à iecore cum urina nobis etiam inuitis ad renes transmittitur, etiamsi optimè temperatum sit iecur, cui rei glutinosa, mucilaginosaque medicamenta dedicabimus. Postremo renes atque iecur corroborabimus, intemperiem quoque calidam emendabimus tam sumptis quam admotis medicamentis. Quæ omnia nunc anteaquæ dictis medicamentis felicissimo cum successu consequi poterimus, modò uniuersalia particularibus debita ratione adhibeantur. Prædictis autem medicamentis si res non succedat ex voto, affectûsque incrementum potius sumere videatur, narcoticis uti licebit, unde 3 j. phylonij Romani imperabimus. aut, R2 phylonij Persici, theriacæ recentis ana 3 j. ss. cum decocto polygonij præbeatur. Omnia autem ratione ea quæ urinam incitare possunt, hîc quàm maximè vitabimus.



Methodus pro cognitione

**HÆMORRHOIDVM SAN-
GVINEM SINE MODO FVN-
dentium inseruiens.**

HÆMORRHOIDES sunt venæ ani præter ratio-
nem dilatatæ, aut factæ varicosæ. Contingit au-
tem aliquando ita illas intumescere ex sanguine me-
lancholico, vt exterius circa anum visu appareant, ex-
terneque tunc vocantur, aut intus tumefactę ita latent
vt non appareant, tunc interne vocari solent, sæpiusque
sanguinem fundunt absque vlllo dolore tumoreve. San-
guinis autem huiusmodi melancholici, certis quibus-
dam tēporibus natura hac spontanea euacuatione fun-
dit mediocrem quantitatem: sicque harum opera na-
tura non solum à morbis imminētibz hominem se-
curum reddit, sed etiam ab iis qui iam inuaserunt, ho-
minem liberat, adeò quòd ab omnibus iam conceda-
tur medicis harum mediocre profluuium à multis mor-
bis nos securos reddere: vniuersum equidem corpus
expurgant à noxiis humoribus, & aliquando etiam à
boni sanguinis quantitate nimia. Hoc autem multis ad
naturæ commodum per interualla fieri solet, incertis-
que temporibus, eritque hæc vacuatio naturalis dicen-
da, cum ad animalis commodum id quod graue est at-
que molestum tanquam pondus inutile citra virium
iacturam deponat. Aliàs verò nimiam sanguinis quan-
tatem profundunt, ita vt vires corporis immodicè in-
de prosterantur, non leuentur, infirmitatēque con-
duplicent, cum potius illo vti oportebat ad corporis le-
uamen. id fit tanto subinde impetu, vt aliquando pro
sanguine nigro, crasso atque melancholico, bonus san-
guis

guis profundatur immodicè. Aliàs verò contingit has venas intumescere atque dilatari, nihilque omninò sanguinis eas profundere; & tam est præter naturam vacuari tunc non posse sanguinem atque prædictum symptomata. maximo autem dolore homo affligitur, vocanturque tunc cæcæ hæmorrhoides; cum verò sanguinem profundunt, generis nomine vocantur. Tam autem cæcis quàm fluentibus inflammatio aliquando coniungitur. Cæcæ autem interdum duræ sunt, vt verrucæ, tuncque verrucales dicuntur, suntque aliis deteriores; aliæ tractabiles sunt atque molles, morales dictæ. aliquando verò ob colorem purpureum quo perfunduntur, vuales vocantur. Præstat autem cæcas naturæ potius permittere quàm aperire, hoc enim non fiet nisi doloris magnitudo aut tumor nimius urgeat. Partim autem venæ istæ à ramo venæ portæ ad intestinum rectum, musculumque ani transmittuntur, partim etiam à ramis venæ cavae in dictas sedes demittuntur, magisque ad ani extremitatem desinunt, dicenturque hæmorrhoides externæ, vt per priores venas si sanguis melancholicus deferatur, internæ hæmorrhoides dicentur, cum ita altè intus lateant venæ, vt visus eas assequi non possit absque speculo, aut ani euersione. Hic cruor cum excrementis deiicitur, nequaquam tamen permiscetur, sed seorsum subsistit, idque nullo sæpe sensu doloris concurrente; in dysenteria verò cum excrementis permiscetur. Vtitur natura nunc hisce ramis, in iecoris nimirum renumve affectibus præter naturam, & cum in venoso genere fiunt errores, quos sæpe hac ratione emendat; aliàs verò prioribus vtitur ramis, in lienis nimirum venarumque mezeraiicarum aliarumque partium vicinarum affectibus, prout rei necessitas dicat scilicet.

PARS AFFECTA. Hic venæ quæ in anum inseruntur, afficiuntur.

SIGNA, dum immodicè fluunt, sanguis melancholicus in principio profundi solet, tandemque loco sanguinis melancholici seu nigri atque stassi, bonus san-

guis rutilusque profunditur, tandem verò citrinus pallidusque fit, vnde corporis vires labuntur, imbecillitasque crurum, coxarumque dolores grauantur concurrunt, faciei color vitatur. Hæmorrhoides verò fluere consuetæ, si præter naturam retineantur, concurrunt dolor dorsi, coxarum, tibiæ, renum, ani, pectorisque. Sanguis autem ab hæmorrhoidibus profusus si in recto intestino subsistat, sæpe formam grumi sanguinis rubentis nanciscitur. Qui verò à iecore infirmo per aluum excluditur sanguis, aquæ assimilatur, in qua carnes animalis alicuius mactati, lotæ sunt. Mezentium verò paruum eius quantitatem fundere solet. Venæ autem supernarum partium aliquæ si ruptæ aut exsæ, aut apertæ nimium sint, sanguis qui effunditur, diuturna assatione, picis speciem consequitur; fit enim niger & retorridus. Ratione dysentericæ si profundatur, eius signa prædicta sunt. Hinc intelligere poterimus, quando ab hæmorrhoidibus, & quando potius à iecore aut partibus superioribus sanguis excernatur per anum, multis enim modis sanguis per anum effluere solet, quare non statim ab hæmorrhoidibus fluxum sanguinis per anum fieri dicemus.

CAUSA. Propter copiam sanguinis feculenti & melancholici qui gignitur in corpore ex malitia digestionis, sanguis dicto modo sæpe profunditur, quem iecur, splen, partesque circumiacentes ad venas has ani, per dictos ramos depellunt. Aliquando à nimia fit copia sanguinis. Aliquando quoque ob nimiam eius tenuitatem, ac redinemque hoc natura molitur. Interdum etiam fit in mulieribus uterum gerentibus, mensiumve suppressione laborantibus, aliquando enim in illis natura per ramos qui dimittuntur à venæ cauæ iuxta imam iliorum partem in podicem, superfluum sanguinem expellit, uti facit in viris. aliàs hoc malum etiam fit propter venarum apertionem, ruptionem vel exulcerationem. Supprimi autem contingit huiusmodi sanguinem

guinem superfluum præter naturam ob causas contrarias prædictis.

PROGNOSTICA. Cui maturæ fluunt hæmorrhoides, hunc neque lateris neque pulmonum tentare inflammatio neque vlcera exedentia, neque lepra vel elephantiasis, neque melancholia, nec quartana febris solet. Infantibus, atra bile vexatis, & renum passionibus hæmorrhoides superuenientes, bonum; immodicè tamen si profundantur, maximo cum periculo id fit; hydropem enim minantur, eò quòd vires immodicè consumantur amisso vitæ thesauro; eaque ratione si immodicè fluant, statim supprimantur, cum inde tum iecur, tum vniuersum corpus refrigeretur, nec non vires deiciantur. Hæmorrhoides sananti antiquas si una relicta non fuerit, periculum impendit hydropis, pleuritidis, peripneumonie, lepræ, febris quartanæ, melancholiæ, maniae aut phthisis; ad iecur enim præcordiaque regurgitare hæc inutilia excrementa solent: quare haud leuiora pericula ex hæmorrhoidum intempestiua suppressione, quàm ex nimia profusione excitari solent.



Methodus pro curatione

**HÆMORRHOIDVM
NIMIVM FLVENTIVM
inseruiens.**

Perficitur autem subsequentibus remediorum generibus.

VICTVS RATIONE.

A Er ad siccum declinet.
Cibus. Ea quæ paucis redundant excrementis of-

ferantur, & quę modicę adstringere possunt. Iuscula
carnium pingua propinentur, ne feces induratę do-
lorem excitent, quibus succus cydoniorum addetur.
Puls cum lacte fiat atque oryza.

Potus sit vinum modicę astringens.

PRÆPARANTIBVS.

Syr. de succo oxalidis.

Rosatus, de rosis siccis.

Syr. cydoniorum.

Aqua plantaginis, oxalidis, nymphææ.

Mel rosatum.

Syr. de absinthio.

Syr. de myrobalanis emblicis.

Aqua absinthii, buglossæ, menthæ.

Si sanguis nimium biliosus, tenuis & ad fluendum ap-
tus fuerit, prioribus; si autem nimium aquosus fuerit,
posterioribus corrigetur. Idem quoque in sequentibus
remediorum generibus obseruabitur.

VACVANTIBVS.

Syr. rosarum solutius.

Diasena.

Rhabarbarum.

Myrobalani flauī.

Pill. de bdellio.

Myrobalani chebuli, emblici.

Polypodium quercinum, semen catthami.

Suppositoria acria inhibeantur ad mouendum aluum,
sed procuretur cum candela e seuo parata, vel pingui
lardo.

AVERTENTIBVS.

Venę sectio iecorarię dextri brachii, non solūm reuel-
lit, sed etiam melancholici sanguinis generationem
remoratur.

Cucurbitulę in dextro sinistroque hypochondrio, sple-
nis atque iecoris regioni superponantur, nec non hu-
mero antequam cibum sumat.

Frictiones asperę brachiorum manuūque.

Liga

Ligaturæ dolorificæ prædictarum partium.
Fotus balneæque pro manibus, brachiisque.

CONTRAHENTIVS ora venarum, sanguinem-
que incrassantibus.

Trochisci de spodio cum semine acetosæ; de terra sigillata.

Confectio de scoria ferri.

Conserua magna nostræ descriptionis optime edomat
huius mali exordia.

Saccharum rosatum, conserua rosarum antiquarum.

Syr. granatorum, cydoniorum, myrtilorum, rosarum, de
succo acetosæ.

Pillulæ de bdellio.

Sanguis draconis, bolus Armenus præstans est medica-
mentum, semenque oxalidis.

Terra sigillata, squama & scoria ferri, malicorium, rhus
obsoniorum, hypocistis.

Aqua plantaginis, rosarum, solani.

Galbanum.

Phylonium Romanum, triphera Persica, phenoris, a-
thanasia Nicolai.

Balneum ex rebus adstringentibus.

Fotus ex vino astringente, in quo decoquentur radices
plantaginis, rosæ rubræ, balaustræ, myrtilli, terra sigil-
lata, bolus Armenus, rhus obsoniorum, gallæ, cornu
cerui vsum: ex iisdem quoque succus exprimi poterit;
iniicique cum syringa, si internæ sint hæmorrhoides.

Gallæ si cum oleo myrtilorum in modum emplastri
componantur, plurimum iuuant.

Suppositoriū ex plūbo vīto, cerusa, colophonia, acacia.

Ynguentum comitissæ multum utilitatis affert, si sedi
lumbisque admoueat.

Emplastrū ex aloë, thure, oui cādido, pilisque leporinis.

Emplastrum ex scoria ferri.

Anguillæ pinguedo dum torretur, collecta in sartagine,
radiceque filipendulæ subacta, supraposita aut inun-

6c

sta, aut etiam suppositoꝝ immissa, potenter retinet sanguinem hæmorrhoidalem.

Nequaquam hic præcipitanter hæmorrhoidum fluxus sistendus est; periculum enim hinc hydropisis aut tabis impendet; potius autem paulatim illud fiet, eritque una pro tempore relinquenda aperta.

CORRIGENTIBVS *accidentia.*

Phylonium Romanum, athanasia N.

Vnguentum ex oleo violarum, lumbricorum, liliorum, lini; vnguento populeonis, oui vitello, albumine oui, opij momento.

Vnguentum populeum.

Infusus ex aqua calybeata, in qua sint decocta semina lini, folia verbasci, plantaginis, maluæ, violarum, flores camomillæ, meliloti, capita papaveris albi, myrtilli, balauftia.

Mucilago seminis lini aut fœnugræci commodè applicabitur.

Emplastrum siue cataplasma ex farina triticea, fœnugræci, mucilagine althææ, psyllij, meliloti, portulacæ, oleo rosaceo, albumine oui, mica pannis, lacte cocto.

Diachylum cum modico croco & opio.

Tentæ fiant oblongæ, quæ vnguentis prædictis imbuantur & immittantur si intus lateant.

Si cum fluxu dolor adsit vehementissimus, mitigari debet, ne ob excrementorum asperitatem duritiemque fluxio ingeminetur: hisce quoque addemus, quæ inflammationem prohibere possunt, cum frequenter eam concurrere observatum sit.

THEORI-

THEORICA ET EMPIRICA MEDICAMENTA nobilia in HAEMORRHOIDIBVS NIMIVM FLVENTIBVS, sepius cum summa salute plurimorum aegrotorum à Gualtero Bruele experta.

CVRATIO HAEMORRHOIDVM NIMIVM FLVENTIVM.

℞ syrupi myrtini, cydoniorum, rosacei ana ʒ j. se. decoctionis myrtylorum, sumach, balaustiorum ʒ viij. vini rubri astringentis ʒ iiij. misceantur, fiat *Tuleb.*

℞ pillularum de bdellio ʒ j. rhabarbari ʒ se. syrupi rosarum solutiui q. s. fiant. *Pillulae* octo numero, dentur, post primum somnum.

℞ rhabarbari electi ʒ ij. myrobalanorū citrinorū ʒ j. se. syrupi methæ ʒ j. aquarū buglossæ ʒ iiij. fiat *Haustus.*

℞ syrupi cydoniorum ʒ j. se. boli Armeni loti in aqua rosarum ʒ se. mastichis ʒ j. sacchari rosacei ʒ se. aquarum plantaginis ʒ iiij. fiat *Haustus.*

℞ confervæ rosarum antiquarum ʒ j. trochiscorum de spodio, de succino ana ʒ iiij. corallorum rubrorum, ossium dactylorum ana ʒ ij. boli Armeni, balaustiorum ana ʒ j. syrupi rosacei, myrtini ana q. s. ad *Electuarij* mollis consistentiam.

℞ ossium dactylorum, myrobalanorum Indorum ana ʒ se. coriandrorum præparatorum, corallorum rubrorum ana ʒ sem. vini rubri astringentis & sacchari albissimi quantum satis, fiat *Electuarium* in tabulis.

℞ trochiscorum de terra sigillata ʒ j. syrupi cydoniorum ʒ j. aquæ plantaginis ʒ iiij. fiat *Haustus.*

℞ radicum & foliorum plantaginis ana m. j. rhois obsoniorum, balaustiorum, malicorij, granorum sumach ana m. i. se. ossium dactylorum ʒ v. seminum lini ʒ i. se. seminum myrtylorum ʒ ii. se. boli Armeni, cornu cerui

Cc ij

vsti ana 3 j. sem. coquantur omnia in vino rubro astringente q. s. fiat *Fotus* pro ano.

℞ thuris 3 se. aloes 3 ij. cum oui candido misceantur, mollissimisque pilis leporinis excipiantur, locoque sanguinem eructanti accommodentur.

℞ olei myrtillorum 3 j. vnguenti comitissæ 3 ij. boli Armeni, sanguinis draconis ana 3 j. antimonij, cornu cerui vsti, cerusæ, lithargyri ana 3 sem. fiat *Linamentum* molle efficacissimum.

℞ vnguenti populeonis 3 iij. olei violacei 3 j. se. adipis anseris, gallinæ ana 3 sem. olei amygdalorum dulcium 3 vj. croci 3 se. vitella ouorum duo, fiat *Vnguentum*.

℞ vnguenti comitissæ q. v. eo spina dorsi inungatur, plurimum equidem iuuat.

℞ vnguenti populeonis 3 j. olei lini 3 sem. vitellum oui vnum, opij 3 se. croci 3 j. fiat arte *Vnguentum*. in vehementissimo dolore solummodo admittitur, aut huius loco ℞ foliorum violarum m. iij. psyllij m. j. se. coquantur in lacte vaccino ad mollitudinem, addendo farinæ triticeæ 3 j. farinæ hordei 3 se. vitella ouorum duo, olei rosacei, violarum ana q. s. fiat *Cataplasma*. Ex pulpis quoque pomorum sub cineribus coctorum in vnciis duabus radicum althææ. *Emplastrum* si fiat cum butyro recenti, croco & albumine oui, multum quoque valet in sedatione doloris, iisque si dolor non mitigetur, addi poterunt solani m. ij. sicque dolorem summe mitigabimus.

℞ radicum & foliorum plantaginis m. iij. rosarum rubrarum m. j. se. balaustiorum 3 se. coquantur nonnihil in vino astringente, fiat *Fotus* ani.

℞ pulpæ cydoniorum sub cineribus coctorum 3 iij. balaustiorum, boli Armeni ana 3 ij. gallarum, thuris ana 3 j. præstantissimum fiet *Emplastrum*.

℞ plumbi vsti 3 j. cerusæ lotæ 3 se. colophonix, boli Armeni ana 3 ij. succi plantaginis, albuminis oui & olei violacei ana q. s. fiat *Suppositorium*.

℞ radicum althææ, seminis myrtillorum, malicorij, balaustio-

laustiorum ana 3 vj. rapfi barbati m. iij. coquantur in vino nigro stiptico ad mollitudinem: adde demum pulveris ossium dactylorum, gallarum, thuris ana 3 j. sc. olei violacei, rosacei ana q. s. fiat *Cataplasma*.

℞ boli Armeni, aloës, mastichis, thuris ana 3 sc. sanguinis draconis 3 iij. sc. ossium myrobalanorum Indorum, gallarum ana 3 j. subigantur cum oui candido & succo plantaginis q. s. fiat *Emplastrum* cum mollissimis pilis leporinis.

℞ trochiscorum de terra sigillata 3 j. sc. albuminis oui conquassati q. s. fiat *Cataplasma*. *Emplastrum* autem ex ficibus atque aloë superponere poterimus illi venæ sanguinem eructanti quam apertam conservare consilium videbitur.

APPENDIX

ad prædicta pro curatione HAEMOR-
RHOIDVM SUPERFLVE
FLVENTIVM.

Ne ex immodica sanguinis vacuatione hepatis refrigeretur, totiusque corporis vires deiciantur, atque morbi prius indicati excitentur, cohibebimus sanguinem nimium fluentem, & non ante. Omnium autem primo si sanguini commisceantur humores multum acres subtilēsque, illos omnium quoque primo naturæ obediētes reddemus, demum purgante medicamento e corpore educuntur. Hinc venæ sectio fiat in copiosa sanguinis vacuatione, si vires permittant, partim ut si superabundans sit, minuatur, partim ut sanguinis impetus hac ratione impediatur. In quem finem quoque omnia alia quæ auertere possunt, præscribantur. Postea ea danda sunt quæ contrahere possunt ora venarum, sanguinemque incrassare. Dolorem quoque interea mitigabimus si multum urgeat. Quæ omnia nunc anteaque dictis medicamentis felicissimo cum successu consequi poterimus, modo universalis particularibus debita ratione adhibeantur. In cæcis autem, cum in sculis carniū aut cassia extracta, alius soluta permaneat, quia feces induratae maximum causant

Cc iij

dolorem sua duritie & asperitate. Cum autem iam primum e-
 rumpunt, laborabimus primò ut dolor mitigetur; secundo ut
 exiccentur; præter naturam enim est hæc vacuatio, nisi iam in
 consuetudinem abierit, neque umquam nisi coacti fuerimus ob
 magnum dolorem aut tumorem, prouocabimus fluxum hæmor-
 rhoidum; aut si hominem periclitari de prædictis intellexerimus
 morbis, tuncque sanguisugis commodissime prouocari poterunt,
 lauentur autem antea aqua calente, aut vino sanguisugæ.
 Idem quoque fieri poterit scalpello, pannusque tunc apponatur
 rarus intinctus in oui candido & applicetur, exiccatus autem
 ubi erit, vi abstrahatur; sic enim aperientur, & ab apostemate
 præseruabitur. aut R. colocynthidis 3 ij. ss. olei amygdalorum
 amarorum 3 j. stercoris vaccini nonnihil, fiat Cataplasma.
 aut R. pulpæ pomi sub cineribus cocti, fimi columbini ana
 3 j. sem. succi cepæ q. s. fiat Emplastrum pro ano; prius-
 quam applicetur, anus foneri debet cum decocto emolliente. Dum
 autem exiccare eas animus est, R. viridis æris & sem. gallarum,
 mastichis, boli Armeni ana 3 ij. aquarum plantaginis, aut
 vini rubri astringentis & xy. bulliant donec mellis crassitudinem
 consequantur, apponatur calens. R. viridis æris vsti & ij. alumi-
 nis vsti & iij. cum vino astringenti ad mellis crassitudinem co-
 quantur, atque cum lana apponantur succida. Si vlcus ad-
 esse ab exeuntibus intellexerimus, unguentum fa-
 ctum ex lithargyro & cerusa, iniiciatur
 actu frigidum ut melius
 operetur.

Methodus



Methodus pro cognitione

MENSIVM SUPERFLVENTIVM INSERVIENS.

MENSIVM SUPERFLVVS FLVXVS erit cum is amplius non fit ad animalis commodum, & cum nocumentū potius ex eorum fluxu subsequitur. Nonnunquā enim plus iusto purgantur, & potissimum quæ humidioris sunt naturæ mulieres, propter victum liberaliorem longamve desidiā absque earum læsione, sed potius fit cum bona tolerantia, tuncque sistendus non est. Quapropter non tantum quantitatem, qualitatemve atque genus substantiæ hic observare debemus, sed potius auscultandum an tēpestivē vel intēpestivē, seu ad animalis commodum vel incommodum fluant. Subsistere debent lactantibus, utero gerentibus, puerperis. In gravidis tamen primo aliquando mense prorumpunt non omnino contra rationē, cum tunc os uteri non ita firmiter adhuc sit constrictum uti aliquandiu post fieri solet, cum ne minima quidem corpuscula tandem admittere soleat uterus. Subinde quoque in gravidis etiā postquam arctissime os uteri constrictum fuerit, aut menses (quod virginibus etiam interdum accidit) aut quid simile mensibus profundi per ramos venæ cavæ consuevit, qui inseruntur ceruici orique vulvæ, ad eum modum quo hæmorrhoids in recti intestini extremitatem quasi terminatur.

PARS AFFECTA. Afficitur dum immodicē fluunt menses, uterus aut per se, aut simul cū toto corpore, vel aliquibus partibus eius. Est autē hic affectus symptoma pertinens ad genus immodicē excretorum, estque non toto genere præter naturam, uti hæmorrhagia, aliæque sanguinis vacuationes, sed sola quantitate.


Cc iiij

SIGNA. Si immodicè menses vacuentur, prostratio fit appetitus, concoctioque fit impedita, cruditatesque colliguntur in corpore, totum fit infirmum corpus, virium magna sequitur imbecillitas, quod inter alia certissimum signum est, menses superflue fluere, faciei que color vitatur, febriles enascuntur in corpore ardores. Subinde vnà cum pedibus totum corpus inflatur, & hydrops introducitur.

CAUSA. Vt plurimum menses profunduntur vberius, propter sanguinis caliditatem, tenuitatem aut copiam plus iusto maiorem, aut propter magnam eiusdem exagitationem; iis enim omnibus concurrentibus, naturam facile illudet, vasaque aperiet: adde quòd tanta aliquando est sanguinis copia, vt non tantum cra venarum aperiat, sed subinde etiam venas rumpat, id quod in validis exercitationibus sæpe fit: hoc quoque in abortientibus magno cum earum detrimento, nec non in laboriose parientibus fit, siue propter obliquum foetus exitum, siue eiusdem magnitudinem fiat. Hanc quoque vasorum apertionem molientur balnearum alimentorumque calidorum vsus, tempus anni calidum, aliaque consimilia. Aliquando vero immodicus hic fluxus provenit propter venarum aperturam, cui sæpe coniungitur erosio, nec non exulceratio, quæ in ceruice vteri frequentius fieri solet ab acredine sanguinis, quam adesse ostendunt ea quæ excernuntur, quia saniosa atque virulenta cum sanguine excernuntur, suntque maleolentia, dolor quoque magis vehemens circa vterum percipitur, qui aliquando etiam tactu animaduertitur per digiti immiessionem si circa os ceruicis constiterit. Abundanter autem sanguis profunditur ex apertura aut ruptura venarum, præcipue quidem magnarum, quales multæ ad vterum perueniunt, à minoribus autem minus copiose profluit, sed paulatim modiceque, & absque vllò ordine. Ex frequenti quoque concubitu, necnon ob retentricis facultatis imbecillitatem immoderati fluxus aliquando fiunt: à noxiis quo-

quoque humoribus & venenatis, putridis, mordacibusque sæpe excitatur hoc malum.

PROGNOSTICA. Immodica mensium profluvia quæ ex partu grandiori sunt; minus sunt periculosa, cum sua sponte etiam cessent. Si autem abortivi foetus causa fiant, repetitum quandoq; periculum inducunt. Si propter vlcus aut erosionem fiat immodicus sanguinis fluxus, vel difficulter, vel non curatur, propter humorum circa uterum collectorum malam complexionem, unde continuo menses quasi fluunt, vulneraque & vlcera maxima cum difficultate sanantur quia semper habent multas superfluitates cum sanguine mixtas; & propterea medicamenta frustra offeruntur. Quemadmodum ex omnimoda menstruæ purgationis cessatione, periculum hydropis impendet; ita ex immodico diuturnoque profluvio, si totum infirmum inde fiat corpus, colorque vitietur, idem morbus metuendus est, ad magnam enim frigiditatem inde mulier deducitur, animi quoque tandem minatur deliquium, nec non syncopen & mortem.



Methodus pro curatione

MENSIVM NIMIVM FLVENTIVM INSERVIENS.

Perficitur autem subsequentibus remediorum generibus.

VICTVS RATIONE.

A Er versus siccum declinet frigidumque.
Cibus: alimenta adstringentia incrassantiaque, & quæ bonum sanguinem generare possunt, conueniunt; vt pedes animalium, carnes perdicum, pha-

rum, merularum, auicularum, cuniculorum, capreolorum, leporum, carnes autem potius affæ quàm elixæ offerantur.

Potus: aqua conuenit, in qua plantaginis folia, radices seminaque decocta sint.

Exercitia vitentur, potiusque quiescat.

Somnus sit moderatus.

Animi perturbationes vitentur.

PRÆPARANTIBVS.

Syrupus de Endiuiâ, cydoniorum.

Rosarum. de succo granatorum.

De succo acetosæ, Succus berberorum.

Aquâ acetosæ, rosarum, plantaginis, portulacæ, endiuiæ.

VACVANTIBVS.

Vena interna in dextro brachio aperiatur, si corporis adsit plenitudo, viresque constant, & menses rubuant, partitisque vicibus sanguis educatur.

Cassia receter extracta, myrobalani citrini, cepuli: Agaricus hic cum commodo addetur, cō quod plerumq; serosa pituita sanguini commisceatur.

Syr. de multiplici infusione rosarum.

Rhabarbarum.

Diaphœnicum, electuarium Indum, hiera picra.

Pillule de bdellio maiores.

Decoctio e floribus violarum, rosarum, buglossæ, nymphææ, prunis damascenis, ziziphis, myrobalanis flauis, rhabarbaro, addito syrupo ex multiplici infusione rosarum.

AVERTENTIBVS.

Vena secetur basilica.

Frictiones & ligaturæ fiant dolorificæ supernarum partium.

Cucurbitula magna vna affigatur in dextra aut sinistra parte sub manimis, repetendo per plures dies, & per horam singulis vicibus, alia quoque loco splenis adhercat, & tandem etiam mediæ regioni ventris applicetur.

plicetur, necnon humeris, præsertim si venę sectio impediatur ob immoderatum fluxum, aut virium debilitatem.

Fotus ventris infernarumque partium fiat ex decocto plantaginis, rosarum rubrarum, balauustiorum, corticum granatorum, hypocistidis, verbasci, gallarum, boli Armeni, acatię, sanguinis draconis.

Inseffus ex prædicto decocto multum quoque valet.

Vomitum multum quoque confert.

Sudorem prouocantia conueniunt, potissimum si sanguis multum fuerit aquosus.

SISTENTIBVS & contrahentibus vias per quas sanguis fluit, sanguinemque incrassantibus.

Diaqlibanum, Tryphera Phenonis, phylonium Romanum necnon Persicum, athanasia, electuarium diatrium sandalorum.

Trochisci de terra sigillata, carabe, spodio. Syrupus myrtilorum, rosarum, granatorum, de succo acetosę, cydoniorum.

Conserua e rosis ficcis & antiquis, de succo ribes, aqua rosacea manẽ & sero bibatur.

Caro cydoniorum, cornu cerui vstum, bursa pastoris, balauustum, calyces glandium, terra Lemnia, polygonium, hypocistis, galla, rosę, succus plantaginis, aut aqua eiusdem cum trochis. de terra sigillata, succus millefolij & portulacę, folia quercus, sumach, gummi Arabicum, mastix, olibanum, coriandri semina, alumen vstum & suppositum.

Aqua plantaginis, portulacę, lactucę, acetosę, rosarum cum trochiscis de carabe, de spodio, de terra sigillata.

Balneum ex decocto radicum & foliorum plantaginis, symphyti, equiseti, polygonij, gallarum, granorum sumach, glandium cucullis, malicorio, rosis, rhoë obsoniorum, balauustis, infideat autem vsque ad umbilicum, decocti quoque huius fumus per infundibulum in vterum recipiatur.

Suffumigatio facta cum fumo seminis sinapi.

Injectio fiat e vino astringente, in quo salvia, rosa, plantago, bolus Armenus, sanguis draconis decoquantur, aut ex succo fiat rosarum, plantaginis, nec non solani; potissimum si ulcerationes aliquæ adsint.

Pessulus fiat e mummia, tryphera, mycleta, bolo Armeno, succo plantaginis, rosarum, solari, bonibyce excipiantur & imponantur.

Linteolum quoque molliusculum, aut gossypium lanæve loco pessuli imbuatur succo plantaginis, genitalibusque immittatur.

Epithema ex vino rubro astringente, in quo radices plantaginis cum foliis sumach decoquantur, pubi venarumque spermaticarum regioni, atque lumbis accommodabitur.

Vnguentum comitisæ additis rosis, myrtilis pro renum regione, tumque frigescat; si autem venter vngatur, caleat.

Vnguentum ex oleo rosato, myrtillorum, cydoniorum, succo portulacæ, pul. sandalorum, antheræ, balaustiorum.

Ceratum sandalinum.

Emplastrum e rosis, balaustiis, malicorio, radice plantaginis, gallis, sanguine draconis, bolo Armeno.

Istis etiam a principio utemur, neque procrastinanda erunt hæc remedia, periculum enim est ne natura ita assuescat huic excretioni, ut tandem difficulter, & etiam si velit pedem reuocare non possit, cum orificia venarum diu aperta fuerint detenta per continuum fluxum; difficillime enim tunc consolidabuntur; unde difficulter curabitur malum si diu perseuerauerit, & tamen plerumque solet medico huius mali cura committi, postquam inueteratum fuerit; cum plerumque dominæ erubescant medico antea significare. Athanasia autem confectio, & alia huius naturæ medicamenta quam-

quamvis sanguinis exagitationem sistant, non erunt propinanda, nisi vires validæ adhuc fuerint, & postquam alia frustra propinari observabimus medicamentata, & in casu desperato.

THEORICA ET EMPIRICA MEDICAMENTA nobilia in MENSIBVS NIMIUM FLVENTIBVS sæpius cum summa salute plurimorum agrotorum à Gualtero Bruel experta.

CURATIO MENSIVM NIMIUM FLVENTIVM.

℞ syrupi rosati, myrtilorum, cydoniorum ana ℥ j. ss. aquarum plantaginis ℥ v. decoctionis sumachi, myrtilorum ℥ vj. misceantur & fiat *Iuleb*.

℞ diacatholiconis ℥ iiij. rhabbari electissimi parum tosti ℥ j. syrupi rosati ℥ j. aquarum plantaginis ℥ iiij. fiat *Haustus*.

℞ pillularum cochiarum, de agarico ana ℥ j. β. diagridii gr. iiij. cum syrupi arthemisię quantitate sufficienti, fiant *Pillulæ octo*.

℞ radicem plantaginis ℥ j. β. rhabbari optimi ℥ j. myrobalanorum citrinorum ℥ iiij. coquantur in aqua q. s. ad uncias quatuor aut quinque, colaturæ adde rhabbari electissimi ℥ j. β. syrupi cydoniorum ℥ j. β. fiat *Haustus*.

℞ pillularum de bdellio ℥ ij. β. syrupi de cichoreo cum rhabbaro q. s. fiant *Pillulæ octo numero*.

℞ succi plantaginis, millefolii ana ℥ ij. gummi Arabici ℥ j. sacchari albissimi q. s. ad dulcorandum, fiat *Haustus*.

℞ vini stiptici lb j. β. in eo casei sicci portio modicè ebulliat, feliciter inhibet fluxum menstruorum superfluum.

R^x coralli rubri optime puluerisati \mathfrak{z} j. succi plantaginis \mathfrak{z} iij. syrupi cydoniorum \mathfrak{z} j. misceantur, fiat *Haustus*.

R^x radicum plantaginis \mathfrak{z} iij. boli Armeni \mathfrak{z} j. coquantur in vino rubro astringenti ad libram vnā: colaturæ adde sacchari rosacei q. s. ad dulcorandum, fiat *Potio*.

R^x trochiscorum de terra sigillata, de carabe ana \mathfrak{z} j. mastichis, thuris, balaustiorum, cornu cerui vsti ana \mathfrak{z} j. seminum antheræ, corallorum rubrorum ana \mathfrak{z} ss. conseruæ rosarum antiquarum, carnis cydoniorum ana \mathfrak{z} ss. syrupi myrtilorum q. s. ad *Electuarij* mollis consistentiam.

R^x conseruæ rosarum antiquarum \mathfrak{z} j. olibani, thuris, myrrhæ ana \mathfrak{z} ij. boli Armeni, seminum antheræ ana \mathfrak{z} j. mastichis \mathfrak{z} j. ss. succi cydoniorum \mathfrak{z} ss. fiat *Electuarium* cum syrupi cydoniorum quantitate sufficienti, detur in aurora & duabus horis ante cœnam.

R^x trochiscorum de terra sigillata \mathfrak{z} iij. athanasia \mathfrak{z} ij. detur \mathfrak{z} j. cum aquæ aut succi plantaginis vnciis tribus, & syrupi cydoniorum \mathfrak{z} j.

R^x pillularum de cynoglossa \mathfrak{z} j. phylonii Persici \mathfrak{z} ij. ss. theriacæ magnæ recentis, boli Armeni ana \mathfrak{z} ss. fiat *Bolus*.

R^x pillularum de cynoglossa \mathfrak{z} j. phylonii Romani \mathfrak{z} ss. detur \mathfrak{z} ss. alternis diebus. præstans enim est admodum in hoc malo medicamentum; ab istis tamen abstinemus stupefacientibus medicamentis, nisi necessitate coacti fuerimus.

R^x coralli rubri, optime puluerisati, ambre citrinæ ana \mathfrak{z} j. boli Armeni \mathfrak{z} ss. seminum antheræ, plantaginis ana \mathfrak{z} j. boli Armeni \mathfrak{z} ss. syrupi rosati de rosis siccis \mathfrak{z} j. fiat *Electuarium*.

R^x trypheræ \mathfrak{z} j. pillularum de cynoglossa \mathfrak{z} ss. syrupi cydoniorum \mathfrak{z} ss. vini rubri astringentis \mathfrak{z} iij. fiat *Haustus*.

R^x succi plantaginis \mathfrak{z} vj. gummi tragacanthi \mathfrak{z} ss.

Inie-

Iniectio fiat in vterum, si ægra admiserit.

℞ trochiscorum de spodio 3 j. ss. succi plantaginis, saluæ ana 3 ij. fiat *Iniectio* in vterum; aut iniiciatur aqua plantaginis in qua dissoluatur mucilago seminum cydoniorum, syrupus de rosis siccis, papaverinus, aut,

℞ mellis rosati 3 j. aloës, thuris, boli Armeni, terræ sigillatæ ana 3 j. coralli, myrrhæ, balaustiorum ana 3 ij. tempore vlus dragmæ duæ iniiciantur cum aquæ plantaginis 3 iiij.

℞ succi plantaginis 3 iiij. boli Armeni, corticum granatorum, balaustiorum, thuris ana 3 j. ss. cornu cerui vsti, gallarum, ana 3 j. ss. misceantur, & cum cotone iis in defacto fiat *Pessarium*.

℞ radicum & foliorum plantaginis, symphiti ana m. j. foliorum saluæ m. ij. balaustiorum, rosarum ana m. j. ss. gallarum, sumach ana 3 iiij. ss. hypocittidos, rhois obsoniorum ana 3 ij. ss. coquantur in vino rubro astringenti quantum satis ad tertie partis consumptionem, quo lumen, & renum regio fomentabitur.

℞ trypheræ 3 ss. balaustiorum, gallarum, thuris ana 3 j. boli Armeni, gummi Arabici ana 3 ij. fiat *Pessarium*.

℞ thuris, mastichis ana 3 ij. gummi tragacanthi 3 iiij. pellis anguillæ exsiccatæ, vngulæ equi ana 3 ss. fiat *Suffumigium*, in sella autem perforata excipiat. Stercoris quoque ouilli atque thuris recipiatur æqualis quantitas, fiat *Suffumigium* alternis diebus. Balneum fiat ex eorum materia quæ in fomenti descriptione proposuimus, id quæ in aqua ferrata: generosum hoc medicamentum experimur, si huic aquæ iniiciatur boli Armeni libra media, ei quæ insideat vsque ad femur vbi calor aquæ se remiserit.

℞ vnguenti comitissæ 3 j. ss. olei myrtilorum, cydoniorum, rosarum, ana 3 vj. boli Armeni, sanguinis draconis ana 3 j. balaustiorum 3 ss. aceti rosacei paruum

fiat *Unguentum*, quo pubis, perinei, renumque loca inungentur.


R. malicorii, balauſtiorum, hypociftidis, boli Armeni, corticum ouorum, mummiæ, olibani ana 3 j. roſarum rubrarum, gollarum ana 3 ſs. thuris 3 iij. farinæ fabarum, hordei ana 3 ij. ſs. olei myrtilorum 3 j. ſs. ceræ & reſinæ q. ſ. fiat *Emplaſtrum* pro renum regione, ventrisque parte inferiori.

APPENDIX

ad prædicta pro curatione *MENſIVM NIMIVM FLVENTIVM* inferuiens.

Quoniam primum debilitas ex nimio fluxu menſtruorum percipitur, inhibenda eſt eorum fluxio, & non ante: hoc quoque paulatim fieri debet. Si plethora in cauſa fuerit, vena ſecabitur ut prædictum eſt; tenuisque inſtituatur diæta, abſtineatque ab iis quæ ſanguinem augent. Cum autem magna ex parte ſuor hic immodicus, à ſanguinis nimia aquoſitate, aut caliditate, aut acredine vel tenuitate fiat, primò humores peccantes concoquantur, demum purgante medicamento e corpore propellantur. Deinde ſanguinis impetus reuellatur cucurbitulis, aliisque diuerſionum instrumentis. Demum quæ ſiſtere poſſunt ſanguinis impetum, eundemque incrāſſare, oraſque venarium contrahere, præſcribenda ſunt; quorum nonnulla exterius applicantur, alia intro ſumuntur. Quæ omnia nunc anteaquæ dictis medicamentis feliciffimo cum ſucceſſu conſequi poterimus, modo uniuerſalia particularibus debita ratione applicentur. Cum autem in omni fluxu menſtruorum cor debilitetur atque ietur, utrumque viſcus confortari debet medicamentis ſuo loco dictis. Iniectiones autem atque peſſaria ex rebus ſtipitiſ compoſita, multum hic momenti habent, eo quod citius ad locum affectum perueniant quàm ea quæ per os ſumuntur. Coſſypium autem alicui conuenienti materiæ immergatur, tenuique integatur panno, eamque longitudinem habeat, ut ad oſtium uteri perueniat intimum. Si ab ulcere aliquo interno fiat depaſcente, mundetur cum aqua mellis,

mellis, hinc cum thure, aloë, terra sigillata aliisque predictis sanetur. Hisce etiam utemur si propter rupturam alicuius vasis fiat. Cum vino autem rubello astringente g'ucinantia iniiciuntur & subduntur: optimè tamen antea purgabitur corpus, modò vitiosi humores in corpore redundent. Præstantissima autem medicamenta hîc inter reliqua sunt, succus plantaginis, bursa pastoris, tam sumptus quàm iniectus, quibus maiori cum commodo nonnihil gummi Arabici & tragacanthi admisceri poterit.



Methodus pro cognitione

MENSIVM NIMIIVM
SVPPRESSORVM
INSERVIENS.

MENSIVM NIMIA SVPPRESSIO dicitur esse, cum grauium morborum periculum impendit propter nimiam menstrui sanguinis retentionem. Est autem menstruum, sanguinis quædam portio generationi à natura destinata, in vena caua redundans, & qua in vteri venas prolabitur, eaque copia distendens aperit, sicque ab eorum osculis stillans, per vteri cervicem profluit, magna ex parte semel in mense, estque omninò præter naturam mensium suppressio si ad maturam ætatem peruenerit mulier, nisi forè conceperit. In mulieribus autem potius quàm in viris contingit huiusmodi sanguinem increescere, eò quòd infirmior frigidiorque sit mare ipsa mulier, est equidem femina malculus multò calidior, eaque ratione quæ quotidie sumit alimenta perfectius concoquit: præterea id quod redundat potentius quoque discutit. Licet autem mulier pro ratione etiam satis alimentum conficiat, non tamen id quod super-

D d

uacaneum in illis est, potest ita feliciter discutere masculorum more, eò quòd calorem infirmiore confecta sit; & hoc quidem à natura data opera factum est in femina, ut alimenti ubertatem suppeditare posset femina foetui, cum uterum gerit. Vti autem menses statò tempore incipiunt, & etiam desinunt; sic etiam contingit statis circuitibus profluere, singulis nimirum mensibus, nisi femina conceperit; tunc equidem omninò sistuntur, ne utile foetus alimentum etiam emanare contingat via patente. Id quoque in lactantibus accidit, eò quòd sanguis in illis ad lactis generationem, ad mammas deriuetur. Primum autem aliquando circa annum decimum quartum erumpit menstrua purgatio aliquibus, nonnullis duodecimo; in aliis verò non ante vigesimum. Deficit verò circa quinquagesimum, nonnullis etiam circa sexagesimum. Non agimus autem hìc de ea mensium suppressione quæ ex naturali aliqua causa fit, ratione nimirum ætatis, lactationis, conceptionis, vehementis exercitationis, inedia: medicamentisque prouocari non debet, eò quòd nullam ex hisce causis, si supprimantur menses, molestiam in corpore suo mulier percipiat. sed de ea mensium suppressione sermo erit, quæ præter naturam est, & vnde periculum grauium morborum impendet, vti in mulieribus fit in quibus scire consueuerunt; & in quibus huiusmodi sanguine vniuersum corpus superabundat, quo onere, natura ita prouidente, naturaliter solet se leuare per modum iam dictum. Neque propterea quòd sanguis sit vitiosus, hoc solum fieri existimandum est, sed propter ejusdem etiam copiam; neque enim sanguis ille antequam è venis lapsus fuerit, in muliere effectus producit malos, qui menstruo sanguini à diuersis attribuuntur scriptoribus, quorum multi venenosa qualitate præditum esse asserunt; non magis quàm genitale semen antequam è vasis spermaticis lapsus fuerit. Hoc verum esse, inde satis euidenter constat, quòd fetus ante natiuitatem & post natiuitatem per plurimos menses illo

ses illo nutriatur sanguine menstruali, cum etiam post natiuitatem menses supprimantur in lactantibus.

PARS AFFECTA, ipse est uterus, qui afficitur aliquando per se, propter nimiam eiusdem membri pinguedinem; compressio enim venarum inde cum sequatur, menses aliquando vacuari prohibentur. nonnunquam in causa est carnis excrescentia in utero, aut cicatrix ex ulcere relicta. aliàs per consensum alterius partis fit, & aliquando quidem non transmittuntur superuacanea ad uterum, quæ à toto corpore transmitti cò solebant, cum bene se haberet. Est autem symptoma in genere immodicè retentorum.

SIGNA. Dolor anteriorem partem capitis occupat, diffunditque se ad fundamenta oculorum, ad ceruicem & ad scapulas, & ad lumbos: totum corpus fit graue, appetitus prostermitur: fit cogitabunda, tristis & inquieta. Faciei color vitatur: nausea comitatur, cibi que fastidium, sputationes pituitæ fiunt, inhorrescit subinde ac si concepisset, vrina fit crassa, rubicunda atque turbida, nec non nigricans subinde, rubramque quasi deponens saniem.

CAUSA. Potissimum phlegma crassum atque viscosum sanguini permixtum, causa est huius mali: obstruit enim venas quæ ad uterum mittuntur, cum quo incommodo etiam sæpè concurrit densitas uteri & angustia venarum eiusdem visceris, siue à natura, siue aliunde hoc accesserit. Aliàs etiam retinetur sanguis menstruus propter uteri inflammationem, aut pinguedinis copiam, unde compressio angustiaque sequitur venarum. aliàs contingit menses non respondere quoque cò quòd absumentur ob tenuem victus rationem, timores, immodicas curas, vigilias, mœrores, exercitationes validas, vacationes magnas per alium, sudorem, vomitum, sanguinisve profluuium, morbos longos. Atque in his casibus nò laborabimus in prouocatione mensium Intemperies quoque calida vel frigida totius corporis, aut iecoris, pulmonis, ventriculi, lienis, uteri, aliquando huius

Dd ij

mali causa est. In calidiori enim temperatura hoc excrementum consumitur atque discutitur; in frigidiori verò crassescit, magisque fit tenax sanguinis, à quo uteri vasa obstruuntur.

PROGNOSTICA. Grauiſſimarum sæpe ægritudinum causa est mensium longa suppressio; aliquando enim hinc hydropes, præfocationes matricis, podagræ, articulorum, capitis, dorsi, lumborumque grauiſſimi dolores, difficiles spirationes, tusses, melancholicæ passionēs, capitis vertigines, neruorum resolutiones, cordis tremores, viscerū tumores, syncope, dolores quasi colici nephriticique; insignis enim humorum hinc prauitas enascitur, quæ ad pulmones, cor, iecur, caput, vniuersumque corpus transfertur. Cum autem vlcerum cicatrices, oscula vasorum in vtero excæcauerint, propter eaque menses fuerint detenti, incurabile malum erit. Bonum autem est in mensium suppressione nimia, sanguinem è naribus profundī. Si quoque diutius menses subsistant, tandem vascula per quæ traduci solet sanguis, ita concluduntur, induranturque tempore, vt vix curam amplius res admittat.



Methodus pro curatione

**MENSIVM NIMIVM
SUPPRESSORVM**

INSERVIENS.

*Perficitur autem subsequentibus remediorum
generibus.*

VICTVS RATIONE.

A Er ad calidum vergat.
Cibus sit calefaciens.

Potus,

Potus, vinum odoratum.

Exercitia plurimum iuuant atque labores.

Somnus consuetudo sit tempore breuior.

Animi pathemata euitentur.

PRAEPARANTIBVS.

Syr. de quinque radicibus, capillorum Veneris.

Syr. artemisiæ, Byzantinus, de eupatorio, capillorum Veneris.

Oxymel compositum.

Aqua apij, cuscutæ, fœniculi, melissophylli, arthemisiæ, petroselini, nepitæ, thymi, rubiæ tinctorum, absinthij, pulegii.

Decoctum fiat ex radicibus fœniculi, petroselini, asari, rubiæ tinctorum, foliis nepitæ, origani, artemisiæ, sauinæ, pulegii, cinnamomo, croco, seminibus anisi, fœniculi, dauci; floribus sambuci, rorismarini, buglossæ, ciceribus rubris, in magna si quantitate ponantur, præstans fiet decoctum; colaturæ addatur oxymel compositum.

Aliquamdiu materia crassa attenuantibus, lentâque incidentibus præparanda erit; frequenter enim à pituita crassa atque lenta malum hoc fieri solet, quæ tempore eget vt appareatur; hanc eandem quoque ob causam sæpius sequentibus purganda erit medicamentis mulier.

VACVANTIBVS.

Venæ malleoli sectio fiat aut poplitis bis terve in anno, si copia adsit sanguinis, secabitur quoque vena in cubito, hinc poplitis vel malleoli, si magna adsit plenitudo, à cuius copia sæpe obstructio fouetur, quæ etiam repeti poterunt. Fouebuntur autem partes illæ antea decocto maluæ; camomillæ, meliloti, liliorum; sic equidem sanguis citius descendet.

Pillulæ de agarico, mastichinæ, alephanginæ.

Hiera simplex, logodii, diaolococynthidos.

D d iij

Diacatholicum, diaphœnicum.

Benedicta laxatiua, electuarium elefscopi, Indum maius.

Pillulæ aggregatiuæ, fœtidæ, de sagapeno, alephan- ginæ.

Agaricus.

PROVOCANTIBVS, aperientibus, & ad locum con- uenientem menstruum sanguinem allicientibus.

Theriaca Andromachi, mithridatum cum decocto cin- namomi.

Tryphera magna sine opio cum aqua cinnamomi.

Trochisc. de myrrha plurimum hîc momenti habere ex- perientia constat.

Electuarium emagogum magnarum quoque est vi- rium, nec non elect. diacalaminthes Fernelij.

Aqua mensalis nostræ descriptionis.

Vinum Hypocraticum fiat ex vino albo & cinnamo- mo, diluatûrque cum eringij decocto, vinû absinthites.

Syrupi prædicti.

Succus eringij, cum vino albo.

Decoctum prædictum, decoctum falsæ parillæ.

Vinum infusionis fauinæ, diptami.

Milium solis, fauina cum vino albo data. Castoreum plurimum quoque valet cum vino albo si detur.

Baccæ lauri, salvia, semen nigellæ, hermodactyli, agari- cus, colocynthis, zinziber, piper.

Myrrha, azari radix.

Diptami radix.

Cucurbitulæ cum scarificatione inguini, poplitibus, pubi aut coxæ affigantur, sanguisque sic trahatur ad vterum.

Frictiones fiant infernarum partium cum panno calen- te, ligaturæ quoque dolorificæ coxarum fiant.

Sacculi, infessus, fomentationesque fiant decocto præ- dicto pro lumbis atque ventre, idque tempore expur- gationis.

gationis; plurimum enim iuuant.

Balneum fiat ex floribus camomillæ, meliloti, radice rubiæ tinctorum, hyssopo, abrotano, melissa, nepita, maiorana, baccis foliisque lauri, radicibus fœniculi, petroselini, artemisia, calamintho, origano, pulegio, roremarino, baccis iuniperi.

Suffitus ex arthemisia, aristolochia, baccis lauri, iuniperi, cinnamomo, caryophyllis, cassia lignea, origano, nepita, thure, styrace, galbano.

Vnguentum pro ima ventris parte, quo post balnei vsum vteretur, ex mucilagine seminis lini, fœnugræci, butyro recenti, medulla ossis cerui, oleo amygdalorum dulcium, liliorum, rutæ, sauinæ.

Vnguentum arthanitæ, oleum liliorum, oleum de lateribus, oleum ex piperibus.

Emplastrum ex abrotano, sauina, radice cyclaminis, sagapeno, myrrha, galbano, opopanax, styrace.

Pessulus ex oleo muscellino, lateritio, medulla ceruina, radice gentianæ, & cotone muscato dictis imbuto.

Pessulus ex mercuriali contusa, theriaca, mithridato, gentiana, castoreo, myrrha, baccis iuniperi, tryphera magna, aut ex gummi ammoniaco, galbano, opopanax, sagapeno, semine melanthij, radice cyclaminis, rubiæ tinctorum, nigella, sauina, medulla ceruina, ex dictis quoque emplastrum fieri poterit; pessarium autem immittetur eodem tempore quo emplastrum supraponitur pubi.

Prouocantia menses nequaquam iis præscribemus quæ à morbo aliquo conualescunt, neque iis quæ à suppressione nihil incommodi sentiunt, sic nec in pinguibus, nec post 45. annum, neque ante decimum quartum, non grauidis, lactantibus, rursus nec iis quæ corpus habent cacochymicum, modò parum sanguinis habere verisimile sit, & quæ diuturnis morbis extenuatæ sunt; sic nec iis quæ magnam sanguinis iacturam fecerunt per profluium sanguinis e naribus aliamve aliquam regionem, tum enim potius omnibus modis

D d iij

ea quæ sanguinis boni copiam generare possunt, præscribemus, vitiaque si quæ sint, quæ hoc impedian, commendabimus. Cauere ergo debemus summoperè ne mensium fluorem frustra prouocare cum præsentibus medicamentis tentemus, cum prædicta aliqua incommoda adesse intelligemus. Verùm si copia adsit sanguinis, & si subsistant ob eiusdem crassitiem, aut lentorem, aut vasorum vteri partiumve circumstantium obstructionem magnam, aut vteri densitatem, tunc tutò dictis remediis menstrua prouocabimus.

CORRIGENTIBVS *accidentia.*

Lac.

Oui albumen conquassatum.

Oleum violaceum, rosaceum.

Aqua rosacea.

Mitigant ardorem mordacem præsentia, si aliquis à pessulis similibusve medicamentis excitatus sit; lintecolum autem prædictis insuccatum collo vteri infertur.

THEORICA ET EMPIRICA MEDICAMENTA nobilia, in MENSIBVS NIMIUM SVPPRESSIS sæpius cum summa salute plurimorum egrotorum à Gualtero Bruel experta.

CVRATIO MENSIVM NIMIUM SVPPRESSORVM.

℞ diacatholiconis ʒ vj. manne Calabrine ʒ j. syrupi arthemisiæ ʒ j. β. aquarum arthemisiæ ʒ iiij. fiat *Hausus.*

℞ syrupi arthemisiæ ʒ ij. syrupi de duabus radicibus, syrupi Byzantini ana ʒ j. aquarum matricariæ, fœniculi, petroselini ana ʒ iiij. fiat *Iuleb.*

℞ radicem asari ʒ β. fœniculi, petroselini ana ʒ j. β. sanguinæ m. β. nepitæ m. j. β. capillorum Veneris p. j. coquantur.

quantur in aqua q. s. ad lb j. colaturæ addantur syrupi de quinque radicibus ꝓ iiij. fiat *Potio*: obstructions solvit, & materiam quoque præparat.

℞ radicum fœniculi, apii ana ꝓ j. aristolochiæ rotundæ ꝓ ij. seminum anisi, cicerû rubrorum ana ꝓ ij. ꝓ. vuarum passarum enucleatarum ꝓ j. ꝓ. sauinę ꝓ j. ꝓ. florum boraginis, buglossæ, foliorum nepitę, arthemisiæ ana m. j. florum sambuci m. ꝓ. glycyrrhiæ rasæ ꝓ ꝓ. polypodii quercini ꝓ j. agarici albi & levis ꝓ iiij. ꝓ. zinziberis ꝓ ij. coquantur in aqua q. s. ad lb j. ꝓ. colaturæ addatur electuarii elefcopi ꝓ j. syrupi arthemisiæ, Byzantini ana ꝓ j. ꝓ. fiat *Potio*.

℞ electuarii elefcopi ꝓ vj. benediçtæ laxatiuæ ꝓ ij. syrupi arthemisiæ ꝓ j. aquarum nepitæ ꝓ iiij. fiat *Haustus*.

℞ pillularum de sagapeno, mastichinarum, fœtidarum ana ꝓ j. cinnamomi optimi ꝓ ꝓ. castorei, sauinę ana gr. xij. syrupi arthemisiæ q. s. fiant *Pillulæ* septem aut octo.

℞ trochiscorum de myrrha ꝓ ij. cinnamomi, castorei ana ꝓ j. syrupi arthemisiæ, vini albi odoriferi ana ꝓ ij. fiat *Haustus* præstantissimus ad sollicitandum mensium fluorem.

℞ boracis, corticum cassiæ fistulæ ana ꝓ ij. ꝓ. radicum cyclaminis recentioris, cinnamomi selectissimi ana ꝓ ss. myrrhæ ꝓ j. fiat *Pulvis*, dosis ꝓ ij. cum vino optimo.

℞ trypheræ magnæ absque opio, trochiscorum de myrrha ana ꝓ ij. theriacæ veteris ꝓ j. castorei ꝓ j. ss. mentastri, radicum diptami, sauinæ, cinnamomi, cassiæ lignæ ana ꝓ j. conseruæ buglossæ ꝓ ij. ss. fiat *Mixtura*.

℞ trochiscorum de myrrha ꝓ iiij. radicum diptami ꝓ ij. ss. sauinę ꝓ ss. castorei ꝓ ij. fiat *Pulvis*, dosis ꝓ j. cum aqua arthemisiæ.

℞ radicum asari ꝓ j. cyclaminis ꝓ iiij. foliorum nepitæ m. j. ss. sauinæ ꝓ ij. seminum apii, milii solis ana ꝓ ss.

carui 3 ij. glycyrrhizę rasę 3 v. ebulliant nonnihil in vino albo odorifero, libris autem duabus ipsius colaturę adde syrupi arthemisię, de quinque radicibus ana 3 j. ss. fiat *Potio*.

℞ radicum fœniculi, petroselini, rubię tinctorum, asparagi, rusci ana 3 j. florum camomillę, meliloti, sambuci ana m. ij. ss. foliorum roris marini, arthemisię, sauinę, nepitę, lauri ana m. j. ss. melissę, origani ana m. j. seminum lini, fœnugręci ana 3 j. ss. seminum dauci, ammi ana 3 ss. coquantur in aqua q. s. ad tertię partis consumptionem, fiat *Balneum*, vt humores liquentur atque fundantur; liquori autem calefacto insidebit vsque ad umbilicum, idque absque sudoris prouocatione, cum mensum purgationem impediat. Pubi autem applicabit sacculum arthemisia repletum, insidebitque sacculo ex decoctorum materia. Post exitum autem balnei detur hoc subsequens medicamentum.

℞ castorei 3 j. cinnamomi 3 j. mithridati 3 j. ss. decocti cinnamomi, aut vini hypocratici 3 iiij. aut cum conserua florum anthos detur.

℞ radicum ebuli lb j. sambuci 3 v. radicum rubię tinctorum, ireos ana 3 ij. foliorum saluię, arthemisię ana m. iiij. coquantur in æqua portione aquę & vini ad tertię partis consumptionem. hoc liquore quotidie à coxis infra, lotiones fient manẽ & vesperi, magnarum autem virium eius continuus vsus ad tempus aliquod esse solet.

℞ olei liliorum 3 j. ss. amygdalorum dulcium 3 ij. camomillę, axungię gallinę ana 3 ss. radicum asari, aristolochię ana 3 j. ss. fiat *Unguentum* pro inferiori regione ventris, eaque lateris parte vbi renes occultantur.

℞ radicum diptami, cyclaminis ana 3 iiij. fœniculi, petroselini, rubię tinctorum ana 3 j. foliorum saluię, nepitę, arthemisię ana m. j. coquantur in aqua q. s. ad tertię partis consumptionem; fiat *Iniectio*, dosis 3 iiij. cum 3 j. ss. castorei & grano moschi.

℞ the-

R² theriacę veteris 3 β. croci 3 β. succi ebuli, sauinę cum aqua arthemisię extractę ana 3 iij. fiat *Iniectio*.

R² medullę ceruinę 3 j. β. radicum rubię tinctorum, nigellę, baccarum lauri ana 3 j. myrrhę, castori ana 3 ij. cyclaminis, sauinę ana 3 j. β. olei liliorum q. s. fiat *Pessulus*.

R² colocynthidis, cyclaminis ana 3 β. nigellę, gentianę ana 3 ij. theriacę antiquę 3 β. cum succo sauinę paretur pessulus, qui subiiciatur cum filo vt pro lubito educi possit, cum non absque detrimento subsistere possit.

R² trochiscorum gallię muscatę, radicum rubię tinctorum, aristolochię rotundę ana 3 j. cinnamomi, caryophyllorum ana 3 β. arthemisię, nepitę, melissę ana 3 ij. thuris, styracis, galbani ana 3 j. β. fiat *Pulvis pro Suffumigio*; vapor per infundibulum traducatur ad interiora matricis.

APPENDIX

ad prædicta pro curatione MENSIVM NIMIUM
SVPPRESSORVM inseruiens.

Vbi cum magno sanitatis detrimento menses in muliere subsistunt, eorum curam aggrediemur, aliàs non. Si autem à viscidis frigidisque hoc malum fiat humoribus (vti maiori etiam ex parte fit) quę præscribuntur, sint calefacientiã, minimeque exsiccant. Omnium autem primò leniente medicamento redundantem minuemus humorem, id quod reliquum est naturę obediens vt fiat, laborabimus, tandèmq; purgante medicamento è corpore propellemus, demum quę venarum ora reserare, mensesque prouocare possunt, imperanda erunt. Hinc deorsum sanguis alliciatur sectione saphenę, aut cucurbitulis, quę poplitibus etiam cum scarificatione affiguntur. Aut lotionibus id fiat, vel balneis, nec non pessulis, quibus addemus quę dolorem ardorẽque mitigare possunt, si ægra de iis conqueratur. Pessaria autem, ne locum contiguum ulcerent, diu non permittantur in corpore subsistere,

Et post eorum ablationem cum vino calente locus lauetur, in quo melissa atque pulegium prius nonnihil ebullierint. A leuioribus autem incipiemus medicamentis, hinc ad mediocria transibimus, omnium vltimò ad fortiora, quæ in parua quantitate admittenda sunt, ne vicus aut febris excietur. Quæ omnia nunc anteaque medicamentis facile consequi poterimus, modò uniuersalia particularibus debita ratione abhibeantur. Si à nimia pinguedine obstructio fiat, exercitio utatur valido, tenuique victu. Si subsistant menstrua propter ægritudinem, aut vacuationem aliquam immodicam, aut propter inediam, seu parcam victus rationem, tunc nequaquam prouocabimus antequam prædictis malis conuenientia abhibuerimus remedia. Præstantissima autem medicamenta in mensium prouocatione inter reliqua hæc sunt, castorei 3j. cum vino generoso data post exitum balnei. Diacalaminthes Fernelij, trochisci de myrrha, tryphera magna sine opio.



Methodus pro cognitione

PRÆFOCATIONIS UTERI INSERVIENS.

P RÆFOCATIO uteri, est uteri vel malignorum vaporum in vtero generatorum recursus ad superiora, vnde intestina nec non ventriculus & septum transversum ita comprimitur subinde, vt dilatari non possit in spirationis tempore; videtur enim in hoc malo vterus modò sursum ita attolli, vt etiam membra supraposita per ordinem continuum ad superiora impellat: subinde quoque in latus retrahitur vterus. Quamquam præfo-
catio uteri conuenientiam cum epilepsia, syncope nec non apoplexia habeat, quod loquela sæpe auferatur atque corruat, aut saltem stare haud possit; tamẽ differt ab epilepsia, cò quòd in epilepsia fiat
spuma

spuma in ore, oculi conuertantur, neruorumque fiat distensio, quod in praefocatione nunquam videtur. Praefocata denique vti audit, sic sentit compuncta & intelligit, obtuse interim: epilepticus autem omnibus istis destituitur. Ex dictis patet quoque quomodo ab apoplexia differat. A syncope autem in hoc differt, quod pulsus in praefocatis permaneat, exiguus tamen est, nec non rarus languidusque. In syncope vero quasi cessat: magis quoque pallet syncope correpta quam praefocata, sudoreque magis frigido perfunditur: odorata quoque naribus praefocatae admota nocent, & contra vtero oblata iuuant; quod non accidit syncope laborantibus.

PARS AFFECTA. Vterus in hoc malo est focus huius morbi; in eo equidem sanguis menstruus aut alius quispiam humor, & frequenter quoque ipsum semen corruptum, venenatum, quandam qualitatem ex natura loci asciscit. Propter consensum autem quem vterus cum principibus partibus habet, cerebro nimirum, per spinæ membranas atque neruos, cum iecore autem mediantibus venis, cum corde vero mediantibus arteriis; nequaquam mirum est, etiamsi praecipuae dictae partes consentiant, atque male afficiantur, hisceque mediantibus vniuersum etiam corpus.

SIGNA. Magna ex parte nausea cibi que oritur fastidium, sine vomitu tamen, cum vapor malignus ex vtero ad viscera ventriculique delatus, iisdem partibus molestus est, hinc spiratio crebra atque brevis, tandemque si ad diaphragma deferatur vapor, aut vterus plurimum inflatus, ita comprimis diaphragma nec non intestina, atque ita arctantur partes, ut suffocationis metus impendeat, quasque animo despondeat, tristis sit aspectus, anima que tandem leuiter deficit, pulsu tamen vix immutato. Si caput autem petat, aliquando iracundia, alias metu turbatur, hinc aliquando quasi alto sopore concurrente obmutescit mulier, oculisque clausis corruit, palletque. Quamuis autem in aliquibus

sensus motusque seruetur, magna tamen ex parte sine voce, sensu motuque quasi attonita, iacet spiritus subinde ita parvus obscurusque est, ut sensum omnino interdum effugiat, aliquibus partes extremæ frigore corripuntur, quod è capite quasi originem habere videtur, & hinc per cervicem in scapulas, brachia, crura atque pedes illabitur, quem difficilis motus comitatur, speciesque quædam paralýsis, breui tamen discutitur. Declinante verò malo, oculi post multam gravitatem aperiuntur, malæ rubescunt, corpus firmari incipit, hinc uterus paulatim laxatur, humorisque quippiam è locis muliebribus effluit, intestina murmurant, hinc mens, sensus motusque redeunt. Instante autem accessione, crurum imbecillitas irruit, hinc sopor, pigritia, facieiq; pallor, paulatimque graviora symptomata, ut prædictum est, irruunt. Cum autem gravia symptomata excitantur, facile mulierem præfocatione laborare intelligere licet. Satis autem difficulter innotescit malum hoc, cum nonnulla huiusmodi symptomata concurrunt mitia, eò quòd affinitatem cum cardiacis & melancholicis nonnullam tunc habeat, non contingit enim in omni præfocatione matricis, prædicta accidentia omnia quæ maxime terrere solent, concurrere, sed nonnullæ mitius affliguntur, nonnullæ enim sensu, motu, nec non anhelatione priuantur, pulsusque admodum fit parvus, altissimaque syncope corripuntur: aliæ, sensu motuque permanente, in syncopen quasi incidunt: nonnullæ dolorem cordis, & tumorem matricis atque ventris conqueruntur, in tantum aliquando quòd incuruari supra ventrem cogantur. Diuersitas autem harum specierum accidit propter causæ magnitudinem, diuersitatemque.

CAUSA præfocationis est menstruus sanguis corruptus, vaporque malignus inde efflorescens, aut uteri abscessus, maiori verò ex parte fit propter semen ad uterum transmissum, ibique detentum atque corruptum. Subinde quoque ab aliis fit humoribus ibidem

cor-

corruptis ; in utero enim cum prædicta corrumpuntur, malignam venenatamque qualitatem sæpe asciscunt ex natura ipsius loci, acciditque ut unde vita, illinc etiam summa veneni pernicies oriatur, tuncque vaporibus venenatis facillimum est, non solum per venas & arterias, sed etiam per occulta spiracula ad superiores partes deferri, earumque functiones perturbare.

PROGNOSTICVM. Comitialis modo, si diuturnus fiat affectus, sæpiusque inuadere assuescat & per circuitum repetere, quamuis tutus appareat, singulis tamen accessionibus præceps quasi periculum adfert; multæ tamen à malo se recolligunt, & ad se redeunt; nonnullæ verò in ipsis accessionibus subito, aut post paucas horas moriuntur; tunc solet diu accessio permanere, sensus atque motus aufertur, pulsus multum fit inordinatus crebërque, tandem omnino etiam aboletur, postremò frigidus sudor corpus occupat, spiritusque quasi deficit; hinc syncope atque mors. Non ita metuendum malum est, si prædictis malis concurrentibus spiritus illæsus persistat, hoc quoque minus periclitantur, qui vnà cum respiratione sensum motumque satis habent liberum. Vti autem epilepsia, sic etiam hoc malum quasi circuitibus quibusdam repetit.



Methodus pro curatione

PRÆFOCATIONIS MATRICIS INSERVIENS.

Perficitur autem subsequentiis remediorum generibus.

VICTVS RATIONE.

Aer sit temperatus, non frigidus, minimèque ventosus.

Cibus. Caueat ab alimentis quæ sanguinis spermatisque multum generare possunt. Parcè quoque victitet. Vitentur omnia quæ flatus humoresque malignos atque melancholicos generare possunt.

Potus. Vinum non admittatur nisi aqua dilutum fuerit; si syncopis tamen periculum irruat, admittitur merum vinum.

Exercitia mediocria admodum profant.

Somnus solito sit breuior.

Excrementa alui respondeant arte aut natura.

Tristitia euitetur, gaudiúmque quibuscumque fieri poterit modis procuretur.

PRAEPARANTIBVS.

Syrupus de quinque radicibus.

Oxymel squilliticum.

Decoctum petasites, bryoniæ, artemisiæ, aristolochiæ rotundæ.

Syrupus artemisiæ.

Aqua nepitæ, artemisiæ, diptami, petasites.

VACVANTIBVS.

Benedicta laxatiua.

Electuarium eleuscopi.

Agaricus trochiscatus.

Hiera picra. **Hiera** diacolocynthidos.

Pillulæ

Pillulae de agarico, foetidae. Clystere.

*AVERTENTIBVS, vaporisque sursum ferri
prohibentibus.*

Ligaturae partium infernarum dolorificae, maxime crurum coxarumque, fiant etiam usque ad stuporem. Hypochondrium autem fortiter manibus comprimatur deorsum, hac equidem ratione uterus non ita libere ascendere poterit. In eundem finem fasciis succingi poterit astrictoriis.

Frictiones fiant earundem partium plantarumque pedum, ut spiritus excitati humores noxios propellant.

Cucurbitulae inguinibus coxisque affigantur, nequaquam autem superioribus partibus ipsius ventris: tunc enim uterus in superioribus aut retineretur, aut eo magis attraheretur.

Sacculi aut fomentationes ex absinthio, arthemisia, camomilla, pulegio.

Panni quoque multum calidi inae ventris parti applicati plurimum commodi afferunt.

Suffumigationes ex plumis perdicum, calceamentorum soleis, cornu caprino, castore, pice, funiculo lucernae recenter extincto, iisque similibus. Talia enim facultatem expultricem excitant, quae noxiam materiam expellendo paroxysmum abbreviat.

Odoramenta quoque naribus admota ex assa foetida, castoreo, sagapeno, galbano. Ad inferiores enim parte uterus ut descendat, efficiunt, cum graue spirantia odorem uterus refugiat, bonisque reficiatur spiritibus, haud secus atque si instrumentum olfactus haberet, eaque ratione gratum est lignum aloes, ciuetta, gallia moschata, alipta moschata, caryophylli, oleum liliorum alborum, in quo musci aliquid imponatur. Emboto autem admittatur fumus in uterum earum rerum quae bonum spirant odorem.

Sternutatoria quoque medicamenta ex elleboro, castoreo, subito paroxysmum abrumpunt: uterus enim in

E e

propriam sedem redit propter corporis exagitatio-
nem in superioribus partibus perceptam.

Spiritus comprimat aliquandiu ægra, aut insufflatio
ore in nares fiat; sic enim uterus quoque deturbatur.

Venæ internæ sectio instituetur in mensium suppres-
sione; hinc ipsius tali vena aperiatur, aut saltem san-
guisugis aut scarificatione utemur; alioqui suspe-
ctum remedium venæ sectio erit.

Friccio internarum partium uteri tam tempore paroxys-
mi quàm tempore quietis fiet digito obstetricis oleo
liliorum alborum illito, in quo zibeti, moschi aliquid
dissoluatur; sic enim interdum noxiam materiam va-
cuati contingit, matricemque ad inferna descendere.

CONFORTANTIBVS, *intemperiemque malignam
uteri emendantibus.*

Diacumitum, dauci semen.

Conserua magna nostræ descriptionis mirabiliter hu-
ius ægritudinis radices demolitur.

Castoreum cum decocto artemisiz in vino tenui detur
per intervalla.

Nares aliquando claudantur, & aër retineatur, idque
fiat breui tempore, & per intervalla; sic equidem con-
tingit calorem naturalem propter collectionem v-
nionemque confortari, vaporésque malignos dissipari.

Pessaria è cumino, agarico, hiera picra, theriaca, mitchri-
dato, pipere, zinzibere, ammoniaco, adipe anserino,
styrace.

Suffitus per sedem perforatam, vel infundibulo fiat è
cinnamomo, caryophyllis, macere, ligno aloës, lada-
no, trochiscis aliptæ & galliæ moschata.

Iniectio fiat in uterum ex oleo spicato, irino.

Vnguentum pro sumine & lumbis ex oleo liliorum,
nardino, gallia moschata, cinnamomo, oleo ambra.

Pessulus ex ladano, alipta moschata, moscho, styrace,
ambra, ligno aloës, cinnamomo, caryophyllis, oleo
spicæ, aqua rosacea.

Empla-

Emplastrum ex ladano, gallia aliptráque moscata, mos-
cho addito.

THEORICA ET EMPIRICA MEDICA-
*menta nobilia in PRÆFOCATIONE MATRI-
 CIS sæpius cum summa salute plurimorum egrotorum
 à Gualtero Bruele experta.*

CURATIO PRAEFICATIONIS VTERI.

℞ radicū angelicæ, bryoniæ ana ʒ vj. aristolochiæ
rotundæ ʒ iiij. foliorū mercurialis, artemisiæ ana m. j.
se. florum camomillæ, meliloti ana m. j. coquantur in a-
qua q. s. ad lb. j. se. colaturæ adde hieræ logodij ʒ ij. e-
lectuarij eleuscopi ʒ j. olei liliorū alborū, acirini ana
ʒ j. se. vini generosi ʒ iiij. fiat *Clystere*.

℞ Syrupi artemisiæ, syrupi de quinque radicibus, o-
xymellis simplicis ana ʒ j. se. aquarum artemisiæ, nepi-
tæ ana ʒ v. fiat *Iuleb.*

℞ radicū angelicæ ꝓ j. brytoniæ ꝓ v. fœniculi, petro-
selini ana ꝓ j. seminum anisi, apij, pæoniæ ana ꝓ se. ne-
pitæ, artemisiæ ana m. se. vuarum passarum enucleata-
rum ꝓ j. glycyrrhizæ rasæ ꝓ iij. pruna damascena, sebe-
sten ana numero vj. polypodij quercini, senæ Alexan-
drinæ ana ꝓ j. agarici albi & leuis ꝓ se. florum boraginis,
buglossæ ana m. j. zinziberis ꝓ j. se. cinnamomi ꝓ ij. co-
quantur in aqua q. s. ad lb j. colaturæ adde benedictæ
laxatiuæ, electuarij eleescopi ana ꝓ sem. misceantur, fiat
Potio, dentur ꝓ iij. in aurora.

Electuarij eleſcopi ꝓ iiij. agarici trochiſcati ꝓ j. aquarum diptami, nepitæ, petafites, fyrupi artemiſiæ ana ꝓ j. miſceantur, fiat *Hauſtus*.

℞ pillularum foetidarum, hieræ diacolocynthidos ana ℥ j. syrupi artemisiæ q. s. fiant *Pillulæ*.

℞ pillularum de sagapēno, foetidarum ana ℥ j. sc. ca-
storei ℥ se. cū syrupo artemisiæ q. s. fiant *Pillule octo nu-*

E e ij

mero. aut, R^x hieræ diacolocynthidos, pillularum aggregatiuarum ana ʒ j. assæ foetidæ ʒ sem. castorei gr. vj. fiant *Pillulæ* ut prædictum est, dentur semel in septimana.

R^x theriacæ magnæ, mithridati optimi ana ʒ j. sem. assæ foetidæ ʒ sem. decocti seminum dauci ʒ iij. fiat *Haustus*. Decoctum radicum petasites, bryoniæ, glycyrrhizæ, radicum angelicæ cum saccharo per plures dies potatum magnatum est virium ad abigendum hoc malum.

R^x olei liliorum alborum ʒ ij. decoctionis hordei mundi ʒ vj. oxymellis squillitici ʒ j. se. misceantur; fiat *Potio Vomitoria*, ter detur in aurora modicè calens.

R^x diamusci dulcis, diambriæ, aromatici rosati ana ʒ ij. mithridati optimi ʒ j. castorei ʒ ij. se. radicum diptami ʒ j. conseruæ buglossæ ʒ j. syrupi de artemisia q. s. ad electuarij mollis consistentiam.

R^x piperis albi, ellebori albi ana ʒ ij. castorei ʒ j. seminis rutæ ʒ j. se. misceantur, fiatque *Pulvis Sternutatorius* cuius exigua quantitas in nares reiciatur calamo.

R^x calami aromatici, ligni aloës ana ʒ j. salis gemmæ & nitri ana ʒ j. sem. styracis siccæ ʒ se. moschi gr. ij. aceti optimi & aquæ rosaceæ ana q. s. fiat *Pessarium*.

R^x trochiscorum gallinæ muscatæ ʒ ij. aliptæ muscatæ ʒ j. calami aromati, styracis siccæ, caryophyllorum, maceris, ligni aloës ana ʒ iij. moschi, zibetti ana gr. vj. cum aqua rosacea q. s. fiant trochisci pro *Suffitu*. Tempore vsus, vnus in carbones ardentes coniciatur, fumusque in vterum per infundibulum recipiatur.

R^x olei liliorum, nardini ana ʒ j. se. kerini ʒ j. moschi gr. v. galliæ muscatæ, styracis ana ʒ se. commistis omnibus fiat *Linimentum* molle pro regione pubis partéque vteri interna.

R^x emplastri ceronei ʒ ij. trochiscorum galliæ muscatæ ʒ j. se. cinnamomi electi, foliorum lauri ʒ j. ladani ʒ j. se. olei liliorum alborum q. s. fiat *Emplastrum* quod pectinis regioni applicetur: bis autem in die idem locus, nec non

nec non sinus uteri, oleo liliorum alborum inungetur placidentibus autem optimè id fiat manibus.

APPENDIX

ad prædicta procuratione PRAEFICATIONIS VTERI inseruiens.

Si ex accessione periculum imminet ob accidentium extremitatem, omnium primò symptomata pernicioſa placabimus antequàm causam morbi oppugnare incipiamus: ægotam ergo excitabimus, partim odoribus ingratis ex aſſa fœtida, ſulfure, caſtoreo candelis extinctis, pice plumis, ungulis aſinorum, aliisque ſimilibus uſtis; habent enim huiusmodi odores magnam efficaciam in hoc malo. Pessariis quoque ſubiectis materia peccantem euocabimus, accidentiâque grauiſſima placabimus. Idem quoque conabimur odoratis rebus utero admotis perficere; bene enim olentibus reficitur, uti malum ſpirantibus odorem offenditur, imò à vaporibus certæ naturæ ita intumeſcit & attollitur, ut etiam ad diaphragma aſcendat, ut illos effugiat; illudque comprimendo ſpiritum impedit, utque magna cum difficultatè trahatur, efficit. Omni etiam ratione quæ malignos vapores ad cor aſcendere prohibent, hic adminiſtrentur; bona etenim pars citæ in eo conſiſtit, ut vapores ſuſſum ne ferantur, inhibeamus; in quem finem ligaturis, frictionibusque partium infernarum utemur, aliisque prius dictis ingeniis quæ auertere poſſunt vapores malignos ſuſſum aſcendentes. Cum autem à paroxyſmo conualuerit, obſeruabimus quænam ſit mali cauſa, & ſecundum eius diuerſitatem, legitimam curandi rationem inſtituemus. A menſum enim ſuppreſſione ſi fieri intelligamus, ut debitis temporibus fluant procurabimus, quemadmodum prædictum eſt. Si autem ob ſemen in utero retentum corruptumque fieri veriſimile ſit, ea quæ ſeminiſ generationem fieri prohibent, præſcribantur, aut viri conſuetudinem admittat, aut titillari digitis obſetricis collum uteri debet, ut materia corrupta vacuari queat; digitum autem inungat prius oleo liliorum obſetrix. Si autem ab aliis corruptis in utero humoribus malum, concoquantur omium primò naturæque obediētes reddantur ſecundum rei exigentiam. Hinc purgentur conuenientibus medicamentis, & e corpore educantur, tandemque quæ cor-

Ee iij

roborare, intemperiemque malam uteri emendare possunt, præscribantur. Quæ omnia nunc antea que dictis medicamentis felicissimo cum successu consequi poterimus, modò uniuersalia particularibus debita ratione adhibeantur. Præseruationis autem causa, ieiunare frequenter laboribusque se exercere satis seriis proderit. Item utatur semine cumini, cinnamomo, croco, semine dauci; secretum equidem hoc est quibusdam remedium.



Methodus pro Cognitione

MORBUS ARTICULARIS INSE- VIENS.

ARTHRITIS, seu morbus articularis est, ubi multi articuli doloribus molestantur ex interuallis recurrentibus, seu est articulorum imbecillitas dolorque ex interuallo inuadens, magna ex parte à fluxione ortum habens, quæ se insinuat inter ligamenta aut membranas tendinèsvē articulorum. Hoc enim in malo ipsi articuli primùm humores suscipiunt, qui demum membranis adjacentibus etiam se insinuant. Si in manuum carpo, digitorumve articulis, ligamentis, vel lacertis fiat, chiragra dicitur. Si verò in genu obhæreat, tunc genogra:coxendricis verò dolor dicitur, cum grauissimè excruciat supra articulum coxæ, vnde in femur, suram, extremumque pedis diffunditur, secundum ductum nervorum scilicet. Non autem in magno coxæ articulo, sed altius hæret ad summam natem scilicet. In pedibus verò podagra nominatur, siue malleolos, siue plantam pedis, siue pollicis articulum occupet. Nō itaque quilibet articulorum dolor, morbus articularis vocabitur: verum ille solūmodò, qui ex imbecillitate articulorū, propter eorum

corum laxitatem, viarumve amplitudinem, humorumque defluxum natus est. Humerorum quoque articulos atque vertebrae aliquando inuadit. Adde nullam aliquando esse ossium connexionem, quæ immunis sit ab hoc dolore. Quilibet autem alterius articuli dolor, generis nomine, arthritis dicitur. Vfus equidem tribus tantummodo articulorum malis nomina propria indidit. Hinc quoque constat species iuncturarum affectuum, non toto inter se differre genere, sed solummodo locorum affectorum diuersitate.

PARS AFFECTA. Partium corporis articulo atque tendines, vincula, membranæque quæ ossa vel connectunt, vel ambiunt, hæc afficiuntur; contingitque membranas impleri, subindeque etiam distendi. Estque hic affectus symptoma pertinens ad actionem læsam facultatis sensitivæ: ipse equidem tactus oblæsus est.

SIGNA. Grauib. doloribus afficitur æger diu, qui per intervalla recurrunt. Cum autem primò malum inuadit, paulatim accedit, oriturque aut levis podagra, aut genogra, aut chiragra, coxendicisve dolor. Si autem mala victus ratione utatur, sæpe plures in corpore articulos circumuenit, imò subinde nulla connexio expers huius cruciatus est, ita ut aliquando vertebrae dorsi, quandoque etiam ipsum guttur, nonnunquam etiam ipsas genas inuadat. Nullus magna ex parte tumor conspicuus est in podagra; nec in coxendicis malo. In chiragra verò, nec non in genogra, frequenter cum dolore pulsatili, tumor, rubor, molestusque calor ex doloris vehementia concurrit. adde quòd subinde etiam inflammatio accersatur, tuncque appetitus, prostermitur vigilie molestæ perturbant, aliquando etiam febris.

CAUSA. Cuiusvis articularis morbi causa magna ex parte est copia humoris pituitosi, alte ulve in venis magnis, iecore, capiteve, nimium exuberans dictasque partes propterea grauans, quæ ut se onere leuens prædicta excrementa aliquando in articulorum vincula, membranas tendinesque propellunt. Ex eorum autem

illapsu contingit impleri atque distendi has partes, nec non debilitari. Accidit hîc quoque humorem illapsum tempore crassescere, & indurescere virtute caloris circumstantis, aut vi medicamentorum, unde tophi calculive quasi naturam induit, & tunc quidem nodosa arthritis oritur: in qua articuli aliquando distorquentur, nonnunquam quoque incurvescunt, mouendique facultas amittitur. Copiam autem horum excrementorum maximè accrescere solent quatuor hæ causæ, veneris, vinique generosioris immodicus usus, cruditas, partisque imbecillitas; adde otium, consuetarum exercitationum intermissionem, nec non vacationum consuetarum suppressionem. A parentibus quoque in prolem deriuari solet hoc malum.

PROGNOSTICA. Dolores podagrici vere & autumno magna ex parte mouentur. Hic morbus si in adultam incidat ætatem, nunquam perfectè curatur. In iuniore autem ætate multum sperare licet, si bona utatur victus ratione, aluumque solutam habeat, corpusque haud segniter exerceat, modò nodosa necdum sit enata arthritis, cum ea curam non admittat. In hoc malo si tormina concurrant, aut diarrhœa, leuatur æger, plurimumque ingrauescit malum ex immodico usu veneris atque vini generosioris. In coxendicum malo dolor grauior excitatur, quàm in aliis speciebus arthritidis, eoque magis diu durabit, quò maior torpor, frigusque in crure, coxia, lumbisque fuerit, & quò magis est annosus, astrictamque aluum habet. Bonum est hîc dolorem ad inferiora transisse, coxa lumbisque relictis. Hydropem, aliquando quoque asthma adducitur tum podagra, tum coxendicis dolor, eaque incurabilia mala magna ex parte fiunt. Vti autem podagrici dolores, sic & coxendicum, etiam si homo iam liberatus videatur, facile recurrere solent.

Metho-

Methodus pro curatione

ARTICULARIS MORBI
INSERVIENTS.

*Perficitur autem subsequenter remedium ge-
neribus.*

VICTVS RATIONE.

A Er sit temperatus, potius tamen ad siccitatem de-
clinat & caliditatem.

Alimenta conueniunt quæ modicè nutriunt, quibus so-
briè quoque vti conuenit: satiari enim cibus admo-
dum noxium est; imò famem perferat subinde per a-
liquot dies.

Potus sit aqua mellis, aut aqua in qua parum cinnamo-
mi decoctum sit, aut semina anisi. vitet vinum, potis-
simùm generosum.

Exercitium satis sit serium vbi malum quieuerit; tem-
pore enim fluxionis illud vitabit.

Somnus sit moderatus; longior enim fomenta suggerit
ipsi morbo, noxiùsque est.

Aluum solutam arte aut natura habeat.

Veneris abstinencia vti multum in hoc malum iuuat,
sic immoderatus vsus mirum in modum huic malo
incrementum dat.

Animi perturbationes fugiat.

PRÆPARANTIBVS.

Oxymel simplex.

Mel rosatum.

Syrupus stœchados.

Syrupus de succo boraginis.

Aquæ betonicæ, absinthii, boraginis.

A multum aperientibus acetatisque hic abstinendi.

mus medicamentis; cum priora materiam ad fluxum irritent, acetum verò inimicum existat nervis.

VACVANTIBVS.

Venæ sectio fiat si sanguis redundet, & morbus iam primò hominem affligat ipsius humerariæ eiusdem lateris, potissimum si infernæ partes laborauerint. Tandem verò secabimus etiam poplitis aut malleoli venam; coxendicum enim dolorem omninò aliquando delet. Ea quoque quæ iuxta annularem & paruum digitum reperitur, secabitur maximo cum commodo, si suis temporibus repetatur. Si verò manus brachiæve dolore afficiantur, secabimus venam poplitis eiusdem lateris maximo cum commodo.

Electuarium de succo rosarum, benedicta laxatiua, elef-
copi elect. diaturbith cum rhabarb. diacatholicum.
Triphera Persica lenissimè vacuat citra agitationem
humorum.

Pillulæ coxiæ, foetidæ, de sagapeno, aureæ, de hermo-
dactilis maiores, arthetica, de opopanace, Arabicæ
plurimum hîc profunt.

Hiera picra, agaricus trochiscatus, rhabarbarum, myro-
balani kebuli, turbith.

Syrupus de multiplici infusione rosarum.

Decoctum radicum asari, stœchados, herbæ paralyti-
cæ, iuæ, senæ, polypodij, agarici, myrobalanorum ci-
trinorum, kebulorum, centaurei minoris, seminum
anisi, fœniculi, benedicta laxatiua, electuario elefco-
pi additis.

Clysteres in coxendicum supernarumque partium ma-
lis efficaces sunt, reuellunt equidem, placidoque ca-
lore qui membris ab oleis communicatur, refocillari
contingit partem languentem.

Nulla ratione omittenda sunt quæ totum corpus
onere leuare possunt. Cum autem rariùs hoc malum ab
vno fiat humore peccante, curatio correspondens quo-
que instituatur.

AVER-

AVERTENTIBVS.

Vomitum fiat cum decocto radicum raphani, atriplicis, seminis asari, florum genistæ, syrupo acetoso simplici, oxymelle simplici, squillitico, aqua tepida.

Cucurbitulæ quoque maximam vim habent in coxendicum dolore, si primò superioribus partibus affigantur frequenter, à quibus humores ruere in locum affectum verisimile est. Deinde magnæ loco dolenti etiam accommodabuntur.

Frictiones.

Ligaturæ.

Vrinam mouentia.

Sudorem prouocantia.

Cauterium potentiale ex calce viua, melle anacardino, sapone, nitro, euphorbio. Aut ex cantharidibus, capitibus aliisque abiectis, staphide agria, fermento, melle anacardino; aut cum radicibus foliisque iberidis herbæ cum axungia veteri emplastrum fiat, quod articulo coxæ, vniuersoque accommodetur cruri; quod singulis vicenis diebus repetetur.

A repellentibus hîc abstinere debemus medicamentis, cum dolorem potius augere possint, eò quòd humores intro pellant, ibique detineant.

MITIGANTIBVS *dolorem.*

Oleum sambucinum, axungia humana, oleum amygdalorum, camomelinum, oleum florum verbasci in coxæ doloribus plurimum iuuat. aut radices & flores verbasci in vino rubro macerabuntur 24. horis, destilletur postea; hinc splenium madescat in extracto liquore, caleatque dum parti affectæ accommodatur; fiatque hoc aliquoties in die. Inungi pars quoque poterit oleo prædicto. Oleum spicæ multum quoque commendatur.

Vnguentum ex prædictis oleis, addendo pinguedinem vulpis, axungiam suilli veteris, butyrum, oleum terebinthinæ.

Cataplasma fiat ex solis radicibus althææ cum farina

hordei, axungia suilla, aut cum radicibus althææ, farina lini, fœnugræci, hordei, floribus meliloti, camomillæ, absinthio, iua, mica panis, stercore bouis, semine papaueris, momento opij, oleo camomelino, vulpino, rosarum, lacte caprino; aut semina lini, fœnugræci, aqua & aceto coquantur, mucilaginisque quantitas extrahatur; quæ melli permista, parti per triduum apponantur.

Ceratum ex thure, galbano, ammoniaco, croco, oleo rosato, aceto, resina, cera.

Anodynis medicamentis utemur, non autem stupefacientibus, nisi dolor supra modum fuerit acerbus. Quotiescumque autem stupefacientibus coacti fuerimus uti medicamentis, ea quæ placidè calefacere possunt, applicabimus, postquam iam dicta stupefacientia medicamenta ablata erunt; periculum enim est ne membrum alioqui nimium debilitaretur ab intemperie relicta.

ROBORANTIBVS *partem affectam, digerentibusque reliquias mali.*

Theriaca, mithridatum, diacorallum, decoctum geniste, radicum cynæ, guaiaci.

Conserua magna nostræ descriptionis mirificè præseruat ab hoc malo.

Vnguentum ex oleo vulpino, nardino, camomelino, liliorum, laurino, de euphorbio, de lateribus, rosato.

Vnguentum ex decoctione vermium terrestrium, salvia, nepita, roremarino, genista, aristolochia, vulpe.

Vnguentum Agrippæ, martiatum, aregon, ex adipe anseris, suillæ, oleo vulpino, camomelino.

Balneum ex granis iuniperi, floribus camomillæ, meliloti, radicibus ebuli, foliis lauri, salviæ rorismarini, origani, absinthij, betonicæ, rosis, ebulo. Fomentetur quoque locus cum spongia hisce imbuta liquoribus, postea inungatur cum axungia humana, petroleo.

Bal-

Balneum naturale sulfureum.

Ceratum fiat ex oleo camomelino, anethino, lumbricorum, castoreo, addito sulfure.

Cataplasma ex floribus camomillæ, meliloti, foliis & radicibus althææ, seminibus lini, fœnugræci, cumini, oleisque prædictis.

Emplastrum ex floribus camomillæ, meliloti, salvia, pulegio, farina fœnugræci, gummi ammoniaco, opopanace, sagapeno, oleo sambucino, rutaceo, vulpino, camomelino, laurino, terebinthino, pice, cera.

Emplastrum Iohannis de Vigo.

Ab immodicè resoluentibus hîc quoque abstinere debemus providè; periculum enim est ne tenuiori humore dissipato, crassôque relicto, cum in tophaceam callosâve transmutemus substantiam.

THEORICA ET EMPIRICA A MEDICAMENTA nobilia, in MORBO ARTICULARI sæpius cum summa salute plurimorum egrotorum à Gualtero Bruel experta.

CURATIO ARTICULARIS MORBI.

℞ radicum acori, polypodii quercini ana ℥ j. agarici ℥ ss. foliorum salviæ, lauri, maluæ, rutæ, centaurei minoris, hypericonis ana m. j. β. florum camomillæ, meliloti ana m. j. seminum anisi ℥ j. coquantur in aqua q. s. ad lb j. ss. colaturæ adde electuarii elefcopi, diaturbith cum rhabbarbato ana ʒ vj. olei rutacei, camomelini, sambucini ana ℥ j. misceantur, fiat *Clystere*.

℞ oxymellis simplicis & squillitici ana ʒ ij. aquæ tepidæ ʒ iij. olei communis ℥ j. misce pro *Vomitório* medicamento.

℞ oxymellis simplicis, syrupi stœchados, mellis rosacei ana ʒ j. aquarum fœniculi, petroselinî, betoni-

cæ ana ʒ iiij. misceantur, fiat *Iuleb*.

℞ radicū asari ʒ iiij. petroselini ʒ ij. chamæpityos, endiuæ, hypericonis, saluæ ana m. j. seminis anisi ʒ vj. seminis melonis ʒ v. hermodactylorum ʒ j. ꝑ. foliorum fenæ, carthami contusi, polypodii quercini ana ʒ v. zinziberis albi ʒ ij. coquantur in sufficienti quantitate aquæ ad libram vnā, colaturæ adde sacchari albi ʒ ij. fiat *Potio*.

℞ pillul. foetidarū, de sagapeno, cochiarum ana ʒ j. rhabarb. electi, myrobalan. Indorum ana ʒ ꝑ. fiant *Pillule* septem aut octo.

℞ radicū asari ʒ ꝑ. seminis nasturtii, atriplicis ana ʒ iiij. seminis erucæ, asari ana ʒ ij. radicū raphani ʒ j. coquantur in aqua q. s. ad medietatis consumptionem. Vnciis quinque huius decocti addatur oxymellis squillitici ʒ j. olei camomelini ʒ vj. fiat *Vomitorium* medicamentum, detur tepidum.

℞ pyrethri conditi ʒ iiij. zinziberis conditi ʒ j. ꝑ. diatrion piperei ʒ iiij. fiat *Electuarium* molle.

℞ electuarii eleescopi, diaturbith cum rhabarb. ana ʒ iiij. ꝑ. electuarii de succo rosarum ʒ j. sacchari albißimi q. s. fiat *Bolus*.

℞ radicū rusci, asparagi ana ʒ j. herbæ paralyticæ, stœchados Arabicæ, iuxæ ana m. j. seminum anisi, petroselini ana ʒ ꝑ. glycyrrhizæ rasæ ʒ iiij. ꝑ. fenæ Alexandrinæ, polypodii quercini, carthami contusi ana ʒ v. coquantur in aqua q. s. ad lb j. ꝑ. colaturæ addatur electuarii eleescopi, benedictæ laxatiuæ ana ʒ v. electuarii de succo rosarum ʒ j. ꝑ. fiat *Potio*.

℞ radicū ebuli lb j. saluæ m. iiij. hyssopi, pulegii, absinthii ana m. ij. rapas duas aut tres, florum camomillæ m. ij. seminis lini ʒ j. granorum iuniperi lb ꝑ. coquantur in aqua in qua vulpes exenterata cocta fuit ad dissolutionem, tandem addantur sulfuris, aluminis ana ʒ vj. fiat *Balneum*.

℞ mithridati, theriacæ electæ ana ʒ ij. aquæ cinnamomi q. s. fiat *Haustus*, ante balnei sumat exitum

tum, & post exitum lecto se committat ita vt sudare possit.

R \acute{e} olei lateritii, petrolei ana 3 ij. olei camomelini, vulpini, terebinthini, sambucini ana 3 iij. vnguenti Agrippæ, pinguedinis cati siluestris ana 3 ss. axungie castoris 3 j. ss. misceantur, fiat *Vnguentum*.

R \acute{e} olei lumbricorum 3 j. galbani 3 j. castorei 3 ij. ss. nucis muscatæ, saluiæ ana 3 ij. ss. axungie humanæ, olei terebinthini ana 3 ss. misceantur, fiat *Vnguentum*.

R \acute{e} olei sambucini lb ss. in eo coquantur radices ebuli contusæ 3 iij. colaturæ addantur axungie humanæ 3 ij. olei vulpini, petrolei ana 3 ss. galbani, ammoniaci ana 3 vj. adipis gallinæ 3 j. ss. ceræ & aceti q. s. fiat *Vnguentum molle*.

R \acute{e} radicum ebuli 3 iij. rapastres numero, seminum fœnugræci 3 j. ss. coquantur in aqua q. s. ad mollitudinem addendo stercoris vaccini 3 iij. mellis q. s. fiat *Cataplasma*.

R \acute{e} picis 3 iij. sulfuris viui 3 j. ss. olei rosacei q. s. fiat *Emplastrum*, extendatur in pelle ouina calente.

R \acute{e} radicum althææ 3 ij. florum camomille m. ij. rosarum rubrarum, foliorum absinthii, maioranæ, caulium ana m. j. rapas duas iustæ magnitudinis; bulliant in sufficienti quantitate ceruissæ bonæ, adde farinæ hordeaceæ, triticeæ, seminum lini, fœnugræci ana 3 ss. olei lateritii 3 iij. olei vulpini, camomelini in quo vermes terrestres ebullierint ana q. s. vitellum vnum oui, croci 3 ss. fiat *Cataplasma* doloris sedatiuum & resolutiuum optimum.

APPENDIX

ad prædicta pro curatione ARTICULARIS
MORBI inserviens.

Omniū primò communem corporis sentinam euacuabimus enemate conuenienti. Humores dcmum peccantes naturæ obediētes reddemus. Hinc è corpore deturbabimus purgatorio medicamento. Demum humores aliunde influentes in partem affectam auertentibus medicamentis inhibebimus, in quem finem vomitum prouocabimus per tres aut quatuor dies continuos; antea uerò utetur alimentis diuersis, potissimùm liquidis pinguibûsque. Demum dolores si persistant, leniemus anodynis medicamentis. A stupefacientibus autem quàm maximè abstinēbimus, nisi nimius dolor atque ardor contrarium imperat, tuncque licebit unguentum componere ex olei rosacei, camomelini ana ℥ j. opij granis aliquot, ceræ & aceti sufficienti quantitate. Partem autem ægram abluemus post amotionem stupefacientis medicamenti, cereuisia calente. Commodè quoque propinabimus syrupum cydoniorum, rosarum, cum aqua plantaginis sæpius: humoribus equidem sic libertas illa ad fluendum ex parte adimitur. Tandem roborabimus cerebrum partemque affectam conuenientibus medicamentis, intemperiemque relictam emendabimus. Quæ omnia nunc anteaque dictis medicamentis consequi poterimus, modò uniuersalia particularibus debita ratione adhibeamur.

Metho-

*Methodus pro cognitione*LVIS VENEREÆ
INSERVIENTS.

LVES VENEREÆ malum est contagiosum quod consuetudine Veneris magna ex parte contrahitur. Superioribus ætatibus incognitum fuit malum; nunc autem plurima secum mala, detestanda atque molestissima accidentia adducit. Ex paruo quidem sæpe initio ortum habet, tempore nihilominus ita increscit, ut non solummodo humiores, & hinc spiritus oppugnet, sed tandem etiam nervos, membranas, tendones, carnem, ossa, reliquasque corporis partes emori faciat paulatim, eorum temperamentum, totamque substantiam pervertendo, unde diuersa plurimaque excrementorum genera enascuntur. Vocatur autem commodè lues Veneræ, eo quod consuetudine Veneris magna ex parte contrahatur. Per plures autem menses sæpe in corpore delitescit priusquam sæuire incipiat, aliquando etiam per annum.

PARS AFFECTA. Iecur hinc primario laborat, quod patet ex actionibus naturalibus læsis: mala equidem concoctio fit in ventriculo, cerebro, aliisque partibus, unde magna coloris mutatio fit. nec non corporis totius corporis. Appetitus quoque coeundi prosternitur. Estque morbus totam substantiam pervertens, non temperamentum tantum; eaque ratione tam varia excrementorum vitiorumque genera efflorescunt, habetque analogiam ad totam hepatis substantiam potius quam ad cor, stomachum, vel cerebrum, eiusdemque spiritus naturales potius quam virales, aut animales oppugnat; qui corrupti, iecur non possunt non inficere, unde gummata morbi Gallici, pilorumque de-

fluuium fieri solet aliquando, etiam si numquam pruritum circa pudenda, aut vlcera, aut gonorrhœam veneream perpessi sint.

SIGNA. In principio mali in inguinibus bubones venerei frequenter enascuntur, atque in pene, ductibusque urinariis malignæ sunt pustulæ, quæ tempore lentam saniem quoque reddunt, urinæque stillicidium atque ardorem efficiunt. Venerei quoque seminis sæpe comitatur profluuium. Nonnunquam quoque exiguæ frequentesque maculæ, nunc flauæ, nunc rubræ squalidæque lentiginum instar per summa corporis apparent in locis diuersis, quæ non nisi resolutio morbo tolluntur. Dolor denique nervorum, grauitas capitis, scapularum, collique sæpe comes est. Prædictæ quoque maculæ subinde subsident, rursus quoque oriuntur, quæ tempore virulentiam sæpe acquirunt, cutemque cauant, vnde vlcera plura in corpore oriuntur sordida atque virulenta. Huiusmodi etiam pustulæ foetidæ sæpe in intimo oris angulo, in palato, in naribus, in faucibus enascuntur nigrae foetentesque; temporeque lingua, fauces nariumque particulae exulcerantur, eò quod magis sint tenellæ partes aliis. Hinc brachiorum, crurum, capitique dolores sunt, nec non exulcerationes. Sæpe quoque in hoc malo capitis atque barbæ pili defluunt. Insomnes noctes peraguntur. Dolores autem frequentius mediis hinc artubus inhærent; non autem ita in articulis, cum hoc morbis articularibus conueniat. In prædictis autem locis sæpe tophi tuberositatesque ægrè dissolubiles oriuntur, quibus tamen magis frequens sedes est in fronte, in capite, in tibiæ prioris parte, in medio humeri: vnde tandem difficilia vlcera quoque enascuntur, quæ ossa etiam tempore corrumpunt, maximosque dolores per noctem potissimum inferunt, cum nerui, membranae, vincula atque ossa hinc infringantur, imò ossa haud aliter atque carnes exeduntur, membranaeque ab ossibus diuelluntur, humorisque

acrimo-

acrimonia punguntur. Atque iam dicta signa omnia, non semper in omnibus observantur, sed nunc hæc, nunc alia.

CAUSA. Qualitas sordida atque maligna, in se continens contagij labem ex infecto corpore alteri communicata per contactum, huius mali causa est. Magna autem ex parte ex concubitu venereo pudendis communicari solet propter mollitiem rarâque eorum substantiam. Vestibus quoque, orî, nec non cuti communicatur aliquando hæc qualitas: quæc eò citius vires exeret, quò virtutes naturales hepatis imbecilliores fuerint. Vnde quoque accidit aliquando quòd plures cum infecta coeuntes, omnes quasi inficiantur, iis demptis qui vires naturales validas habent. Quemadmodum in peste, quamvis omnibus communicetur pestilens aër, non tamen omnes ex æquo inficiuntur, eò quòd spiritus vitales validiores nonnulli aliis habeant.

PROGNOSTICVM. Recens quamdiu malum fuerit, medelam admittit; cum verò iam in vetustatem abierit, nequaquam. Contagiosa autem hæc lues venerea omninò est, contactuque solo excitatur, cui feminae opportuniore sunt viris. Contingit in hoc malo hominem frequentibus vigiliis, continuis ærumnis, febrique etiam tandem molesta opprimi atque perire. Malum quoque hoc à parentibus ad liberos transfertur. Solet frequenter quoque adducere phthisim, hydropem, asthma, vbi iecur immodicè læsum fuerit.

Ff. ij.



Methodus pro curatione

L V I S V E N E R E Æ I N S E R V I E N S.

Perficitur autem subsequentibus remediorum generibus.

V I C T U S R A T I O N E.

A Er sit aliquo modo calidus; frigus enim medicamentorum operationem impedit.

Cibus. Tenui victus ratione utatur. Sit panis biscoctus, aut crusta panis. A multis quoque conceditur panis bene coctus. Carnes conueniunt gallinarum, pullo- rum, caponum, phasianorum, auicularum; sintque as- sę potius quam elixę. In die tamen quo purgatorium sumit medicamentum, elixę concedantur. Ea autem quę frigidos crassosque humores, nec non flatus ge- nerare, sanguinemque inflammare possunt, prohi- benda sunt.

Motus admodum conuenit qui sudorem placidè mo- uere possit, sic equidem materialique facta frequen- ter expellitur.

Somnus sit moderatus.

Excrementa alui purgante medicamento semel in se- ptimana mouenda sunt, & potissimum si humores peccantes multum crassi sint; tenues enim melius per sudorem euacuantur.

A Venere abstineat.

Animi omnes fugiat perturbationes.

P R A E P A R A N T I B U S.

Oxymel simplex, syrupus acetosus, fumarix, endiuix, violarum, buglossę, lupulorum.

Aqua

Aqua cichorei, violarum, boraginis, endiuæ, buglossæ.

Syrupus de stœchade, oxymel simplex, squilliticum.

Syrupus de fumaria, compositus.

Prioribus, si biliosi fuerint humores redundantes, uti in illis accidit qui ulcera habent virulenta; posterioribus verò, si pituitosi sint humores exuperantes, utemur.

VACVANTIBVS.

Pillulæ aggregatiuæ, artheticae, de hermodactylis, co-
ciæ, de fumaria, de agarico, de colocynthide, foetida,
sine quibus esse nolo, aureæ, assaieret, de rhabbaro,
de quinque generibus myrobalanorum.

Hiera Pacchij, electuarium eleuscopi, addito lapide la-
zuli, diasena.

Confectio hamech, electuarium de psyllio.

Electuarium Indum maius, diaprimum simplex.

Decoctum senæ.

Apozema seu potio ex radicibus asari, iridis, fœniculi,
asparagi, diptami, tormentillæ, aristolochiæ, cichorea,
bethonica, fumaria, eupatorio, scabiosa, scolopendria,
cuscuta, corticibus ebuli, thymo, epithymo, semini-
bus anisi, fœniculi, floribus boraginis, violarum, bu-
glossæ, sena, agarico, polypodio, elleboro nigro, rha-
barb. hermodactylis, myrobalanis, citrinis, kebulis,
glycyrrhiza, vuis passis, cinnamomo, caryophyllis,
zinzibere, syrupo de fumaria, de epithymo, oxymelle
simplici.

Hermodactyli, colocynthis, agaricus, sena, epithymus.

Clystere ex decoctione vrticæ, buglossæ, althææ, maluæ,
fumariæ, lupulorum, camomillæ, mercurialis.

Venæ sectio fiet si corpus sit plethoricum, & recens ad-
huc sit malum ipsis iecorariæ, & potissimum si dolo-
res magni concurrant; eos enim sedat.

Frequenter sunt reiteranda hæc medicamenta pur-
gantia, eò quòd magna ex parte vitiosorum humorum
hic sit multa copia. Detur autem apozema quatuor con-
tinuis diebus singulis septimanis, idque per quatuor

vel quinque septimanas fiet. Reliquis diebus utetur electuario huic morbo dicato. Licebit hic post prandium exire, imò etiam ante prandium cum electuario sumit.

DISSIPANTIBVS expellentibusque contagionis seminaria, labemque mali.

Potio sudorifica ex decoctione scobis ligni guaiaci, medicamentum admodum est tutum atque efficax tam in nouo quàm in vteri morbo Gallico, nec non in recidiua. Decoctum radicum cynæ, sarsæ parillæ, apios. hæc enim in locum guaiaci successerunt. Spuma autem decoctionis guaiaci, sarsæ parillæ, cynæ, vlcera pustulæque vngantur.

Aqua theriacalis, theriaca cum aqua vitæ destillata.

Electuarium ex theriaca, mithridato, radice angelicæ, tormentillæ, pimpinellæ, zedoariæ, limatura ligni guaiaci, seminibus iuniperi, pæoniæ, cardi benedicti, scabiosa, hypericone, diptamo, gentiana, cortice citri, tamarisci, succo scordij, cinnamomo, myrrha, thure, conferva buglossæ, saccharo rosato, syrupo de corticibus citri.

Conserua nostra magna.

Vnguentum sudorificum ex myrrha, mastiche, thure, radice enulæ campanæ, theriaca, mithridato, bdellio, galbano, gummi ammoniaco, vnguento martiato, oleo laurino, liliorum, camomelino, amygdalino, terebinthino, butyro, axungia suis, gallinæ.

Ceratū ex materia prædicta seu sparadrapum, quo corpus vestiatur si negotia ita urgeant; sudabit autē manē.

Vnguentum ex prædictorum materia, argento viuo, oleo terebinthino, philosophorū, petroleo, aqua vitæ. Vnguentum Iohannis de Vigo, vel Neapolitanum dictum, in grauib; huius morbi querelis plurimum proderit.

Suffitus sudorificus ex ladano, olibano, mastiche, thure, aloë,

aloë, sandaracha, styrace, cinabrio sublimato, radice diptami, zedoarię, mace, caryophyllis, calamo aromatico, guaiaco, lauri baccis, theriaca. Præstantissimum quidem est medicamentum; eo tamen non utemur, nisi frustra alia tentaverimus auxilia, cum frequenter noceat. Certis tamen distantibus corporis partibus tutò adhibere licet, cruribus nimirum, vel brachiis, cum dolores scilicet, aut mala adsunt ulcera. Eo autem totum corpus suffumigabimus, donec saliva fluere incipiat, aut donec dolores remittantur, aut ulcera exsiccentur.

ROBORANTIBVS.

Lxtificans Galeni, theriaca, mithridatum cum conferva buglossę.

Diatrium sandali.

Diamargaritum frigidum.

Diarhodon abbatis.

Cortices citri conditi, myrobalani conditi.

Conserua buglossę, florum saluię, radicum enulę campanę, acori, florum rorismarini.

Epithema pro corde ex speciebus diamargariti frigidi, sandalis, melissę.

Symptomata autem atque accidentia diuersissima atque gravissima cum hunc morbum comitantis soleant, si altius radices veneni labes in corpore egerit, quomodo curari debeant, suo loco proponemus.

THEORICA ET EMPIRICA MEDICAMENTA nobilia in LVE VENEREA sæpius cum summa salute plurimorum agrotorum à Gualtero Bruel experta.

CVRATIO LVIS VENEREÆ.

℞ radicum communium ana ʒ ꝑ; seminum petroselinę

Ff iij

lini, leuistici ana 3 iiij. calaminthi m. ij. glycyrrhizæ 3 β. coquantur in aqua quantum satis ad librā j. β. colaturæ addantur oxymellis compositi 3 iiij. fiat *Potio*, detur in aurora antequam sudatorio balneo vtatur.

℞ syrupi fumarizæ 3 ij. lupulorum, oxymellis simplicis ana 3 j. aquarum fumarizæ, lapathii acuti, lupulorum, ana 3 iiij. fiat *Iuleb*.

℞ foliorum senæ, polypodii quercini ana 3 iiij. β. myrobalañorum Indorum 3 ij. passularum mundatarum 3 j. bulliant in aqua buglossæ 3 xvj. ad tertias ; fiat *Haustus*.

℞ lapathii acuti, enulæ campanæ, ebuli ana 3 vj. absinthii p. j. cichorei, buglossæ, boraginis, fumarizæ, scabiosæ, cuscutzæ, capillorum Veneris, betonicæ, saluiæ, agrimonizæ ana m. β. maioranæ, rorismarini ana p. j. epithymi 3 β. stæchados Arabici, carthami contusi, foliorum senæ, glycyrrhizæ ana 3 vj. agarici electi 3 j. β. seminum melonum, anisi, fœniculi ana 3 j. coquantur in q. s. aque lactis ad lb j. β. addendo colaturæ oxymellis simplicis 3 iiij. sacchari albissimi q. s. fiat *Potio*. antequam validiori medicamento purgetur, hac potione prius meatus referari debent.

℞ radicum lapathii acuti recentis 3 iiij. radicum enulæ campanæ 3 j. betonicæ, cuscutzæ, scabiosæ, eupatorii, boraginis, buglossæ, scolopendriæ, ceterach ana m. β. seminum anisi, fœniculi ana 3 iiij. polypodii quercini, foliorum senæ, carthami contusi ana 3 j. ellebori nigri 3 ij. β. thymi, epithymi ana 3 β. passularum mundatarum 3 j. glycyrrhizæ 3 β. coquantur in aqua q. s. ad lb j. β. addatur colaturæ sacchari albissimi q. s. fiat *Potio*.

℞ electuarii eleescopi, cassiæ recenter extractæ ana 3 β. electuarii de succo rosarum 3 β. aquæ fumarizæ 3 iiij. fiat *Haustus*.

℞ diacathol. confectionis hamech ana 3 iiij. sp. diacarthami 3 β. electuarii de succo rosarum 3 j. syrupi fumarizæ 3 j. aquæ lupulorum 3 iiij. fiat *Haustus*.

℞ pillul. Indarum, de rhabarb. aggreg. ana 3 j. diagridii

℞ ii gr. iij. syrupi fumarie q. s. fiant *Pillule octo.*

℞ agarici trochiscati, pillul. aggregatiuar. de hermodactylis ana ℥ j. diagridii gr. v. syr. de fumaria q. s. fiant *Pillule.*

℞ theriacæ, mithridati ana ℥ j. ℞. syr. de corticibus citri ℥ j. decocti scordii ℥ iij. fiat *Haustus.*

℞ florum camomillæ, meliloti, maioranæ, parietariæ, matricariæ, artemisiæ, fœniculi, calaminthi, foliorū lauri, hederæ arboreæ, prasi, roris marini, eupatorii, ana p. j. rad. lapathii acuti, ebuli, fœniculi ana ℥ iij. grana iuniperi lb j. fœnugræci lb ℞. seminum anisi, fœniculi ana ℥ j. herbæ incidantur, semina & rad. contundantur, dentur pro *Balneo sicco.*

℞ ramentorum ligni guaiaci lb j. aquæ lb xij. post macerationem xxiiij. horarum, coquantur lento igne ad dimidium, coletur, & fiat *Potio prima vel Syrupus.* Pro prandio & cœna potus sit iste:

℞ ramenta prædicti decocti, quibus addentur novorum ramentorum ℥ iij. coquantur in libris xij. aquæ ad nouem libras. Si autem vnum altero prius fuerit absumptum, licebit vnum alteri commiscere, & sic dum absumptum fuerit, bibat. Ab vnciis autem quatuor syrupi ad vncias octo paulatim ascendet æger, dabimûsque in primis, & quatuor vltimis diebus in aurora tantum, in aliis verò mane & vesperi, caleat autem dum propinatur. Utetur autem 20. 40. subinde etiam 60. diebus, modo morbus inueteratus fuerit. aliquando autem purgabitur cum decocto soluente, in quo ponetur lignum guaiacum, colocynthis, hermodactyli, quia hæc duo hic maximè conueniunt.

℞ axungie porcine, vnguenti martiati, pinguedinis gallinæ ana ℥ j. olei liliorum, laurini ana ℥ ij. argenti viui ℥ vj. olibani, mastichis, saluiæ, stœchados, lithargyri ana ℥ j. ℞. aquæ vitæ ℥ ij. olei laurini ℥ iij. fiat *Vnguentum.* primo autem argentum viuum cū axungia non salita nec liquefacta misceatur diligenter in mortario; deinde reliqua addantur secundum artem bene incorporando.

℞ olei camomelini, spicę, liliorum ana ʒss. olei de croco ʒij. pinguedinis porci non liquati nec saliti ʒij. euphorbii ʒj. thuris ʒiiij. olei laurini ʒss. lumbricorum lotorum in vino ʒj. succi radicum ebuli, lapathii acuti, enulę campanę ana ʒss. squinanthi, stęchados, matricarię ana p.j. vini electi lbj. coquantur lento igne omnia simul ad consumptionem vini, addendo colaturę lithargyri aurei ʒij. terebinthinę clarę ʒj. cerę q. s. fiat ad ignem Cerotum in modum Sparadrapi, addendo in fine cocturę styracis liquidę ʒiiij. post auferatur ab igne baculo semper agitando, donec tepidum fuerit, addendo argenti viui extincti vt decet ʒij. baculoque semper adhuc agitetur donec optime incorporatum sit.

℞ olei laurini ʒij. petrolei ʒss. argenti viui ʒij. cinabrii ʒij. axungię porcine non salitę nec liquatę lbj. fiat *Unguentum*. Cum oui autem albumine & sputo rectificetur argentum viuum, dissoluantur autem primò pingua, hinc adde cinabrium & alia.

A P P E N D I X

ad prædicta pro curatione LVIS VENEREÆ inferuens.

Si lues Venerea non ita pridem hominem inuaserit, ita curari absque molestia poterit. Primò vena secabitur. Hinc humores crassi præparantibus medicamentis attenuabuntur, corporisque meatus reserabuntur. Demum purgante medicamento e corpore propellentur. Postea reliqui balneo sicco quod sudorem prolicere possit, excludantur, si opus est; & ubi sudare incipit, abstergat se aeger. Antequam autem balneo se committat, bibat haustum eius quod meatus corporum nervosorum, in quibus morbi materia potissimum latet, aperire possit, materiamque ad externas corporis partes protrudere, uti est decoctum radicum fœniculi, enulę campanę lentium, uuarum passarum, figum. Huius decocti unciiis quatuor addentur theriacę aut mithri-

thridati ℥ ij. Trium autem horarum spatio balneo sudorem
promocabimus sudoremque absterget, hincque lecto se committet,
in quo etiam sudabit placide, sæpiusque ordo prædictus repeten-
dus est. Si verò hac ratione medendi nihil profecerimus, eo quòd
altius malum radices egit, sanguinis missione facta, ad decoctum
ligni guaiaci, aut sarise-parille, aut radicum cynæ, apiosve trans-
eundum erit, ubi corpus purgatum fuerit. Decoctum autem cale-
re debet dum propinatur, stragulisque bene cooperiatur æger ut
sudare possit. Hinc surgere & obambulare in cubiculo poterit.
Prandere autem licebit quatuor aut quinque horis à sumpto
medicamento, nec non cœnare. Satis autem fuerit pullus gallina-
ceus. Si verò propter negotia aut egestatem non admittat usum
decocti, eius loco inunctionibus mercurialibus uti poterit feli-
cissimo etiam cum successu, quòd etiam aliquando maximo cum
commodo fiet post usum prædicti decocti, sic equidem reliquæ
optimè expellentur, tuncque propinabimus decoctum per trigen-
ta dies solum. Idem malum aliquando suffumigiis cogimur op-
pugnare, idque fiet in debilibus alternis diebus, vel quarto quo-
que die. Hoc tamen medicamentum genus nunquam admitteremus,
nisi prædictis frustra usi fuerimus. In brachiis tamen & cruri-
bus id tutissimè fieri poterit, si dolores, ulcera, aut gummata
morbi Gallici adsint. Pro iis verò qui ob negotia domi manere
non possunt, unguenta in corio aut panno lineo extendemus su-
perque iuncturas passim ponemus, bisque in septimana renova-
bimus. In quem finem recipe emplastri de meliloto ℔ ss. argenti
vini ℥ ij. olei laurini, petrolei, terebinthini ana q. s. fiat Cero-
tum. Pro tumoribus induratis, radices althææ, ficus, scæniugre-
cum, coquantur in vino, & cum axungia gallina fiat Empla-
strum.



Methodus pro cognitione

P E S T I S I N S E R .
V I E N S .

PESTILENTIA, morbus est in multos passim sæuiens, à perniciofa insolitaque putredine ortum habens, quæ longè superat conditionem vulgaris putredinis. In nobis autem aliquando ortum habet hæc perniciofa qualitas; contingit enim humores nostri corporis aliquando in tantum degenerare à naturali temperie, ut perniciosam atque venenatam tandem induant qualitatem, ita ut cum lethalibus venenis certare possint. Aliàs verò extrinsecus illabitur, ab exhalationibus videlicet malignis atque putridis, qui aëri communicantur, aliquando à cadaueribus non sepultis, à lacubus atque paludibus corruptis, foetentibus cloacis, à specubus venenosos metallicosque spiritus eructantibus. Subinde etiam fit à variis siderum commistionibus, tuncque semper arcanum atque admirabile summi iustissimi-que Dei est flagellum; atque propriè tunc pestilentia vocatur. Cum verò ab aliis causis ortum habet, morbus malignus vel febris maligna vocatur. Febres quæ à veneno fiunt, lethales quidem sunt, sed non pestilentes, quia contagiosæ non sunt.

PARS AFFECTA. Cordi omnium primò quasi pestilens aër se insinuat, propter respirandi necessitatem, modò homo ipse idoneus sit ut semina pestilentialia recipiat aëri communicata: sua equidem subtilitate facile per pulmones ad cor haustus illabitur, ibique omnium primò vitales spiritus, hinc humidum radicale, demum quoque solidam eius substantiam oppugnat.

SIGNA. Cum humores concurrunt mali corpus perturbantes, impatienter huc illucve se transfert æger, neque

neque in vno loco consistere potest, appetitus proster-
nitur, horror quoque in principio, mēbrorumque tor-
por concurrit, capitis quoque magna ex parte dolor
adeſt, imò rariùs absque dolore capitis atque stomachi,
pestis inuadere solet, sæpe quoque punctiones corporis
fiunt, vires tandem omnes ex æquo concidunt, & po-
tissimùm vitales; frequenter incidit animi defectio. Ex-
trema sæpe frigent, interiora verò, cor nimirum, stoma-
chus, pulmoque exēstuant, magna quoque ex parte siti
excruciantur, plerumque etiam concurrunt vigilię mo-
lestę, subinde verò in somnum fit magna propensio
nausea quoque fit frequens, tandem etiam vomitio fit
insolita, subinde biliosorum, sæpe etiam variorum hu-
morum: sordida fit lingua, & os amareſcit. vultus temu-
lentorum more ferox atque incertus est. Urina magna
ex parte turbida grauitēque olens redditur. Hinc sin-
gultus etiam frequenter molestare solet; pulsus tandem
fit languidus, celer, frequens; hinc delirium accedit, &
balbüties cum stupore enascitur, hypochondria disten-
duntur. Certissimum autem pestis signum est contagio,
quod quia primò videri non potest, alia obseruanda
sunt signa, estque proximum bubo pestilentialis in in-
guinibus, post aures, sub alis subitò oriens. In aliquibus
verò exanthemata seu maculę subinde purpureę, non
nunquam nigre, aliquando etiam cęruleę, potissimùm
circa flatum morbi erumpunt in diuersis corporis par-
tibus nullo tumore extuberantes. Aliquando etiam bu-
bones & pustulę comitantur. Frequenter quoque in
hoc malo carbunculi enascuntur, modò in hac, modo in
illa corporis parte pullulantes. Horum autem signo-
rum aliqua semper adsunt, non omnia. Si cęlitus morta-
libus mittatur hoc malum, prædicta signa frequenter
mitiora sunt, ita vt homo non admodum egrotare vi-
deatur, sæpe appetitus constat, neque sitis, neque febris
multum vrget, omnes tamen vires statim concidunt,
pulsus fit celer, paruus, languidusque, vomitus ferè con-
currit assiduus, sicque viribus extinctis homo moritur
frequentissimè.

CAVSA est aër maligna qualitate perfusus, cordique inspiratione communicatus, efficacissimas enim vires habet aër venenatus labefaciendi non solum corporis spiritus atque humores, sed etiam solidam ipsius cordis substantiam, cum continuo lege naturæ eundem haurire cogamur, inque ipsius cordis penetralia admittere, ubi primò spiritus, hinc humores, tandem etiam solida cordis substantia veneni labe deuasatur, atque tandem vniuersum etiam corpus. Subinde huiusmodi perniciofa qualitas aëri communicatur ex foetore cadauerum, nec non ex hominum animaliumque excrementis, ex paludibus aquisque stagnantibus, atque foetentibus, ex antris terræque hiatibus. Frequenter denique ex siderum commistionibus oritur. Interdum etiam oritur ex venenata qualitate quæ intus in nobis sponte gignitur ex humoribus putridis ortum habens, aliquando melancholicis, subinde etiam cholericis, aliàs etiam pituitosis, vnde contingit pestem aliquando referre naturam febris tertianæ, aut quotidianæ, nonnunquam quartanæ; frequenter enim contingit humores corruptos præter simplicem putredinem, tandem etiam venenosam, perniciosam pestilentemque induere qualitatem, vnde aliquando contingit aëre nusquam infecto, vnum aliquem hominem solum pestilentia laborare in hoc aut illo loco, neque alium aliquem corripì eo homine excepto.

PROGNOSTICA. Pestilentia omnibus aliis morbis exitiosissima est calamitas, in qua frequenter etiam bonis apparentibus signis, nihilominus tamen aliquando præter opinionem etiam ipsius medici, inopinata mors irruit, plusque periculi imminet si carbunculus, aut bubo, vel exanthemata nulla prorumpant e corpore: quibus quoque apparentibus si æger tamen inde non leuetur, pessimum est, equè quoque periculosum est, si carbunculus, aut bubo pestilens intro se subducatur. Soletque xxiiij. horarum spatium ita confirmari hoc malum, vt magna cū difficultate possit vnū aut alterū diem

diem possit expelli, eaque ratione nullus nimium suo robori, urinae, pulsiue confidat. Dum sudor frigidus emergit, faciei & oculorum color quasi versus nigrum vergit, dumque animi deliquium frequenter irruit, vomitibusque frequentioribus turbatur, variorumque colorum protruduntur excrementa, mortem quasi serio significat. Qui cum stupore, spasmio & amentia balbutiunt, magna ex parte moriuntur quoque.

OOOOOO OOOOOO OOOOOO OOOOOO OOOOOO OOOOOO OOOOOO OOOOOO

Methodus pro curatione

P E S T I S I N S E R -
V I E N S.

Perscitur autem subsequenter remedium generibus.

V I C T U S R A T I O N E.

A Er rectificetur cum rebus odoratis aliquoties in die.

Cibus. Tenui victus ratione utatur in mali principio atque refrigerante. Iuscula conveniunt gallinarum, pul-
lorum, duabus horis a sudore elapsis. Gelatina quoque
iuscula, seu congelata vocata, conveniunt ex capone,
carne vitulina, vis passis, saccharo rosato. Potus sit a-
qua in qua succus limonum vinumque granatorum
dissolvatur. A vino arcendi sunt aegrotantes. Iusculis
incoquantur borago, buglossa, carduus bened. flores
violarum, rosarum, semina acetosae.

Somnus moderatus sit; non enim absque periculo diu-
turnius admittitur somnus; tam enim veneni quam
spirituum sic fit ad cor revocatio.

Excrementa alui respondeant. A venere abstineat,
Animi perturbationes vitet.

V A C U A N T I B U S.

Syr. rosarum solutius praestantissimus est. Syr. de ci-

choreo cum rhabarbaro.

Diacatholicum, electuarium de succo rosarum, diaprunum solutivum, pill. pestilenciales.

Tryphera Persica. Rhabarb. infusum in aqua endiviæ & sero lactis. Agaricus.

Diasena, confectio hamech.

Decoctum thymi, epithymi, foliorum senæ, polypodij, florum violarum, boraginis, buglossæ, angelicæ, syr. de multiplici infusione rosarum addito.

Clystere ex iusculo gallinæ, capi, vel carnis vitulinæ, in quo coquantur mercurialis, malua, althæa, flores violarum, lactucæ folia, & cassia fistula, mel rosaceum, oleum violaceum secundum artem addantur.

Vena incidenda erit mox ab initio mali, cum primum suspicio mali adest, antequam elabantur sex aut octo horæ, idque sanguine peccante, tum quantitate, tum qualitate, aliter non, & antequam sanguinis atque cordi ita communicata sit veneni labe, ut reuelli non possit; id quoque eò audentius fiet, si materia mali adhuc fluat, ægerque multum affligatur ex lateris dolore aut inflammatione, ut si ab initio difficilis respiratio concurrat, aut pectoris angustia. Si verò venenum malignique spiritus sanguinem iam inferint, diffusique per corpus fuerint, à sanguinis missione abstinemus. Vena autem secabitur in eo latere in quo dolor atque grauitas maior percipitur; Cephalica quidem, si circa faciei, capitis colivæ partes sentiatur dolor; basilica verò, aut, ea non apparente, mediana secabitur, si sub alis grauitas percipiatur, aut in pectore, aut latere, aut ventre malleoli verò, dum in crure vel in inguine percipitur grauitas. Detrahemus autem uncias quatuor vel plus, prout humores adhuc immunes existunt à veneni labe, & prout multo sanguine æger abundat, nec est quod tunc vereamur humorum exagitationem: hoc enim in magna sanguinis missione solummodo fieri potest. Venæ sectio quoque non admittitur, si malum incipiat

piat cum alui lubricitate aut vomitione.

Vacuare licebit leniente medicamento in mali principio, potissimum si materia mali fuerit furiosa, & modò non fiat à sanguine peccante sua copia; tunc enim potius fiet venæ sectio moderata. Cum autem rarius hoc malum ab vno fiat humore peccante (tolent enim omnes ferè putrescere in istis febribus pestilentialibus, atque incendi; alius humor tamen magis alio) contingit non modò continuas febres pestilenciales fieri, sed etiam intermittentes propterea generantur pestilenciales; ideò pro ratione humorum peccantium purgatorium præscribatur quod conueniat medicamentum. Nullo autem modò fortioribus vtemur medicamentis soluentibus, ne humorum exagitatio fiat & ebullitio, quæ hîc sæpe fit, haud aliter atque vinum perturbari solet in diebus canicularibus.

AVERTENTIBVS.

Vomitum conuenit multum ab initio, si ventriculus multum cibo repletus fuerit, humoresve maligni in eo fluctuent.

Cucurbitulæ hirudinẽsve cruribus, humeris, naribus aut dorso, iisque locis ubi bubones emergere solent, affigentur cum scarificatione, & potissimum hoc fiet, si venæ sectio fieri prohibeatur; contingit equidem sæpe hoc medio humores venenales sic trahi ad locum ubi spes est bubonem emergere; multum autem sanguinis educemus. Tubercula quoque erumpentibus admouenda erit cucurbitula, à corde auertatur vis veneni, & ne intro trahatur, & subducatur, quod sæpe fit.

Sudores promouendi sunt statim ubi venæ sectio facta fuerit; hos enim natura sæpe per se, tertio quartove die excitare solet; fiet autem cum decocto petasites, cardui benedicti, scabiosæ.

EXPellentibus pestis seminaria, vîmque veneni humorumque malignorum agitationem impediunt.

Gg

Diatragacanthum frigidum, diamargaritum frigidum, diatria sandali, confectio alchermes.

Theriaca, mithridatum, in præcautione potius locum habent, si antiqua sint, vti omnia multum calentia, quàm in peste iam correptis. Aqua acetosæ & cardui benedicti dentur correptis vt sudare possint.

Conserua boraginis, buglossæ, rosarum, acetosæ, nenupharis. Syr. violarum, limonum, de succo ribes, acetosæ, buglossæ.

Conserua magna nostra mirificè operatur in principio mali, si propinetur antequam cor obrutum à veneni viribus erit.

Carapotia pestilentialia, elect. de gemmis, lætificans Galeni, diascordium Fracastorij, Tryphera Saracenica. Electuarium de ouo, potus ex aqua scabiosæ, pimpinellæ, boraginis, dracunto, mithridato, theriaca, croco.

Cardui benedicti succus vtilissimè sumitur ab infectis: sic & mali citri succus & semina, corticésque conditæ.

Sudatorium fiat recenter correpto cum theriaca, mithridato, sp. liberantis, castoreo, camphora, baccis lauri, aqua tormentillæ, scabiosæ, dracunti, pimpinellæ, datur post phlebotomiam.

Petastes sudore etiam feliciter discutit venenum. Potus ex decocto lendum, croco in aqua mulsæ, oxymelite addito.

Potus ex aqua fœniculi, acetosæ, apij, intubi, in quibus decocta sint semina apij, ficus sicci, lendes, addendo syrupum ex acido citri succo, sudore pustulas protrudit. Idem facit aqua angelicæ, tormentillæ, oxalidis, pimpinellæ, diptami, serpentariæ.

Bolus Armenus aceto rosaceo aliquoties lauetur. Radix tormentillæ, angelicæ, diptami, gentianæ, zedoariæ, pimpinellæ, beronicæ.

Mastix, crocus, aloë, myrrha, scabiosa, acetosa, ruta vino aut aceto maceretur, calenti que lapidi iniiciatur, fumusq. toto corpore excipiat. Vnicornu, cornu ceruinum,

uinum. Aqua ex putaminibus nucum iuglandium destillata mense Septembri, plurimum prodest quoque.

Vnguentum pro bubone & tuberculis, ex theriaca Andromachi, oleo scorpionum, hypericonis. Cataplasma ex farina hordei, melle, theriaca, rad. liliorum, tormētille, diptami, ficubus, cepis assis, sale, fermento, fimo columbino, oleo liliorum.

Emplastrum ex theriaca cum succo rutę subactum, id sepius renouari debet.

Causticum ex calce viua, iuglandibus, sapone, fermento, ficubus, vitriolo Romano, terebinthina.

Epithema ex aqua buglossę, melissę, acetosę, rosarum, aceto rosato, aqua frigida, lactuce, cucurbitę, intubi, plantaginis, pul. rosarum, sandalorum, diamargariti frigidi.

Vnguentum pro corde ex oleo hypericonis, cinnamomi, ex persicorum nucibus, semine citri, cornu ceruino, rosis.

Sacculus ex floribus rosarum, violarum, buglossę, keiri, cortice citri, aurantij, cornu ceruino, cinnamomo.

Multa ex istis sudorem mouent, postquam sumpta sunt, qui vt melius sequatur, lecto se vt committat optimum erit, post assumptionem eius quod sudorem mouere potest; laborandumque erit vt optimè sudet per vj. aut vij. horas: id quod calentibus lateribus fieri poterit, si pedibus conuenienter subiiciantur. Poterunt quoque lagenę aqua calente refartę linteis que inuolutę ne vrant, alis egrotantis accommodari. Vesicę quoque bubulę aqua calente impletę, idem prestabunt. Repetetur autem tribus diebus hæc sudandi ratio. Cauendum autem ne nimis diu sudet, in subitū enim exitium precipitat nimis sudor. nihil autem boni, nimium quoque breuis prestat. à somno autem atque alimentis abstineat eo tempore quo sudat eger. Sunt permulta hęc quoque quę promouent tumores vix apparentes, atque venenum extrā prolestant. Summa autem diligentia hęc obseruare debemus ne multū calentia admittamus,

Gg ij

si æger ipse immodico turbetur calore, imò ne theriacam tunc quidem admitteremus.

CONFORTANTIBVS & corroborantibus
cor & stomachum.

Confectio liberantis, lætificans Galeni, sp. diamargariti calid. atque frigid. diarrhodon abbatis, diamuscum dulce.

Syr. de endiuia, de acido citri succo, limonum, grastatorum, de succo acetosæ, aqua boraginis, buglossæ, violarum, in quibus per noctem infundentur bolus Armenus, margaritæ, corallum rubrum, viscerum igneum calorem moderatur.

Conserua rosarum, violarum, buglossæ, saccharum rosatum, manus Christi perlata, succus limonum, acetositis citri, berberorum. Aqua cinnamomi destillata.

Vnguentum ex corallo rubro, rosis rubris, succo citri acido, limonum, theriaca, croco, camphora, rosis rubris, oleo rosato, violato, pro cordis regione.

Epithema ex sp. de gemmis, trochisc. de camphora, corticibus mali citri, succino, sandalis, ligno aloës, zedoaria, osse de corde cerni, corallo rubro & albo, croco, mace, moscho, caryophyllis, vino generoso, aqua acetosæ, rosarum, melissæ, aceto rosaceo, cardui benedicti, melissophylli.

Sacculos ex prædictorum materia in epithemate dicta.

OOOOOO OOOOOO OOOOOO OOOOOO OOOOOO OOOOOO OOOOOO OOOOOO OOOOOO OOOOOO

THEORICA ET EMPIRICA MEDICAMENTA nobilia in PESTE sæpius cum summa salute plurimorum egrotorum à Gualtero Bruele experta.

CVRATIO PESTIS.

℞ syr. rosarum solut. ʒ j. decocti rhabarbari, myrobalarum citrinorum, cardui benedicti, angelicæ ʒ iiij. fiat Haustus.

℞ theria-

℞ theriacæ Andromachi ʒ ij. Mithridati ʒ j. boli Armeni præparati ʒ se. aquæ scabiosæ ʒ iiij. fiat *Haustus*.

℞ radicū angelicæ, tormentillæ, diptami ana ʒ j. petasites ʒ se. corticum mali citri, cinnamomi, myrrhæ, croci ana ʒ ij. aloës parum lotæ ʒ se. dosi ʒ j. cum decocto rosarum, acetosæ; cardui benedicti.

℞ radicū angelicæ, diptami ana ʒ j. se. pulueris unicornu gr. viij. theriacæ Andromachi, Mithridati, boli Armeni ana ʒ j. se. sacchari rosati ʒ j. dosi ʒ ij.

℞ radicū angelicæ, diptami, pimpinellæ, tormentillæ, galangæ, zedoariæ, ana ʒ ij. cinnamomi, caryophyllorum, macis ana ʒ j. se. myrrhæ, thuris ana ʒ j. theriacæ Andromachi ʒ iiij. se. seminum cardui benedicti, baccarum iuniperi ana ʒ j. macerentur xxiiij. horis in æquis partibus vini & aquæ angelicæ, hinc in duplici vase destillentur. Dosi ʒ iiij. cum ʒ se. theriacæ.

℞ theriacæ Andromachi, zinziberis ana ʒ ij. sacchari Candi ʒ sem. aquarum dracunculi ʒ iiij. boli Armeni ʒ j. aquæ destillatæ prædictæ cochlearia duo vel tria; fiat *Haustus*.

℞ boli Armeni præparati, radicū tormentillæ, diptami ana ʒ ij. zedoariæ electæ ʒ j. se. seminum citri, cardui benedicti ana ʒ j. rasuræ eboris, corticis citri, galangæ, caryophyllorum ana ʒ ij. cinnamomi ʒ j. se. sacchari rosati quantum satis, fiat *Pulvis*, dosi ʒ j. cum aqua cardui benedicti.

℞ theriacæ antiquæ ʒ j. sem. Mithridati ʒ iiij. sp. liberantis ʒ j. sem. castorei gr. vj. camphoræ gr. ij. baccarum lauri excort. ʒ sem. fiat *Mixtura* sudorem mouens, detur ʒ j. cum aqua pimpinellæ, scabiosæ, tormentillæ, post venæ sectionem.

℞ radicū angelicæ ʒ j. se. theriacæ magnæ ʒ j. aquæ rutacæ, angelicæ, draguntæ ana ʒ j. fiat *Haustus*.

℞ conferuæ buglossæ, rosarum, corticum citri condit. ana ʒ se. manus Christi ʒ j. diamargariti frigidi ʒ j. sem. syr. de succo acetositatis citri q. s. fiat in forma *Opiati*.

℞ conferuæ rosarum, violarum ana ʒ j. corticum ci-

tri conditarum ꝓ se. coralli rubri, boli Armeni ana ꝓ ij. syrupi de buglossa, violarum ana q. s. fiat *Mixtura*.

℞ rosarum nouellæ ꝓ j. syr. acetosi simplicis ꝓ j. sem. aquarum rosarum ꝓ iiij. fiat *Hauftus*.

℞ syr. de succo limonum, de succo acetosæ, syr. de cichoreo cum rhabarbaro ana ꝓ j. sem. aquarum violarum, acetosæ ana ꝓ iiij. fiat *Potus*.

℞ radicum angelicæ, tormentillæ ana ꝓ ij. diptami albi ꝓ iiij. theriacæ ad pondus omnium. Dosis ꝓ j. cum aqua violarum, rosarum, acetosæ, detur correptis, nec non sanis præseruandi causa.

℞ radicum gentianæ, angelicæ, tormentillæ ana ꝓ ij. stolochiæ, rotundæ, myrrhæ, castorei, baccarum lauri ana ꝓ j. croci ꝓ j. se. theriacæ ad pondus omnium; detur ꝓ j. bis in die cum aceto rosato; præseruationis verò gratia detur etiam bis terte in septimana.

℞ aquarum buglossæ, rosarum, violarum, acetosæ ana ꝓ iiij. sandalorum purpu. sp. è gemmis ꝓ iiij. corticum mali citri ꝓ ij. misceantur pro *Epithemate*.

℞ boli Armeni, terræ sigillatæ ana ꝓ j. se. succi limonum, granatorum ana ꝓ j. se. vini albi ꝓ iiij. aquarum boraginis, nymphææ ana ꝓ iiij. rosacei ꝓ viij. fiat *Epithema*, pro cordis regione.

APPENDIX

ad prædicta pro curatione PESTIS
inseruiens.

Celerrimè medicamenta ahibenda sunt in hoc malo, cum percipies hæc eius sit naturæ, quòd mox ad cor pergat, eiusque vitam extinguat citissime: Omnium autem primò venæ sectio instituatur, & potissimùm primis sex horis, hinc statim quòd venenum expellere possit, propinetur; idque ut commodius fiat, mox sumpto medicamento, ut sudet correptus, laborandum est. Et magna quidem ex parte à sudoris prouocatione incipere debemus, cum plerumque non ante secundum aut tertium diem medicum accersere soleant ægri, quo tempore venæ sectio potius oberit. Admittit autè sudorem per quinque vel sex horas, prout vires

vires validæ fuerint, nonnunquam etiam per octo horas, si robustus fuerit, idque repetet duobus sequentibus diebus: abstinebitque eo tempore quo sudat ab omni cibo, nec non à somno, diligentèrque cauebit, ne frigus ullo modo admittat. admitteremus tamen syr. limonũ, violarũ, de corticibus citri. Demum alia quæ venenum auertere & expellere possunt, administrabuntur. Hinc massa malignorũ humorũ è corpore leniente medicamento educi poterit, quod alterabitur prout plures observabuntur humores peccare; melius autẽ id fiet clysteri, potissimũ si primò die vi morbi, sanguinisque missione, sudorũque prouocatione plurimũ debilitatus sit. Interea quoque temporis quæ cor corroborare possunt interiũs, cum exteriũs administrabũtur. Quæ omnia nunc antea que dictis medicamentis consequi poterimus, modò universalis particularibus debita ratione adhibeantur. Præcauendi causa, præstatißima nonnulla medicamenta in prioribus indicauimus. Inter omnia tamẽ alia, soli cælique mutatio securissimũ erit remedium; aut si id nõ licet, ærem emendet rebus odoratis, carbonib. iniectis, aut suffumigia ex iisdem parentur, ut est lignũ iuniperi, rosmarinus, salvia, caryophylli, ihus, mastix, myrrha, ruta. Manipuli quoque duo aut tres rutæ in sinu gerantur pectoris, ita ut odor ad nares pertingere possit. Conuenit quoque acetum olfacere, cui aqua rosacea optima permista sit: ea quoque oculos, faciem, nares, manũsque sæpius in die lauabit, manũsque lotas odorabit. Acetũ quoque rutaceum spongiæ excipiet, olfacietque sæpius, mirè equidem æri pestilenti resistit. Alimentis utatur quæ bonũ succum suppeditare possunt. A nimia autem repletione & inanitione sibi caueat. Catapotiorum Russi ʒ i quoque sumet aliquando, bis tẽrue nimirũ in septimana Masticare quoque utile erit, angelicæ zedoariæ, aut enulæ campanæ radicẽ cum in publicũ ire debet, aut peste correptos inuisere. In quem finem dentes theriaca, aut succo alijs utiliter illinentur; conueniunt in hunc finem electuarium de ouo, allia, cepæ pill. optimè. R aloës electæ ʒ i. ss. gummi ammoniaci ʒ i. myrrhæ ʒ ss. pill. de agarico ʒ ij. syr. de corticib. citri q. s. fiant Pillule, capiat aliquando ʒ ss. in aurora R corticũ citri conditorum ʒ vj. conseruæ anthos ʒ i. Mithridati ʒ ss. theriacæ ʒ ij. aristolochiæ longæ zedoariæ, diptami ana ʒ i. radicum angelicæ ʒ ij. aromatici rosati ʒ ss. syr. de corticibus citri q. s. fiat Conditum.

G g iij



PIA AD EVNDEM

PRECATIO

GVALTERI BRVEL.

Sed quoniam hactenus quomodo temporalis vita à grauiſſimorum morborum incurſibus atque iniuriis ſit liberanda, pro noſtro modulo ſignificauimus, quam modis infinitis excedit vita æterna, vt ea poſthac nobis quoque frui liceat, ſupplices genibus tum corporis, tum animi ante thronum maiestatis tuę procumbentes, æterne Deus, te medicum æternum inuocemus, vt poſt hanc vitam ærumnoſam, æterna tua nobis gaudia concedas.

CREATOR omnium Deus, qui expoſuiſti omnium oculis vniuerſam hanc mundi machinam, eamq; longè pulcherrimã, in qua mirabilia tam multa produxiſti, quæ ſapientiam tuam mirabilem, potentiamq; infinitam; gloriam denique atque bonitatem incomprehenſibilem declarant tuam erga nos, & quidem tantam, vt nullus mortalium reperiatur, niſi brutis annumerari debeat, qui nõ mirum in modum mîretur amplitudinem celeſtium orbium, infinitamq; eorum dimensionem, ſtellarumq; multitudinem innumerabilem, earundemq; mirabiles virtutes, tum motuum admirãdam conſtantiam, vereq; ſtupendas leges, quæ ſingulis diſpenſa-
te

te sunt à te ab initio in sempiterna secula. Et quidem hæc omnia, infinitaque alia, nostra solùm causa à te formata sunt, inter quæ mundi creata non est vel vnum ne eorum quidem quæ nobis vicina sunt, si penitiùs introspicere velimus, quod non mirabiliter in contemplationem sui rapere possit. Imò quæ nullo tu perfecisti negotio, Domine, ordinem habent tam admirabilem tamq³ iucundum decorem, virtutesq³ tam potentes, vt satis admirari atq; contemplari pro dignitate nequeamus. Imò tanto fulgore mentis aciem perstringūt permulta eorum quæ à te perficiuntur Domine, vt plurima eorum quasi intacta relinquere cogamur, atq; cum stupore quasi abscedere, cum stupenda atq; mirāda dici possint de rebus tuis etiam minimis, Domine. Quis enim oculi fabricam naturāq³ supra modum non admirabitur? cuius mirabilis natura atque fabrica, in isto volumine explicari vix potest etiam ab homine eloquentissimo. Quis rursus causam ortus aquarū tam copiosarum è visceribus terræ continuò ebullientium reddere poterit plenariè? Quis non admirabitur huiusmodi spectaculum, cum per secula huiusmodi fluxus constanter perseuerent? vti enim ante ætates plurimas, ita & hodie ebulliunt aquæ, idq³, quod magis quoque mirum est, non in vno solùm hoc spectaculum videtur loco, sed in infinitis passim locis per vniuersum terræ ambitum. Cum igitur infinitus sit operum tuorum mirabilium, Domine, numerus, quorum mira gratissimāq³ varietate, mirificè mentem nostram rapis in tui constantissimum amorem atq; admirationem plus quàm humanam, te magnum Deum auctorem tum horum, tum omnium aliorum mirabilium esse pia mente confiteor atque assero. Verùm, si sic parua

*miramur tua opera Domine, nōne meritō te qui omnia
 reliqua modis infinitis pulchritudine tua, atque gloria
 sempiterna excellis, etiam vsque ad stuporem reuereri, a-
 mare atq; timere cōuenit; tibiq; à nobis omnis laus, honor
 & gloria attribui meritō debet? Cū autem à plurimis
 magnorum operum tuorum ignaris negligatur pia veraq;
 gloria tua, mentibus hominum inserere, æterne Deus, de-
 siderium cognoscendi tam te, tum opera tua, quæ nimium
 sunt mirabilia atque diuina. Hoc enim expertus sum in
 ipsa veritate, creator meus Domine, quod quisquis gusta-
 uerit delicias mētis quæ ex admiratione illa tuorum mi-
 rabiliū operum capiuntur in hac lachrymarum valle,
 intelligit supra captū omnem mirabiles esse delicias, quas
 preparasti filiis hominum post hanc vitam, vbi facie ad
 faciem videbimus te auctorem vitæ mirabilem omnium
 horum mirabiliū, cuius intuitum mortalium oculos nō
 posse intueri præ nimia maiestate, nequaquam mirum est:
 ibi nobilis hæc Dei creatura eternitati à te destinata, quā
 misello hoc corporis mei ergastulo quasi cōpedibus detine-
 ri certō firmiterque credo, miseriis omnibus quibus qui-
 dem & cum gemitibus quotidianis nunc oneratur, planè
 exonerabitur. Gratiasque tibi ago ô gloria æterna, cuius
 laus in æternum permanet, quod me participem aliquali-
 ter facere placuerit mirabilis dulcedinis, quæ ex contem-
 platione mirabiliū operum tuorum percipi solet ea piè
 contemplantibus, in quibus aliquando obstupescit anima
 mea, quod causam hinc mihi dederis, quod te mirabilem
 horumq; mirabiliū operum auctorem, multō magis ad-
 mirari didicerim, quàm vñquam aliàs fortè eram fa-
 cturus: mirè equidem hæc sobriè cognita ad Dei gloriam
 de-*

decantandam, proficiunt contemplantibus in veritate; de
 quibus quoque semper loqui, cogitare, tibiq³ gratias agere
 mirum in modū mihi dulce est. In iis enim inuenitur mi-
 rabilis tuæ laudis, amoris atque cōfessionis materia vber-
 rima Domine: quis enim præstantis artificis opera admi-
 rari poterit non reuerendo eorum auctorem? Tu Domine
 Deus noster sis benedictus in omnibus operibus tuis, tibiq³
 honor & gloria cedat ab omnibus tuis creaturis, tuamq³
 inestimabilem sapientiam atque bonitatem concelebrent
 in omni æternitate. Tu Domine Deus vniuersæ creaturæ,
 qui es in omnibus creator mirabilis, qui gloria es regum
 terræ, dominatorque omnium in virtute tua, qui intueris
 abyssos, & intima terræ illuminas, cui nihil occultum est
 eorum quæ futura sunt, nihilq³ præteritorum in obliuio-
 nem venit, cū vtrumq³ præsens sit tibi ô eterne Deus, cō-
 cede propitius, vt omni qua possum humilitate tibi quietè
 iugiterq³ seruire mihi liceat omnibus dieb. vitæ meæ, vtq³
 tuam deitatem piè collaudare possit anima mea in hoc
 graui corporis ergastulo pro mea tenuitate. Utinam in
 spiritu & veritate tibi gratiarum actiones persolvere pos-
 sem pro omnibus quæ tribuisti mihi Domine omnibus die-
 bus vitæ meæ! Te rogo Domine qui saluas omnes sperantes
 in te, vt me benedicere digneris benedictione tua æterna, ô
 eterne Deus, vt bene sit animæ meæ, vtq³ in viis manda-
 torum tuorū ambulare possim omnibus diebus vitæ meæ:
 sic equidem à te replebitur anima mea ea dulcedine tuæ
 gloriæ, quam neque oculus vidit, neque auris audiuit, ne-
 que cor hominis vnquam comprehendere potuit. Sic de-
 nique spiritus meus cū spiritu Domini, indissolubili vin-
 culo vnietur per omnem æternitatem, tuncq³ demum sa-

tiabitur anima mea, quam nihil alioqui prater te, Domine, sub celo, aut super celos satiare potest : ita enim mirabilis atque magna creata est à te mirabili magnoque Deo anima mea. Absque omni autem dubitatione tibi fidens, eterne Deus, qui cuncta tua virtute omnipotenti viuificas, stabo super speculam, ibique excubias agam, expectaboque aduentum tuum, Domine, sicutque mater lugens super unigenito vteri, renuam consolari, quotidianisque non desinam, Domine, suspiriis atque gemitibus exoptare diem illum particularis iudicii, in qua die summa cum fiducia spero me visurum reuelata facie tuam deitatem, tuncque ad plenum satiabitur anima mea cum manducare dabitur mihi panis aternus in regno Dei, ubi labia nostra confitebuntur nomini tuo laudes in seculum, & in seculum seculi. Hoc quoque mihi concede, pie Domine, ut cum timore, atque amore tuas laudes iugiter decantare possim omnibus diebus vite mea, utque amore plus quam humano ardeat te anima mea, tibi que canticum glorie, sacrificiumque laudis psallat in omni tempore, utque intelligere valeam tuam voluntatem in omnibus que significasti nobis per sacrum verbum tuum, & ne meam patiaris perditionem, Domine, qui ex utero matris mea formasti me. Concede mihi cor mundum, animamque mundam, & cum magnus sit miseriorum nostrarum numerus, compeste hosce fluctus tribulationis quibus in dies perturbamur, Domine, & erue me ab angustiis & periculis huius turbulenti maris mundani, & ad hunc me deduc portum, ubi beatorum spiritus nimium felices, tibi incorporati, eterna vita fruuntur, tecumque regnant, atque per omnem eternitatem regnabunt. Tu, eterne Deus, qui bene velle

mihi

mihi concessisti, concede etiam perficere ut possim, & in die tribulationis talem concede animi constantiam, ut non perturbetur anima mea ab iis qui odio habuerunt me gratis, & ab homine malo atque insidioso, confusionemque meam querente, & à lingua dolosa, animaque mendaci libera me, pie Domine. Concede mihi, te rogo, eterne Deus, per viscera misericordiae tuae, portionem aeternae hereditatis tuae in resurrectione prima atque in die particularis iudicii, ubi à compedibus huius ergastuli tuo iussu liberabitur anima mea; tunc equidem securus ero à timore atque tremore, in die illa magna atque tremenda, in die illa calamitatis & miseria, quando caeli mouendi sunt & terra, & quando aeternus Dei filius, Dominus noster Iesus Christus, venturus est cum gloria iudicare viuos & mortuos. Concede mihi, ô Rex gloriae, ut in omni aeternitate cum omnibus angelis & archangelis, cum thronis & dominationibus tibi iugiter decantare mihi liceat hoc canticum gloriae: Laus, honor & gloria illi qui sedet in excelsis per omnes aeternitates benedictus, qui iugiter per cuncta secula regnat.

FINIS.



IOH. IAC. VECTENSIS

MED. DOCTOR.

Τῆς μεθέδου ὅσις περὶ τοῦ θεσσαυρὸν ἔδειξεν
 Ἀνθρώποις, αὐτὸς τῶν τεχνῶν κλεῖδα δίδωκε,
 Καὶ πῶς πρὶν τῆς χειρὸς, καὶ δύσβατον οἶμον ἐπὶ αὐταί,
 Τῷ δὲ καλῶ δῶρον ῥαδίον ἢ ὁμαλόντ' ἐποίησεν.
 Τὴν δ' ἄρα τιμὴν βίβλον, συνεδάμεν ἔργον ἡέτου
 Βρυέλλαι, χάριεντι νοσῶ ἀγαγνώσκετε παῖδες
 ἡέτων· ὁ γὰρ οὕτως, μεθέδωκε διδάσκειν
 Πειράται, φήσαις τε, πόποις, συμπλώματα γνῶναι,
 Αἴτια, περὶ νόσους, παντοῖά τε φάρμακα νοσῶν.
 Ἐσαυτοῦ μὲν ὅφελον, τῷ δὲ ἀπὸ πίπνου κλέον ἔσαν.

INDEX



I N D E X
M O R B O R V M O M N I V M

quorum

D E S C R I P T I O E T C V R A T I O

hoc libro.

A.		Destillatio seu Catarrhus	
Anasarca	<u>363</u>	<u>162</u>	
Angina	<u>174</u>	Diabetes	<u>387</u>
Apoplexia	80	Distensio	<u>69</u>
Arthritis seu Articularis morbus	<u>438</u>	Dolor stomachi	<u>269</u>
Ascites	<u>364</u>	Dysenteria	339
Asthma	194	Dyspnœa	<u>194</u>
Auditus grauitas	<u>144</u>	E.	
Aurigo	<u>318</u>	Effusio bilis	<u>318</u>
B.		Epilepsia	59
Bilis effusio	<u>318</u>	F.	
C.		Faucium inflammatio	<u>174</u>
Calculus renum	375	Fluxus mensium nimius	
Cardialgia	<u>269</u>	<u>405</u>	
Caros seu Veternus grauis		Fluxus mensium suppressus	<u>417</u>
91.		Furor	<u>107</u>
Catalepsis seu Cōgelatio		G.	
100		Gallicus morbus	<u>447</u>
Cataracta seu suffusio	125	Genogra	<u>438</u>
Catarrhus	<u>162</u>	Grauitas auditus	<u>144</u>
Chiragra	<u>438</u>	H.	
Colica atq. Iliaca passio	351	Hæmorrhagia	152
Conuulsio seu spasmus	<u>69</u>	Hæmorrhoides sanguinæ	
Cordis palpitatio	229	sine modo fundentes	<u>396</u>
Coxendicis dolor	<u>438</u>	Hemicraneæ	I
Cruditas Ventriculi	<u>278</u>	Hepatis debilitas	<u>299</u>
D.		Hepatis obstructio	<u>289</u>
Debilitas Ventriculi	299	Hydrops	<u>363</u>

INDEX

Hypochondriaca melan- cholia	35	Paralysis	12
I.		Paraplexia	13
Ictericia	318	Peripneumonia	163
Iliaca & Colica passio	351	Pestis	458
Imbecillitas Ventriculi	278	Phrenitis	114
Incubus	52	Pleuritis	206
Infania	107	Podagra	438
L.		Præfocatio vteri	428
Lethargia seu Veternus	91	R.	
Lienis tumor	308	Regius morbus	318
Lipothymia	239	Renum læsio	387
Lippirudo	133	S.	
Lues Venerea	447	Sanguinis profluuium è naribus	152
M.		Sanguinis sputatio	219
Mania seu infania	107	Singultus	259
Matricis præfocatio	388	Spasmus	69
Melancholia	24	Splenis tumor	308
Melancholia Hypochon- driaca seu Flatulenta	35	Stomachi dolor	269
Menses nimium supprelli	417	Suffusio seu Cataraeta	125
Mensium nimius fluxus	407	Syncope	239
Morbus articularis	438	T.	
Morbus Gallicus	447	Tumor splenis	308
Morbus Regius	318	Tussis	184
O.		Tympanites	363
Ophthalmia	133	V.	
Oppilatio hepatis	289	Venerea lues	447
Orthopnœa	194	Ventriculi dolor	269
P.		Ventriculi cruditas	278
Palpitatio cordis	229	Vermes	329
		Verrigo	45
		Veternus	91
		Vteri præfocatio	428

FINIS.



